

**ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ
ХАБАРНОМАСИ**

2 (76) 2019



**ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
УЗБЕКИСТАНА**

2 (76) 2019

**BULLETIN OF THE AGRARIAN
SCIENCE OF UZBEKISTAN**

БОШ МУҲАРРИР:
академик
Ботир
СУЛАЙМОНОВ

Бош мұхаррир
ўринбосари:
профессор
Лазизахон
ГАФУРОВА

Бош мұхаррир
ўринбосари:
қ.х.ф. доктори
Махсуд АДИЛОВ

Масъул котиблар:
Шоҳсанам
ЁДГОРОВА
(рус тили),
Мусобек АШУРОВ
(инглиз тили)

Нашр учун мастьул:
Бахтиёр НУРМАТОВ

Журнал 2000 йил апрель
ойида ташкил топган.
Бир йилда 4 марта чоп
этілади.

700140, Тошкент -140,
Университет құчасы, 2,
ТошДАУ
Тел: (+99871) 260-50-59.
Факс: 260-38-60.
E-mail: agrar_fani@mail.ru
Мақолада көлтирилған факт
ва ракамлар учун муаллифлар
жавобгардир.

Мұхаррир:
АЛИМКУЛОВ
ДЕНИСЛАМ

2 (76)
2019 йил

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

Т а ҳ р и р ҳ айъати:

*А.А. Абдуллаев – академик,
И.А. Абдурахманов - профессор,
А.А. Аманов – профессор,
Х.Н. Атабаева – профессор,
Х.Ч. Бўриев – профессор,
И.И. Васенев – профессор (Россия)
Р.Д. Дусмуратов – профессор,
В.И. Зуев – профессор,
А.К. Кайимов – профессор,
Х.Х. Кимсанбаев – профессор,
Л.С. Кучкарова – профессор,
М.А. Мазиров – профессор (Россия)
А.М. Мухаммадиев – профессор,
Р.С. Назаров – профессор,
У.Н. Носиров – профессор,
Т.Э. Остонокулов – профессор,
Ш.Н. Нурматов – профессор,
А.Р. Ражабов – профессор,
М.Т. Ташболтаев – профессор,
Ш.Ж. Тешаев – профессор,
Т.Ф. Фармонов – профессор,
Б.О. Хасанов – профессор,
Э.А. Холмуродов – профессор,
Н.С. Хушматов – профессор,
У.П. Умурзаков – профессор,
А.А. Абдувасиков - доцент*

ТАЪСИСЧИЛАР:

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб
чиқариш маркази.

Тошкент давлат аграр университети.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти.

Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

Тошкент давлат аграр университетининг Андижон филиали.

ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

Журнал 2000 ийл апрел
ойида ташкил топган

Бир йилда 4 марта
чоп этилади

Тошкент

№ 2 (76) 2019.

МУНДАРИЖА

Селекция, генетика ва уруғчилик

Х.А.Мўминов, Б.М.Гаппаров. <i>G.Herbaceum</i> L. ва <i>G.ArboРЕum</i> L. айрим кенжা турларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари.....	7
С.К.Матякубов ¹ , М.Ф.Санамъян ² , Ш.У.Бобохужаев ² , Ш.Э.Намазов ¹ . Ғўзанинг Султон нави иштироқида олинган F ₂ дурагайларда айрим цитогенетик хусусиятлари.....	10
М.Ф. Санамъян, С.К. Матякубов, Ш.У. Бобохужаев, Ш.Э. Намазов. Жарқўргон навлари иштироқида F ₂ да олинган ғўзанинг янги мураккаб турлараро дурагайларининг цитологик хусусиятлари.....	13
Мелиев С.К., Бабоев С.К., Боҳодиров У.Ш. Юмшоқ буғдойнинг жаҳон генетик коллекциясидан республикамизнинг шўрланган тупроқларига бардошли намуналарини танлаш.....	17
Наврузов С.Б., Ҳашимова Н.Р., Ахунов А.А. Табиий асосли даг-1 препаратини тошкент вилояти тупроқ-икклим шароитида ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири	21
Д.М.Умиров ¹ , Б.Х.Аманов ² , Б.К.Мадартов ¹ . Иssiқхона ва дала шароитида таҳлил қилинган бошлангич манба, F ₁ , F ₁ B ₁ бекросс ўсимликларида битта кўсақдаги паҳта вазнининг ирсийланиши..	25
Умедова М.Э, Ҳусенов Н.Н, Тураев О.С. Ғўзанинг сўрувчи заракунандаларига чидамли янги навларини яратишда замонавий молекуляр-генетик усуллардан фойдаланиш.....	28
Холмурадова М.М, Тураев О.С, Нормаматов И.С, Набиев С.М, Кушанов Ф.Н. Ғўза УАК популяцияси бошлангич намуналарининг оптималь ва сув танқислиги шароитида ўрганилган морфо-биологик кўрсаткичлари таҳлили.....	32
Нормаматов И.С., Тураев О.С., Холмурадова М.М., Ҳусенов Н.Н., Макамов А.Х., Умедова М.Э., Йўлдашова Н.З. Ўрта толали (<i>G.hirsutum</i>) ғўза навларининг морфо-биологик белгиларига шўрланишнинг таъсири.....	38

Ўсимликларни ҳимоя қилиш

И.Р. Сайдов. Трипс (<i>Pleothripidae</i>) оила вакилларини фаунаси, экологияси ва популяциясининг шаклланиши	42
Аблазова М. М., Зупарова Д. М. Энтомопатоген замбуруғларнинг юқори вирулентликка эга штаммларини танлаш мезонлари.....	45
У.Х.Рахимов, У.К.Хамираев. Асс-Форте, 80% с.п. фунгицидини картошканинг фитофтороз ва ризоктониозига таъсири.....	47
Ш.М.Саломов, М.А.Зупаров, М.С.Мамиев, А.А.Хакимов, Ф.У.Кучкоров, У.Н.Рахмонов, М.М.Аблазова. Тошкент вилояти иссиқхоналарида <i>Botrytis</i> туркуми замбуруғларини тарқалиши.....	49
А.Р.Анарбоев, Н.Қ. Сайимов, Д.Т.Мамаджанова. Олма қон шираси (<i>Eriosoma lanigerum hausm</i>) га каршикурашда замонавий инсектицидларни самараదорлиги.....	53
Д.Т.Турдиева, С.Н.Юлдашева, М.Б.Тўрабоев. Наъматакнинг занг касаллигига қарши кураш усуслари.....	55
Зупарова Д. М., Аблазова М.М. Энтомопатоген замбуруғларнинг патогенлик ва вирулентлик хусусиятлари.....	57

Мевачилик ва сабзавотчилик

Т.М. Азимбаев, С.И. Дусмуратова. Гидропоника иссиқхоналарида етиширишга мос қовун нав намуналарини танлаш.....	60
Д.У.Жанакова, И.Т.Нормуратов. Корагатнинг Ўзбекистонга интродукция қилинган янги навларини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги.....	62
Абдуллаев Ф.Т., Жамолова Л.Ю., Тураева Г.С., Умматова Х.С.....	65
Й.Хурматов, Ш. Дехқонова, Н. Зайнобитдинов, Ф.Турдиева, Н.Юсупов. Пиёзни қуритишга тайёрлаш жаҳаёнини ўрганиш ва пиёз қуритишни такомиллаштириш.....	69
М.Р.Шерматов, М.Б. Содикова. Анжир парвонаси (<i>Lepidoptera choreutidae</i>)нинг биологияси....	72

Дехқончилик ва мелиорация

Ч.В.Тошпўлатов М.А.Тўхтамишев. Маккажўхорини сугоришда паррандачилик корхоналарининг чиқинди сувларидан фойдаланиш масалалари.....	76
--	----

Г.Н.Абдалова, С.Э.Ганиев, Ж.Э.Эшонқулов. Типик бўз тупроқлар шароитида “бухоро-102” ғўза навида сугориш ва озиқлантириш тартибларининг тупроқнинг агро-физик хоссаларининг ўзгаришига таъсири.....	78
--	----

Аширов Ю.Р., Исаев С.Х. Оч тусли бўз тупроқлар шароитида ғўзани сугоришнинг пахта ҳосилдорлигига таъсири.....	80
---	----

С.Ганиев, Д.Боқиев., Турли даражада шўрланган бўз-ўтлеки тупроқларда ғўзани озиқлантириш шароитларини пахта ҳосилига таъсири.....	84
---	----

Насиров Б.С. Гербицид ҳосил беришнинг гаровидир.....	87
--	----

Агрокимё ва тупроқшунослик

Мураткасимов А.С., Гафурова Л.А. Лалми типик бўз тупроқларнинг механик таркиби ва агрокимёвий хоссалари (фаллаорол тумани мисолида).....	90
--	----

Кўзиев Ж. М. Типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий хоссаларини даврий ўзгариш сабаби.....	93
---	----

Турғунов М.М., Курвантаев Р. Лазерли текислаш таъсирида тупроқда гумус ва озиқа моддалар миқдорининг ўзгариши.....	100
--	-----

Мураткасимов А.С. Эрозияга учраган лалми типик бўз тупроқларнинг умумий физик хоссалари.....	104
--	-----

М.Э.Сайдова, М.И.Усмонова. Қорақалпоғистон Республикаси шўрланган сүғориладиган тупроқларининг агрокимёвий кўрсаткичлари.....	106
---	-----

М.Э. Сайдова. Чўл минтакаси сүғориладиган тупроқларида оксидаза ферментлари фаоллиги.....	110
---	-----

С.Қ.Очилов, М.М.Тошқўзиев. Қашқадарё воҳаси бўз тупроқлар минтакаси сүғориладиган гидроморф ва ярим гидроморф тупроқларнинг кимёвий хоссалари.....	114
--	-----

М.М.Тошқўзиев, С.Қ. Очилов. Қашқадарё воҳаси бўз тупроқлар минтакаси сүғориладиган оч тусли ва типик бўз тупроқларнинг кимёвий хоссалари.....	118
---	-----

Ўрмончилик

И.С.Содиков, А.Х.Ўроқов, Б.К.Касимхаджаев, Э.Т.Бердиев, М.З.Холмуротов. Автомобиль йўлларини қўкаламзорлаштириш тизимини такомиллаштириш муаммолари.....	124
--	-----

Зоотехния ва ветеринария

Каримов Б.К. Амударьё куйи оқимида балиқчилик соҳасининг иқлим ўзгариши, сув тақчиллиги ва шўрланиши шароитидаги аҳволи ва келажакда барқарор ривожлантириш йўллари.....	132
--	-----

¹ Кузметов А.Р., ² Тошов Ҳ.М., ² Эсанов Ҳ.Қ., ¹ Исройлов С.У. Бухоро вилояти девхона кўлининг юксак сув ўсимликлари тур таркиби ва уларнинг аҳамияти.....	138
---	-----

Қишлоқ хўжалигига механизациялаш ва электрификациялаш

Ш.Ш.Рўзиев, З.Бўриев. Машиналарнинг ишлаш жараёнида пружиналарнинг параметрларини ўзгариши.....	143
---	-----

Қишлоқ хўжалигига инновацион технологиялар

Г.Н.Бўрибоева, Т.А.Хўжақулов. Статистик функцияларни таҳлил килиш сув сифати кимёвий индексларини тақсимлаш.....	147
--	-----

Ш.Т.Якубжанова, Х.Н. Хайдарова. Фарғона вилояти агротуристларининг туристлик имкониятлари.....	150
--	-----

Муаммолар. Мухокамалар. Факлар.

Ашурова Ф. А. Фоявий таҳдидлардан ҳимояланишда муқаддас динимизнинг ўрни.....	154
---	-----

Қисқа ахборотлар

О.А.Мамадиев, С.У.Исройлов, С.О.Шодиев. Наслдор тана ва ғунажинларни жадал ўстириш.....	157
---	-----

С.Н.Наврузов, Ф.М.Жумаева. Етиштириладиган пиллаларнинг ипакчанлиги.....	159
--	-----

Юсупова М. С. Аграр таълим тизимида касбий харакат кўнгикмаларини ўргатиш технологияси...	160
---	-----

Ш.Курбонова, А.Кахаров. Турли зот ва зотдорликдаги буқачаларнинг тери хомашёси.....	162
---	-----

Б.Абдалимов, А.А.Файзиев. Фермер хўжалигининг иқтисодий кўрсаткичларини математик моделлаштириш ёрдамида таҳлили.....	164
---	-----

ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

Журнал основан в апреле 2000 г.

Выходит 4 раза в год

Ташкент

№ 2 (76) 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Селекция, генетика и семеноводство

Х.А.Муминов, Б.М.Гаппаров. Внутри и межвидовые филогенетические отношения некоторых подвидов <i>G.herbaceum</i> L. и <i>G.arboreum</i> L.	7
С.К.Матякубов, М.Ф.Санамьян, Ш.У.Бобоухаев, Ш.Э.Намазов. Некоторые цитогенетические особенности гибридов F ₂ , полученных с участием сорта хлопчатника Султан.....	10
М.Ф. Санамьян, С.К. Матякубов, Ш.У. Бобоухаев, Ш.Э. Намазов. Цитологические особенности новых сложных межвидовых гибридов хлопчатника, полученных в F ₂ с участием сорта Жаркурон.....	13
Мелиев С.К., Бабоев С.К., Боходиров У.Ш. Отбор толерантных образцов пшеницы к засоленным условиям.....	17
Наврузов С.Б., Хашимова Н.Р., Ахунов А.А. Влияние препарата природного происхождения ДАГ-1 на рост, развитие и урожайность хлопчатника в почвенно-климатических условиях Ташкентской области.....	21
Д.М. Умиров ¹ , Б.Х. Аманов ² , Б.К.Мадартов ¹ . Наследование веса одного коробочка растений беккросса F ₁ , F ₁ B ₁ , исходных анализированных материалов в тепличных и полевых условиях.....	25
Умедова М. Э, Хусенов Н.Н., Тураев О.С. Создание новых сортов хлопчатника использование современно-молекулярный-генетических методов устойчивых к сосущими вредителями.....	28
Холмурадова М.М, Тураев О.С, Нормаматов И.С, Набиев С.М, Кушанов Ф.Н. Анализ морфобиологических показателей у исходных образцов ГАК популяции хлопчатника в оптимальной и засушливой среде.....	32
Нормаматов И.С., Тураев О.С., Холмурадова М.М., Хусенов Н.Н., Макамов А.Х., Умедова М.Э., Йўлдашова Н.З. Влияние соление в морфобиологических признаков у среднестебельного хлопчатника (<i>G.hirsutum</i>).....	38

Защита растений

И.Р. Сайдов. Развитие популяции, экология, фауна представителей семейства Трипсов (<i>Pleothripidae</i>).....	42
Аблазова М. М., Зупарова Д. М. Патогенные и вирулентные особенности энтомопатогенных грибов.....	45
У.Х.Рахимов, У.К.Хамираев. ACC-Форте 80% с.п. против фитофтороза и ризоктониоза картофеля.....	47
Ш.М.Саломов, М.А.Зупаров, М.С.Мамиев, А.А.Хакимов, Ф.У.Кучкоров, У.Н.Рахмонов, М.М.Аблазова. Распространение грибов рода <i>botrytis</i> в тепличных хозяйствах Ташкентской области.....	49
А.Р.Анарбоев, Н.К. Сайимов, Д.Т.Мамаджанова. Эффективность современных инсектицидов при сопротивлении яблочного сока (<i>Eriosoma Lanigerum haustm</i>)	53
Д.Т.Турдиева, С.Н.Юлдашева, М.Б.Турабоев. Методы борьбы против ржавчины шиповника.....	55
Зупарова Д. М., Аблазова М.М. Патогенные и вирулентные особенности энтомопатогенных грибов.....	57

Плодоводство и овошеводство

Т.М. Азимбаев, С.И. Дусмуратова. Подбор сортообразцов дыни для выращивания в гидропонных теплицах.....	60
Д.У.Жанакова, И.Т.Нормуратов. Рост, развитие и продуктивность новых интродукционных сортов смородины в Узбекистане.....	62
Абдуллаев Ф.Т., Жамолова Л.Ю., Тураева Г.С., Умматова Х.С. Противовирусная активность хитозана и его комплекса с глициризиновой кислотой в растениях.....	65
Й.Хурматов, Ш.Дехқонова, Н.Зайнобитдинов, Ф.Турдиева, Н.Юсупов. Изучение процесса приготовления лука для сушки и улучшение сушки лука.....	69
М.Р. Шерматов, М.Б. Содикова. Биология <i>Lepidoptera choreutidae</i>	72

Земледелие и мелиорация

Ч.В.Тошпўлатов, М.А.Тўхтамишев. Вопросы использования сточных вод от птице фабрикй на орошение кукурузы.....	76
Г.Н.Абдалова, С.Е.Ганиев, Ж.С.Эшонқулов. Влияние ирригационных и кормовых процедур на изменение агрофизических свойств почвы у саженцев типа Бухара-102 в типичных почвах.....	78
Аширов Ю.Р., Исаев С.Х. Влияние орошения на урожайность хлопчатника в условиях светлых сероземных почв.....	80
С.Ганиев, Б.Избосаров. Влияние условия питания на урожайность хлопчатника на различной степени засолённых сероземно-луговых почвах.....	84
Насиров Б.С. Гербицид залог урожая.....	87

Агрохимия и почвоведение

Мураткасимов А.С., Гафурова Л.А. Механический состав и агрохимические свойства типичных сероземов (на примере Галляаралского района).....	90
Кузиев Ж. М. Агрохимическое состояние типичных ледяных почв причина периодического изменения свойств.....	93
Тургунов М.М., Курвантаев Р. Изменение содержание гумуса и питательных элементов под влиянием лазерной планировки в орошаемых луговых почвах.....	100
Мураткасимов А.С. Агрофизические свойства эрозионных багарных типичных сероземов.....	104
М.Э. Сайдова, М.И.Усмонова. Агрохимические показатели засоленных орошаемых почв Каракалпакии.....	106
М.Э.Сайдова. Активность ферментов оксидоредуктаз в орошаемых почвах пустынной зоны.....	110
Очилик С.К., Тошкузиев М.М. Химические свойства орошаемых гидроморфных и полугидроморфных почв серозёмного пояса Кашкадарьинского оазиса.....	114
Тошкузиев М.М, Очилик С.К. Химические свойства орошаемых светлых и типичных сероземов серозёмного пояса Кашкадарьинского оазиса.....	118

Лесоводство

И.С.Содиков, А.Х.Ўроков, Б.К.Касимхаджаев, Э.Т.Бердиев, М.З.Холмуротов. Проблемы совершенствования системы озеленения автомобильных дорог	124
---	-----

Зоотехния и ветеринария

Каримов Б. К. Состояние сектора рыбного хозяйства в регионе нижнего течения реки Амударья в условиях изменения климата, дефицита воды, салинизации и пути дальнейшего устойчивого развития.....	132
Кузметов А.Р., Тошов X.М., Эсанов X.К., Истроилов С.У. Организация организации южного кавказа и их путь к бухарской области.....	138

Механизация и электрификация в сельском хозяйстве

Ш.Ш.Рўзиев, З.Бўриев. Изменение параметров пружины при работе машин.....	143
--	-----

Иновационные технологии в сельском хозяйстве

Г.Н.Бурибоева, Т.А.Хужакулов. К анализу статистических функций распределения химических показателей качества воды.....	147
Ш.Т.Якубжанова, X.Н. Хайдарова. Туристические возможности агротуристического района Ферганы.....	150

Проблемы. Суждения. Факты.

Ашуревой Ф. А. Место святой религии в защите от идеальных угроз.....	154
--	-----

Краткие сообщения

О.А.Мамадиев, С.У.Истроилов, С.О.Шодиев. Интенсивный рост здорового тела и тело.....	157
С.Н.Наврузов, Ф.М.Жумаева. Шоконосность выращиваемых коконов.....	159
Юсупова М. С. Технология обучения навыкам профессионального поведения в системе аграрного образования.....	160
Ш.Курбонова, А.Кахаров. Кожаное сырье бычков разных пород и пород.....	162
Б.Абдалимов, А.А.Файзиев. Эластичность функции и ее применение в экономическом анализе..	164

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА ВА УРУГЧИЛИК

УЎК 633:511:575:22.2

Х.А.МЎМИНОВ, Б.М.ГАППАРОВ

G.HERBACEUM L. ВА G.ARBOREUM L. АЙРИМ КЕНЖА ТУРЛАРИНИНГ ТУРИЧИ ҲАМДА ТУРЛАРАРО ФИЛОГЕНЕТИК МУНОСАБАТЛАРИ

Мақолада *Gossypium* L. турқумининг полиморф бўлган *G.herbaceum* L. ва *G.arboicum* L. турларига мансуб туричи ва турларабо F₀ дурагай кўсакларида уруғ тутилиши бўйича маълумотлар берилган. Тадқиқотлар натижасида, баъзи комбинациялардан ташқари, *G.herbaceum* L. ва *G.arboicum* L. кенжаси тур ва шаклларини ўзаро ва турларабо чатиштирилганда дурагай кўсакларнинг тутилиш фоизи асосан паст бўлиши, улардаги тўлиқ уруғларнинг тутилиши фоизи эса юкори кўрсаткичларга эга бўлиши аниқланди. Бундай ҳолат табиий шароитда тур ва шаклларнинг тозалигини сақлашга хизмат қилувчи генетик тўсиқлар мавжудлигидан далолат беради.

Таянч сўзлар: *tur*, *кенжаси тур*, *шакл*, *ёввойи*, *рудерал*, *тропик*, *маданий*, *туричи*, *турларабо*, *дурагай*.

КИРИШ

Дунё қишлоқ хўжалигининг тобора ошиб бораётган талабларини кондириш, бу ўринда яратилаётган ёзга навларининг ташки муҳитнинг абиотик ва биотик омилларига чидамлилик имкониятларини ошириш ҳамда иктиносиди афзаллигини таъминлашда ёззанинг (*Gossypium* L. туркуми) табиатдаги мавжуд биохилма-хиллигининг ноёб генетик ресурсларидан рационал фойдаланиш муҳимdir. Маданий диплоид турларининг туричи хилма-хилликлари ва шакллари тезпишарлик, ҳосилдорлик ҳамда зааркунанда ҳашоратларга, ташки муҳитнинг стресс омилларига чидамлиликнинг генетик имкониятларига эга бўлиб, улардан фойдаланиш бугунги кун пахтачилик соҳасидаги бир қатор долзарб муаммолари ечимини топища мухим ўрин тутади.

Маълумки, ёзга турларини туричи ва турларабо чатиштиришда дурагай кўсакларнинг ҳамда дурагай кўсаклардаги уруғларнинг тутилиш самарадорлиги, эришилган натижаларнинг ижобий ёки салбий бўлиши чатиштиришда иштирок этган турларнинг филогенетик жиҳатдан узок ёки яқинлигига ҳамда бошланғич манбаларнинг физиологик хусусиятларига боғлиқдир [2; 4; 5; 6; 10].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Иzlанишлар учун дастлабки манба сифатида Ўзбекистон Фанлар Академияси Генетика ва

ўсимликлар экспериментал биологияси институти ёзга генофондида мавжуд *G.herbaceum* L. турининг ёввойи *subsp. africanum*; рудерал *subsp. pseudoarboicum*, *subsp. pseudoarboicum f.harga*; тропик *subsp. frutescens*; маданий *subsp. euherbaceum* 377 шакли ҳамда *G.arboicum* L. турининг ёввойи *subsp. obtusifolium*; рудерал *subsp. perenne*; тропик *subsp. neglectum*, *subsp. neglectum f.sanguineum* шакларидан дастлабки манба сифатида фойдаланилди.

Тадқиқотни амалга ошириш учун куйидаги услублардан фойдаланилди [3; 9]: туричи дурагайлаш; турларабо дурагайлаш; киёсий морфология ва генетик ва статистик таҳлил.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

G.herbaceum L. ва *G.arboicum* L. турларининг туричи хилма-хилликларининг ўзаро ҳамда турларабо филогенетик муносабатларини аниқлаш, ўрганилаётган кенжаси тур ва шаклларнинг бир-бирига мутаносиблик даражаларини, туричи ва турларабо дурагайлар олиш имкониятларини аниқлаш мақсадида кенг миқёсдаги чатиштириш ишлари олиб борилди.

G.herbaceum L. туричи кенжаси турларини ва шаклларини ўзаро чатиштириш натижасида 4 та дурагай комбинациялари олинди. Бунда дурагай кўсакларнинг тутилиши 44,4-100,0 % ни, дурагай кўсаклардаги тўлиқ уруғлар тутилиши эса 16,2-83,3

% ни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич *subsp. pseudoarboРЕum f. hарга x subsp. frutescens* комбинациясида кузатилиб, дурагай кўсаклар тутилиши -100,0 % ни, улардаги тўлиқ уруғлар тутилиши эса -93,5 % ни ташкил этди. Энг паст кўрсаткич *subsp. pseudoarboРЕum x subsp. frutescens* дурагай комбинациясида қайд этилди (1-жадвал).

Бунда дурагай кўсаклар тутилиш фоизи -44,4 % ни, улардаги тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи эса -52,9

% ни ташкил этгани уларнинг бир-биридан филогенетик жиҳатдан узоқлигини кўрсатди.

Адабиёт манбаларида келтирилишича, филогенетик жиҳатдан яқин бўлган тур ва шаклларда генератив органларининг тузилишидаги фарқлар ва ташки мухит таъсири механик вазифасини бажариб, чатишувчанлик даражасини пасайишига сабаб бўлади [1; 7; 8].

1-жадвал

G.herbaceum L. ва G.arboreum L. туричи шаклларининг ўзаро ва турлараро чатиштириш асосида олинган F₀ дурагай кўсакларининг ҳамда улардаги тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи кўрсаткичлари


№	Туричи ва турлараро дурагай комбинациялари	Чатиштиришлар сони, дона	Олинган дурагай кўсак сони, дона	Дурагай кўсакларининг тутилиш % и	Дурагай кўсаклардаги тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи, %			
					$\bar{x} \pm S \bar{x}$	limit	S	V %
Туричи F₀ дурагай кўсаклари G.herbaceum L. x G.herbaceum L.								
1	<i>subsp. africanum x subsp. frutescens</i>	8	4	50,0	$17,6 \pm 0,5$	16,2 - 20,1	1,8	10,1
2	<i>subsp. pseudoarboРЕum x subsp. frutescens</i>	9	4	44,4	$52,9 \pm 3,1$	45,3 - 66,7	10,0	19,0
3	<i>subsp. pseudoarboРЕum f. hарга x subsp. frutescens</i>	5	5	100,0	$93,5 \pm 1,9$	83,3 - 100,0	6,2	6,6
4	<i>subsp. euherbaceum 377 x subsp. frutescens</i>	7	4	57,1	$81,0 \pm 1,3$	76,2 - 85,7	4,3	5,3
Туричи F₀ дурагай кўсаклари G.arboreum L. x G.arboreum L.								
5	<i>subsp. perenne x subsp. neglectum</i>	18	6	33,3	$73,3 \pm 2,1$	67,3 - 86,7	6,8	9,3
Турлараро F₀ дурагай кўсаклари G.herbaceum L. x G.arboreum L.								
6	<i>subsp. obtusifolium x subsp. pseudoarboРЕum f. hарга</i>	12	4	33,3	$86,7 \pm 3,4$	73,3 - 100,0	10,9	12,5
7	<i>subsp. africanum x subsp. neglectum</i>	10	5	50,0	$62,5 \pm 1,1$	56,5 - 65,3	3,4	5,5
8	<i>subsp. obtusifolium x subsp. frutescens</i>	15	3	20,0	$90,0 \pm 0,6$	88,0 - 92,1	2,0	2,2
9	<i>subsp. pseudoarboРЕum x subsp. neglectum</i>	12	4	33,3	$54,6 \pm 3,3$	73,3 - 100,0	10,7	19,6
10	<i>subsp. perenne x subsp. frutescens</i>	8	4	50,0	$93,3 \pm 0,6$	90,3 - 95,0	2,1	2,2
11	<i>subsp. neglectum x subsp. frutescens</i>	10	6	60,0	$68,0 \pm 2,9$	60,9 - 86,7	9,3	13,7
12	<i>subsp. neglectum f. sanguineum x subsp. frutescens</i>	8	6	75,0	$86,5 \pm 2,4$	80,5 - 95,2	7,6	8,8

G.arboreum L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дурагайлаш ишлари олиб борилганида (*subsp. perenne x subsp. neglectum*) дурагай кўсакларининг тутилиш фоизи -33,3 % ни ташкил этгани аникланди. Дурагай кўсакларда тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи ўртача -73,3 % эканлиги қайд этилди. *G.herbaceum L.* ва *G.arboreum L.* туричи хилма-хилликларини ўзаро чатиштириш натижасида

7 та турлараро дурагайлар комбинациялари олиниб, дурагай кўсаклар ва улардаги тўлиқ уруғлар тутилиши фоизи бўйича турлича натижалар кузатилди. Тропик *subsp. neglectum f.sanguineum* ва *subsp. frutescens* шаклларини ўзаро чатиштириш натижасида олинган дурагай кўсакларининг тутилиши -75,0 % ни ташкил этиб, улардаги тўлиқ уруғлар тутилиши эса ўртача -86,5 % га эга эканлиги

аниқланди. Турлараро ёввойи (*subsp. obtusifolium*) ва тропик (*subsp. frutescens*) шаклларини ўзаро чатиштиришда паст кўрсаткичлар қайд этилиб, дурагай кўсаклар тугилиш фоизи -20,0 % ни, улардаги тўлик уруғлар тугилиш фоизи эса юқори бўлиб, ўртача -90,0 % ни ташкил этди.

Олинган натижалар чатиштиришда иштирок этган туричи вакилларининг филогенетик жиҳатдан яқинлигини, шу билан бирга, дурагай кўсаклар тугилиш фоизи пастилиги эса табиий шароитда тур ва шаклларнинг тозалигини сақлашга хизмат қилувчи генетик тўсиқлар мавжудлигидан далолат беради.



1-расм. *G.herbaceum* L. ва *G.arboreum* L. айrim туричи генетик хилма-хилликларининг филогенетик схемаси.

ХУЛОСА

Шундай килиб, *G.herbaceum* L. ва *G.arboreum* L. туричи хилма-хилликларини туричидан ва турлараро дурагайлаш натижасида, уларнинг филогенетик жиҳатдан узок-яқинлик даражаси аниқланди. *G.herbaceum* L. турининг ёввойи (*subsp. africanum*) кенжа тури тропик (*subsp. frutescens*) кенжа турига нисбатан узоклиги, рудерал *subsp.*

pseudoarboareum f.harga шакли тропик (*subsp. frutescens*) кенжа турига нисбатан яқинлиги аниқланди.

G.herbaceum L. тропик (*subsp. frutescens*) кенжа тури *G.arboreum* L. турларнинг рудерал (*subsp. perenne*), тропик (*subsp. neglectum f.sanguineum*) кенжа турларига нисбатан яқинлиги аниқланди.

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти

Қабул қилинган вақти
14 марта 2019 йил

Адабиётлар

1. Агаджанян А.М. Генетика систем внутривидовой несовместимости у цветковых растений // Усп. совр. биол. – Москва, 1990. – Т. 110. – № 3 (6). – С. 323-327.
2. Банникова В.П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений // Киев: Наукова думка, 1975. – С. 47-55.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта // Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Линскенс Г.Ф. Реакция торможения при несовместимом опылении и ее преодоление // Физиология растений. – 1973. – Т. 20. – Вып.1. – С. 192-202.
5. Муминов Х.А., Эрназарова З.А., Ризаева С.М. Скрещиваемость и завязываемость семян при внутривидовой гибридизации разновидностей и форм видов *G.herbaceum* L. и *G.arboreum* L. // Узб. биол. журн.- Т., 2008.- Спец. выпуск.- С. 21-23.
6. Сирожидинов Б.А. Австралия ва Хинди-Хитой фўза турларининг филогенетик муносабатлари: Дисс. б.ф.б.ф.д (PhD).- ЎзР ФА ГваЎЭБИ, Тошкент: 2017. – Б. 30-38.
7. Уильямс У. Генетические основы и селекция растений // Москва: Колос, 1968. – 448 с.

8. Эрназарова З.А. Межвидовое родство С-геномных хлопчатников и их филогенетические взаимоотношения с Д-геномными видами: Дисс... канд. биол. наук. – Ташкент: ИГиЭБР АН РУз, 1998. – 153 с.

9. Beil G.E., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters sorghum // Jow State J. of Sci. – 1965. – № 3. – P. 35-37.

10. Sirojiddinov B.A., Abdullaev A.A. Hindi-Xitoy va Avstraliya g‘o‘za turlarining turlararo F₀ avlod duragaylarida ko‘sak va urug‘ tughilish darajasi // O‘zb. biol. jur.- Toshkent, 2014.-№ 4.- B. 45-48.

Х.А.Муминов, Б.М.Гаппаров

Внутри и межвидовые филогенетические отношения некоторых подвидов

***G.herbaceum* L. и *G.arboreum* L.**

В статье приведены данные по завязываемости коробочек F₀ при внутри- и межвидовой гибридизации полиморфных видов *G.herbaceum* L. и *G.arboreum* L. рода *Gossypium* L. В результате исследований установлено, что при внутри- и межвидовой гибридизации подвидов и форм *G.herbaceum* L. и *G.arboreum* L. процент завязываемости гибридных коробочек в основном является низким, а процент завязываемости полноценных семян высоким. Данное явление свидетельствует о наличии генетического барьера, который в свою очередь служить сохранению чистоты видов и форм в естественных условиях.

КН.А.Муминов, В.М.Гаппаров

Intra- and interspecific phylogenetic relationships of some subspecies of

***G.herbaceum* L. and *G.arboreum* L.**

The article presents data of the ovary of the hybrid bolls from intra - and interspecific hybrids of F₀ related to the polymorphic species *G.herbaceum* L. and *G.arboreum* L. of the genus *Gossypium* L. As a result of researches it was established, with intra - and interspecific hybridization of subspecies and forms of *G.herbaceum* L. and *G.arboreum* L. the percentage of the ovary of the hybrid bolls were mostly low, and the percentage of the full ovary of the seeds were high. This phenomenon indicates the presence of a genetic barrier, which in turn serve to preserve the purity of the species and forms in natural conditions.

УДК 633.511:576.312.3

С.К.МАТЯКУБОВ¹, М.Ф.САНАМЬЯН², Ш.У.БОБОХУЖАЕВ², Ш.Э.НАМАЗОВ¹

**ҒЎЗАНИНГ СУЛТОН НАВИ ИШТИРОКИДА ОЛИНГАН F₂ ДУРАГАЙЛАРДА
АЙРИМ ЦИТОГЕНЕТИК ҲУСУСИЯТЛАРИ**

Ғўзанинг Султон нави иштирокида чатиштириб олинган F₂ дурагайларида цитологик тадқиқотлар олиб борилди. Иzlанишлар давомида 17 та тажриба вариантидан мейотик индекси фақатгина битта вариантида паст кўрсаткичга эга бўлди, бу эса мазкур вариантда мейоз жараёнининг бузилиш бўлганидан далолат беради ва бузилиш спорада боскичидаги ҳам кузатилди. Чангчиларнинг пуштлилик даражаси ҳам таҳлил қилинганда иккита дурагай вариантида чангчиларни пуштлилик даражаси пастлигини кўрсатди ва яна иккита вариантда чангчиларнинг пуштлилик даражаси юқорилиги билан ажралиб турди.

Калит сўзлар: ё́за, турлараро дурагай, тетрада, микроядро, мейотик жараён, чангчи, пуштлилик даражаси.

КИРИШ

Маълумки, ҳозирги даврда ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навлари, асосан, геномичи дурагайлари ва навлараро чатиштириш орқали яратилган бўлгани учун, уларга хос қимматли-хўялиларни, селекцион услублардан фойдаланган ҳолда, тубдан ўзгартириш қийин. Мураккаб ғўза турлараро 3-4-5 турларни

чатиштириш тадқиқотларида (*G.hirsutum* L., *G.barbadense* L., *G.arboreum* L., *G.thurberi* Tod., ва *G.raimondii* Ulbr.) янги ва ахамиятли турлараро тизмалар, оиласалар ва ғўза навлари яратилган бўлиб улар ғўзанинг амалий селекцияси ва генетик селекцион тадқиқотларда бошланғич материал сифатида хизмат кила олиши мумкин [2,3]. *G.hirsutum* L. туричи хилма-хилликларининг ҳамда *G.*

mustelinum Miers ex Watt. турининг ва шу билан бирга уларнинг ўзаро F_1 ва F_2 авлод дурагайларида чанг ҳаётчанлигини ўрганган ҳолда, *G. hirsutum* L. турининг ёввойи, ярим ёввойи ва маданий хилма-хилликларида асосан юкори кўрсаткичлар қайд қилиниб, бунда туричи хилма-хилликлари 95,8% дан то 99,1% гача бўлган натижаларни намоён қилган [6].

Маълумки, ғўза турлари чангдонлари ва чангдондаги чанг доначаларининг сонини аниқлаш орқали генетик қардошлигини ҳамда алоҳида мустақил тур эканлигини кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланади [1,4,5].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Тажрибалар 2018 йилда Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етишириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтида ва Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ғўза генетикаси лабораторияси билан ҳамкорликда олиб

борилди. Тадқиқот обьекти сифатида турли йилларда олинган селекцион оиласлар ва тизмалари ҳамда уларни чатиштириш асосида олинган айrim дурагай комбинациялардан фойдаланилди. Олинган натижалар “Sporada” ва “Pollen” дастури ёрдамида статистик таҳлил қилинди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА ТАҲЛИЛИ

Мейознинг таҳлили 17 та ўрганилган дурагай авлодда юкори мейотик индекс маълумлигидан далолат бериб ($96,83\pm0,67\%$ дан $96,76\pm0,34\%$ гача), бу натижалар мейоз жараёнининг турғунлигидан далолат беради. Лекин, битта вариантдаги дурагай-комбинацияда (F_2 (F_{30} К-69 тип арб) x Султон) мейоз жараёнининг бузилиши юз бериб ундаги мейотик индекс $88,91\pm0,68$ кўрсаткичга эга бўлиб, микроядроли тетрадалар фоизи ҳам нормал кўрсаткичга нисбатан юкорилиги $0,28\pm0,11$ қайд этилди (1-расм, 1-жадвал).

1-жадвал

Султон нави иштирокида олинган F_2 дурагайларда спорадалар таҳлили

Дурагай комбинациялар	Умумий спорадалар сони, н	Мейотик индекс, %	Микроядроли тетраданинг, %
F_2 (Л-58) x Султон	4205	$98,86\pm0,16$	$0,19\pm0,07$
F_2 (Л-95) x Султон	3358	$98,33\pm0,22$	$0,03\pm0,03$
F_2 (Л-138) x Султон	1332	$99,10\pm0,26$	$0,08\pm0,08$
F_2 (Л-158) x Султон	2745	$96,76\pm0,34$	$0,15\pm0,07$
F_2 (Л-200) x Султон	1600	$99,25\pm0,22$	$0,00\pm0,00$
F_2 (Л-588) x Султон	2400	$98,75\pm0,22$	$0,13\pm0,07$
F_2 (Л-12/06) x Султон	694	$96,83\pm0,67$	$0,14\pm0,14$
F_2 (Л-1979) x Султон	2828	$99,08\pm0,18$	$0,00\pm0,00$
F_2 (Л-470/1) x Султон	1306	$99,54\pm0,19$	$0,00\pm0,00$
F_2 (Л-175/248) x Султон	3413	$99,03\pm0,17$	$0,03\pm0,03$
F_2 (F_{16} К-58 тип арб) x Султон	2920	$98,94\pm0,19$	$0,00\pm0,00$
F_2 (F_{23} К-58 тип арб) x Султон	3234	$99,07\pm0,17$	$0,06\pm0,04$
F_2 (F_{30} К-69 тип арб) x Султон	2129	$88,91\pm0,68$	$0,28\pm0,11$
F_2 (F_{23} (Нам-1 x Сурхон 5) x Султон	854	$99,18\pm0,31$	$0,12\pm0,12$
F_2 (F_{32} (К-203x Нам-1) x Султон	2007	$97,66\pm0,34$	$0,10\pm0,07$
F_2 (ВСГ-2/06) x Султон	2110	$98,96\pm0,22$	$0,05\pm0,05$
F_2 МВГ -2 x Бухоро – 102	3306	$97,01\pm0,30$	$0,03\pm0,03$



1-расм. F_2 (F_{30} К-69 тип арб) x Султон дурагайнинг спорадалари: а) пентада; б) гексада.

Бу каби мейотик бузилишлар хромосомада кечадиган мейоз жараёнидаги бўлиб ўтадиган фазаларида бузилишлар бўлганидан далолат беради. Жумладан, анафаза жараёнидаги кутбларга томон

тарқалишида чалкашиш бўлганлиги сабабли кўп қутблилик юз беришидан келиб чиқади, деган хуласага келиш мумкин.

Ацетокармин ёрдамида чанг доналарини


бўялиши натижасида 15 та F_2 дурагай-комбинацияларда юкори пуштлилик даражаси аниқланиб ($90,16\pm1,01$ дан $97,52\pm0,68$ гача), қолган иккита F_2 (Л-200) x Султон ($86,69\pm1,28$) ва F_2 (Л-95) x Султон ($86,54\pm1,28$) дурагайлари кам миқдорда

пуштлилик даражаси билан ажралиб турди. Чанг хужайраларни кам пуштлилик даражасига эга бўялиши ташки муҳит омиллари таъсирининг натижаси бўялиши мумкин (2-расм, 2-жадвал).


2-жадвал

Султон нави иштирокида олинган F_2 дурагайларида чангчиларни пуштлилик таҳлили

Дурагай-комбинациялар	Умумий чангчи хужайралар сони, н	Чангчиларнинг пуштлилиги, %	Чангчиларнинг пуштесизлилиги, %
F_2 (Л-58) x Султон	524	$97,52\pm0,68$	$2,48\pm0,68$
F_2 (Л-95) x Султон	713	$86,54\pm1,28$	$13,46\pm1,28$
F_2 (Л-138) x Султон	578	$94,64\pm0,94$	$5,36\pm0,94$
F_2 (Л-158) x Султон	492	$94,51\pm1,03$	$5,49\pm1,03$
F_2 (Л-200) x Султон	706	$86,69\pm1,28$	$13,31\pm1,28$
F_2 (Л-588) x Султон	751	$95,74\pm0,74$	$4,26\pm0,74$
F_2 (Л-12/06) x Султон	490	$90,41\pm1,33$	$9,59\pm1,33$
F_2 (Л-1979) x Султон	864	$90,16\pm1,01$	$9,84\pm1,01$
F_2 (Л-470/1) x Султон	528	$94,32\pm1,01$	$5,68\pm1,01$
F_2 (Л-175/248) x Султон	690	$95,36\pm0,80$	$4,64\pm0,80$
F_2 (F ₁₆ К-58 тип арб) x Султон	962	$92,52\pm0,85$	$7,48\pm0,85$
F_2 (F ₂₃ К-58 тип арб) x Султон	701	$95,58\pm0,78$	$4,42\pm0,78$
F_2 (F ₃₀ К-69 тип арб) x Султон	622	$93,57\pm0,98$	$6,43\pm0,98$
F_2 (F ₂₃ (Нам-1x Сурхон-5) x Султон	713	$90,32\pm1,11$	$9,68\pm1,11$
F_2 (F ₃₂ (К-203 x Нам-1) x Султон	865	$96,65\pm0,61$	$3,35\pm0,61$
F_2 (ВСГ-2/06) x Султон	583	$96,65\pm0,61$	$3,35\pm0,61$
F_2 (МВГ -2) x Бухоро – 102	696	$92,53\pm1,00$	$7,47\pm1,00$



а



б

2-расм. F_2 дурагайларда пуштли ва пушсиз чангчилар:
а) F_2 (Л-200 x Султон); б) F_2 (Л-1979 x Султон).

ХУЛОСА

Шундай қилиб, Султон нави иштирокида олинган F_2 дурагайларининг мейотик индекси ва микроядроли тетрадалар фоизи кам бўлгандиги сабабли, мейотик турғунлик аниқланди. Фақатгина, битта F_2 (F₃₀ К-69 тип арб) x Султон дурагай-комбинациясида мейотик турғунлик пасайгандиги намоён бўлди. Шунингдек, ушбу F_2 дурагайларда чангчиларнинг пуштлилик даражаси юкори бўлиб,

фақатгина 2 та дурагай-комбинацияларда чангчиларнинг пуштлилик даражаси паст эканлиги аниқланиб, бундай пасайиш хромосома коънгологиясида бузилишлар содир бўлгандигидан далолат беради ҳамда ушбу дурагай-комбинацияларнинг кейинги бўғинларида цитогенетик тадқиқотларни давом эттириш тавсия этилади.

¹Пахта селекцияси, уруҷчилорига ва етишишии агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

²Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Қабул қилинган вақти
18 май 2019 йил

Адабиётлар

- Аманов Б.Х. Перуғўза турларининг генетик хилма-хилликлари ва морфо-хўжалик белгиларининг ирсийланиши.: Б.ф.н. дисс.- Ташкент. 2010.- Б. 34-42.
- Бобоев С.Ф., Муратов А., Намозов Ш.Э. Фўзанинг кўп геномли турлараро дурагайларида эртапишарлик белгисини шаклланиши // Фўзана ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликлари эволюцион ва

селекцион қирралари номли халқаро илмий конф. материаллари. Тошкент. ФАН. 2005. С.31-32.

3. Бобоев С., Намазов Ш.Э., Муратов А. Фўзанинг янги кўп геномли турлараро дурагайларида тола сифат кўрсаткичларининг ирсийланиши // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: Материалы Международной научно-практической конференции. Ташкент. 2006. С.67-68.

4. Курязов З.Б. Афро-Осиё ғўза турларининг ўзаро генетик қардошлиги ва Америка ғўзаси *G. raimondi* Ulbr. билан бўлган филогенетик муносабатлари.: Автореф. дис. канд. биол. наук.-Тошкент: ЎзР ФА ГваЎЭБИ. 2002.- Б. 12-13.

5. Мўминов Х.А. Афро-Осиё ғўзаси (*G. herbaceum* L.) туричи намоёндалари ва уларнинг F_1 ўсимликларида битта гулдаги чангдонлар сони кўрсаткичлари // Қишлоқ хўжалик экинлари агробиологияси ютуклари, муаммолари ва истиқболлари: Респ. ил.-амал. конф. мат.- ЎзР ФА ГваЎЭБИ, 5 июн 2015.- Тошкент: Фан. 2015.-Б. 212-214.

6. Рафиева Ф.У., Эрназарова З.А. *G. hirsutum* L. Туричи хилма хилликлари ва *G. mustelinum* Miers ex Watt. тури иштирокида олинган F_1 ва F_2 авлод дурагайларида чанг ҳаётчанлиги // “Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари. Халқаро ил.ам.конф. ПСУЕАИТИ, 15-16 декабрь 2016.- Тошкент: 2016 йил. Б.146-149.

С.К.Матякубов, М.Ф.Санамъян, Ш.У.Бобохужаев, Ш.Э.Намазов

**Некоторые цитогенетические особенности гибридов F_2 , полученных с участием сорта хлопчатника
Султан**

Проведены цитологические исследования у гибридов F_2 , полученных с участием сорта хлопчатника Султан. В ходе исследования мейотического индекса гибридных растений 17 вариантов скрещиваний, только в одном варианте было найдено снижение этого показателя, что указало на нарушения мейоза, предшествующие стадии спорад. При анализе фертильности пыльцы у гибридных растений двух вариантов скрещиваний были обнаружены сниженные показатели фертильности пыльцы, тогда как у растений других вариантов была найдена высокая фертильность пыльцы.

S.K.Matyakubov, M.F.Sanamyan, SH.U.Bobokhujayev, SH.E.Namazov

Some cytogenetic features of F_2 hybrides obtained with participation of Sultan variety cotton

Cytological studies have been carried out on F_2 hybrids obtained with the participation of cotton variety Sultan. In the course of the study of the meiotic index in hybrid plants of 17 variants of crosses, only one variant found a decrease in this index, which indicated violations of meiosis preceding the sporadic stage. When analyzing the fertility of pollen in hybrid plants of the two variants of crossing, reduced indicators of fertility of pollen were found, whereas in plants of other variants a high fertility of pollen was found.

УДК: 633.511:576.312.4

М.Ф. САНАМЬЯН, С.К. МАТЬЯКУБОВ, Ш.У. БОБОХУЖАЕВ, Ш.Э. НАМАЗОВ

**ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СЛОЖНЫХ МЕЖВИДОВЫХ
ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА, ПОЛУЧЕННЫХ В F_2 С УЧАСТИЕМ СОРТА
ЖАРКУРГОН**

Изучение цитологических особенностей новых сложных межвидовых гибридов хлопчатника, полученных с участием сорта Жаркургон, выявило некоторые различия между вариантами скрещиваний по уровню различных типов нарушений, таких как открытые и гетероморфные биваленты, неразделившаяся цитоплазма. Четыре комбинации скрещиваний характеризовались большей регулярностью мейотического деления на стадии метафаза I мейоза, поскольку у них формировалось 26 нормальных закрытых бивалентов.

Ключевые слова: хлопчатник, гибридизация, мейоз, коньюгация, хромосомы, нарушения.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, современные селекционные программы привели к обеднению генетических ресурсов растений, и в частности, пшеницы, поскольку во многих регионах наборы

культуриваемых сортов имеют узкую генетическую

основу. Поэтому был предложен термин «генетическая эрозия», под которым понимается процесс сокращения генофонда за счет потери местных и стародавних сортов, хотя многие из них богаты ценностями аллелями или уникальными генами [1].

В нашей стране проведено много исследований по межвидовой гибридизации хлопчатника с использованием диких диплоидных видов [2-4]. Эти работы дали важные результаты для выяснения генетических закономерностей эволюции хлопчатника и установления родственных связей между видами [5]. Однако, использование дикорастущих видов и их гибридов для обогащения генома хлопчатника новыми положительными признаками требует продолжения таких исследований. Поэтому целью данной статьи явилось выяснение цитологических особенностей новых сложных межвидовых гибридов, полученных в F₂, с участием сорта Жаркургон.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для изучения цитологических особенностей новых сложных межвидовых гибридов хлопчатника с участием сорта Жаркургон проводилась фиксация бутонов у гибридных растений F₂ в 17 вариантах скрещиваний.

Для цитологического анализа мейоза собирали молодые бутоны (2-4 мм) с каждого из подопытных растений и фиксировали в ацетоалкоголе в соотношении 3:7. В течение последующего времени материал разбирали по стадиям мейоза путем приготовления и просмотра под микроскопом временных давленных препаратов. Для дальнейшего изучения коньюгации хромосом оставлялись бутоны

на стадиях метафаза-I (МI) мейоза. Затем бутоны на стадии мейоза метафаза I с материнскими клетками пыльцы (МКП) окрашивали железо-ацетокармином. На временных давленых препаратах под световым микроскопом анализировали метафазы первого деления мейоза и учитывали характер коньюгации хромосом.

Цитологические исследования проводились с помощью микроскопов “Laboval” и AXIOSCOPE A.1 (Carl Zeiss, Германия) при увеличении объективов 10x, 20x, 100x и бинокулярной насадки. Микрофотографирование выполняли с помощью цифровой фотокамеры Mikroskopkamera AxioCam ERc5s. При экспонировании использовался зеленый светофильтр 3C-11-3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ коньюгации хромосом на стадии метафаза-I мейоза был проведен у гибридов F₂ в 11 комбинациях скрещиваний, тогда как в шести комбинациях скрещиваний бутоны на стадии МI мейоза найти не удалось (Табл.). Гибридные растения четырех вариантов скрещиваний: F₂ (Л-138 x Жаркургон); F₂ (МВГ -2 F9 (К-177 x Л-175)) x Жаркургон; F₂ (Л-58) x Жаркургон; F₂ (Л-1979) x Жаркургон характеризовались высокой мейотической стабильностью, поскольку на стадии МI мейоза у них формировалось 26 нормальных закрытых бивалентов, в то время как других ассоциаций хромосом обнаружено не было (Табл.). Однако, в отдельных МКП в варианте F₂ (Л-58) x Жаркургон наблюдались микроспоры с неразделившейся цитоплазмой (Рис. 1).

Таблица

Анализ коньюгации хромосом на стадии метафаза I мейоза у гибридов F₂, полученных от скрещиваний новых сложных межвидовых гибридов хлопчатника, с участием сорта Жаркургон

Материал	Среднее число на клетку		
	унивалентов	бивалентов	квадравалентов
F ₂ (F ₃₂ (К-203 x Наманган 1) x Жаркургон	-	26,00±0,00 (по 1 отк в 3х МКП)	-
F ₂ (F ₂₃ (Наманган 1xСурхон 5) x Жаркургон)	-	26,00±0,00 (по 1 отк в 3х МКП)	-
F ₂ (Л-138) x Жаркургон	-	26,00±0,00	-
F ₂ (Л-158) x Жаркургон	-	26,00±0,00 (по 1 отк в 3х МКП)	-
F ₂ (МВГ -2 F9 (К-177 x Л-175)) x Жаркургон	-	26,00±0,00	-
F ₂ (Л-58) x Жаркургон	-	26,00 ±0,00	-
F ₂ (Л-1979) x Жаркургон	-	26,00±0,00	-
F ₂ (Л-12/06) x Жаркургон	-	26,00±0,00 (по 1 отк в 2х МКП)	-
F ₂ (F ₂₃ К-58 тип арб) x Жаркургон	-	26,00±0,00 (по 2 гетероморфных бивалента в 4х МКП)	-
F ₂ (ВСГ-2/06) x Жаркургон	-	26,00±0,00 (1 отк в 1й МКП)	-
F ₂ (Л-588) x Жаркургон	-	26,00 ±0,00 (по 1 отк в 3х МКП)	-




Рисунок 1. Аномальный тип разделения цитоплазмы между соседними МКП в варианте F₁ (Л-58) x Жаркургон: а) неразделенная цитоплазма в профазе мейоза; б) неразделенная цитоплазма в метафазе мейоза.

Кроме того, в остальных изученных шести вариантах скрещиваний: F₂(F₃₂ (К-203 x Наманган 1) x Жаркургон; F₂ (F₂₃ (Наманган 1xСурхон 5) x Жаркургон); F₂(Л-158) x Жаркургон; F₂ (Л-12/06) x Жаркургон; F₂ (ВСГ-2/06) x Жаркургон и F₂ (Л-588) x Жаркургон на стадии МI мейоза в отдельных МКП наблюдались единичные открытые

биваленты (Рис. 2 а, б;) наряду с нормальными закрытыми бивалентами (Рис. 2 в). Присутствие открытых бивалентов в МКП у гибридных растений F₂ шести вариантов скрещиваний указало на отсутствие полной коньюгации хромосом из-за присутствия структурных различий между хромосомами скрещиваемых форм.




Рисунок 2. Конфигурации хромосом в метафазе-I мейоза у гибридных растений в варианте скрещивания: F₂ (F₂₃ (Наманган 1xСурхон 5) x Жаркургон): а) 26 бивалентов, из них три открытые; б) 26 бивалентов, из них два открытые; в) 26 нормальных бивалентов.

Помимо открытых бивалентов у гибридов F_2 в комбинации скрещиваний (F_{23} К-58 тип арб) х Жаркургон в отдельных клетках наблюдались гетероморфные биваленты, которые указывали на

нехватки отдельных плеч хромосом (Рис. 3 а, б), тогда как в других МКП наблюдались только нормальные биваленты (Рис. 3 в).




Рисунок 2. Конфигурации хромосом в метафазе-І мейоза у гибридных растений в варианте скрещивания F_2 (F_{23} К-58 тип арб) х Жаркургон: а) 24 нормальных бивалента и два гетероморфных бивалента; б) 25 нормальных бивалентов и один гетероморфный бивалент; в) 26 нормальных бивалентов.

Как известно, о сходстве или различиях скрещиваемых форм и видов, участвовавших в скрещиваниях судят по числу коньюгирующих хромосом в метафазе-І мейоза [6]. Поэтому, чем меньше нормальных коньюгирующих хромосом в мейозе, тем больше существует различий между скрещиваемыми формами. На основе проведенного изучения становится очевидным, что у большинства изученных нами сложных межвидовых гибридов хлопчатника в более ранних поколениях уже произошла стабилизация мейотического деления, вследствие отсеивания гибридных генотипов с различными типами отклонений в хромосомном наборе. Такой результат, безусловно, имеет

положительное значение, поскольку изученный материал интенсивно используется в селекционном процессе и присутствие каких либо нарушений в кариотипах исходных гибридных форм имело бы негативное значение для селекции хлопчатника.

ВЫВОДЫ

Изучение цитологических особенностей новых сложных межвидовых гибридов хлопчатника, полученных с участием сорта Жаркургон, выявило различия между вариантами скрещиваний по уровню различных типов нарушений, тогда как четыре комбинации скрещиваний характеризовались большей регулярностью мейотического деления на стадии метафаза І мейоза.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
Научно-исследовательский институт селекции,
семеноводства и агротехники выращивания хлопчатника

Поступила
5 июня 2019 года

Литература

- Мартынов С.П., Добротворская Т.В., Пухальский В.А. Динамика генетического разнообразия сортов озимой мягкой пшеницы (*Triticum aestivum L.*), районированных на территории России в 1929-2005 гг. // Генетика. 2006. Т. 42. № 10. С. 1359-1370.
- Арутюнова Л.Г. Межвидовая гибридизация в роде *Gossypium* L. // Вопросы генетики, селекции и

семеноводства хлопчатника. Ташкент. 1960. -С. 3-71.

3. Сайдалиев Х. Использование генетического потенциала видов *G.HIRSUTUM* L. и *G.TOMENTOSUM* Nutt. Ex seem для улучшения хозяйствственно-ценных признаков хлопчатника // Издательство «Фан» Аи РУз. Ташкент. 2009. 200 С.

4. Эгамбердиев А.Э., Эгамбердиева С.А. Использование дикорастущего вида *G. Trilobum* skovsted в селекции средневолокнистого хлопчатника // Издат-во «Фан» Аи РУз. Ташкент. 2009. 79 С.

5. Абдулаев А.А. Эволюция и систематика полиплоидных видов хлопчатника. //Издат-во Фан. Ташкент. 1974. 258 С.

6. Шкутина Ф.М. Цитология и генетика мейоза. Глава 10. Мейоз у отдаленных гибридов и амфидиплоидов. // Издат-во «Наука» Москва. 1975. С.292-310.

**М.Ф. Санамьян, С.К. Матякубов, Ш.У. Бобохужаев, Ш.Э. Намазов
Жарқұрғон навлари иштирокида F2 да олинган ғұзанинг янги мураккаб турлараро
дурагайларининг цитологик ҳусусиятлари**

Ғұзанинг Жарқұрғон нави иштирокида олинган янги мураккаб турлараро дурагайларининг цитологик ҳусусиятларни ўрганиш натижасыда хар хил вариантылар ичидан турли хил бузилишлар, бундай бузилишларга очық ва гетероморфли бивалентлар ҳамда бўлинмаган цитоплазма борлиги аникланди. Тўрта чатишириш комбинациясининг мейоз метафаза I босқичида мейотик булинишни тўғри бошқарилиш характерланди, сабаби ушбу комбинацияларда 26 та ёпик нормал бивалентлар шакилланганидан даъловат беради.

**M.F.Sanamyan, S.K.Matyakubov, SH.U.Bobokhujayev, SH.E.Namazov
Cytological features of the new complex inter-specific hybrids of gossypium obtained in F2 with the
participation of varieties Jarkurgon**

The study of the cytological features of complex new interspecific hybrids of cotton, obtained with the participation of the Jarkurgon variety, revealed some differences between the cross variants in the level of different types of disturbances, such as open and heteromorphic bivalents, unseparated cytoplasm. Four combinations of crosses were characterized by a greater regularity of meiotic division at the stage of metaphase I of meiosis, since they formed 26 normal closed bivalents.

УДК 581.1

МЕЛИЕВ С.К., БАБОЕВ С.К., БОХОДИРОВ У.Ш

**ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ЖАХОН ГЕНЕТИК КОЛЛЕКЦИЯСИДАН
РЕСПУБЛИКАМИЗНИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИГА БАРДОШЛИ
НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ.**

Мақолада бирламчи материал сифатида СИММЫТ халқаро ташкилоти генофондининг IBWSN (Халқаро юмшоқ буғдой танлаш кўчатзори) намуналаридан фойдаланилган. Ушбу намуналарни лаборатория шароитида NaCl нинг 0,7 ва 0,9% ли эритмаларида таҳлилқилинган. Юмшоқ буғдойнинг поя(майса) узунлиги, колеоптил, илдиз сони ва илдиз узунлиги белгилари асосида унувчанлиги ва корреляцион боғлиқлиги ўрганилган бўлиб ижобий натижка кўрсатган намуналар келгуси буғдой селекцияси мақсадлари учун танлаб олинган.

Калитсўзлар: юмшоқ буғдой, шўрланишига чидамлилик, поя узунлиги, колеоптил, илдиз сони ва узунлиги, корреляция.

КИРИШ

Республикамида қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳит хавфсизлигига салбий таъсир этаётган муҳим омиллардан бири – бу тупроқ шўрланишидир. Хозирги пайтда ФАО (Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти) маълумотига кўра, шўрланинг тупроқларбутун дунёда катта ҳудудларни эгаллаб –

бутун ерларнинг 25 % ташкил қиласи[1]. Дунё миқёсида қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин майдонининг тўртдан бир қисми турли даражада шўрланинг бўлиб, олимларнинг хисоблашича 2050 йилга келиб қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларнинг тахминан 50% нинг шўрланиш эҳтимоли мавжуд[2].Хозирги вақтда Республикаизда суғориладиган ерларнинг 52 %

шўрланган бўлиб, шундан 18 % ўртacha ва кучли даражада шўрланган [3]. Республикамиздаги суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар ИТИ Ғаллаорол филиалида шўрли тупроқларга чидамли навлар Дўстлик, Дурдона, Бобур каби навлар яратилган. Лекин бу изланишлар ҳозирда ҳам давом эттрилмоқда ва шўрланишга чидамли навлар яратишда илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Тупроқ шўрланиши—тупроқда ўсимликлар учун заарли бўлган тузларнинг тўпланиш жараёнидир. Ушбу жараён туфайли физиологик қуруклиқ[4] деган шароит юзага келади. Бунда, тупроқда етарлича нам бўлишига қарамасдан, ўсимлик керагича сувни истъемол эта олмайди. Ўсимликлар ўзлаштиридаган сувнинг таркибида 0,5 г/л ортиқ туз бўлмася яроқли, 0,5-1 г/л гача ўртacha, 1-3г/л гача ўсимликлар учун ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини бузилишига ҳам хавфли таъсир кўрсатади. Агар 3г/л дан ошиб кетса, умуман фойдаланишга яроксиз ҳисобланади[5].

Ўсимликларнинг тупроқ шўрланишга чидамлилигини ортиришнинг энг самарали экологик тоза усули бу экстремал шароитларга чидамли бўлган ўсимликлар генофондини шакллантириш, селекция ишларини олиб бориш учун бошлангич манбаларни яратиш, танлаш ва ирсийланиш даражасини аниқлаш, ушбу масаланинг асосий ечимларидан саналади. Шу мақсадда коллекция намуналарининг шўрланишга чидамлилигини лаборатория шароитида ўргандик.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Тадқиқотларимизда лаборатория шароитида CIMMYT ҳалкаро ташкилоти генофондининг IBWSN (*Ҳалқаро юмишоқ буғдой танлаши кўчатзори*) кўчатзори намуналаридан фойдаланилди. Намуналар NaCl нинг 0,7% ва 0,9%ли эритмаларида унувчанлиги ва ривожланиши Г.В.Удовенко[6] методи бўйича олиб борилди. Намуналарнинг белгилари орасидаги ўзаро корреляцион боғлиқлик Б.А.Доспехов (1973) усули[7] ҳамда намуналар ўртасидаги белгилари бўйича статистик таҳлиллар StatView дастури таҳлили Fisher тестида амалга оширилди[8]. Бунда эҳтимоллик статистик фарқланиш даражалари $0,001 > P < 0,001$ оралиғида олинган.


Тажрибада намланган фильтр қоғозга уругтериб чиқилди ва устидан шундай қоғоз билан ёпилиб, қоғоз рулон шаклида ўралди ва тузли эритмага солинган ёпик идишга жойлаштирилиб, ундириш учун термостатга қўйилди. Уруғлар 10 кундан сўнг олиниб, уларнинг ўртacha бирламчи узунлиги аниқланди. Баҳолашни осонлаштириш учун аввал фильтр қоғозга 0,5-1 см чизик чизилди, баҳолашда кўз билан 0,2-0,3 см аниқликда ўлчаниб, кейин ўртачаси хисобланди. Янада аниқлик киритиш учун унган ўсимта ва илдизлар ўлчанди.

Тажриба уч хил варианта олиб борилди. 1) Оддий дистилланган сувда, 2) 0,7 % ва 3) 0,9%NaCl тузли эритмада 24 С ли термостатга назорат сувдаги билан бир хил шароитга ва бир хил муддатга қўйилди. Тажриба намуналарида ҳар 3 кунда кузатувлар олиб борилди. 10 кундан сўнг намуналар олиниб ўсимликнинг бўйи, колеоптил, илдиз сони, илдиз узунлиги белгилари таҳлил қилинди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Лаборатория шароитида ўтказилган тажрибаларимизда юмшоқ буғдойнинг ўнта намунаси поя узунлиги, колеоптил, илдиз сони ва узунлиги кўрсаткичлари баҳоланди. Ўсимликнинг унувчанлигини баҳолашда асосий кўрсаткичлардан, колеоптил ўсимтаси ва поя узунлиги белгиси бўйича 0,7 %NaCl тузи кўшилган эритмасида таҳлил қилинганда католог номери 1251, 1082 ва 1006 намуналари қолган намуналарга нисбатан 2-3 кун олдин униб чиқиб, унувчанлиги 93% эканлиги кузатилди (1-расм). Унга кўра колеоптил ўсимтаси униши бўйича 3 та намуна 2,1; 1,7 ва 2,3 см узунлигига эга бўлган бўлса, қолган еттида намуналар 1,1 дан 1,4 см узунлигига эга бўлди. Колеоптил ўсимтаси буғдой ўсимликнинг биринчи асосий рангиз барги хисобланиб ўсаётган куртак пояни заарланишдан саклайди. Поя узунлиги бўйича ҳам ушбу намуналар 1251 намунаси 2,7 см, 1082 намунаси 2,3 см ва 1006 намунаси 3,2 см узунликка эга бўлиб, қолган еттида (1296, 1289, 1131, 1125, 1088, 1136 ва 1164) намуналаридан 30-45 % унувчанлиги юкори эканлиги қайд қилинди. Ўтказилган тажрибаларимизда илдиз сони ва илдиз узунлиги бўйича ўнта намуна баҳоланганды 1082, 1251 ва 1006 намуналари илдиз сони бўйича ўртacha 3; 3,5 ва 3 та илдиз ҳосил қилганлиги ва илдиз узунлиги бўйича 1082 намунаси 2,9; 1251 намунаси 3,5 ва 1006 намунаси 4,4 см гача бўлиб, бирламчи илдиз системаси қолган намуналарга нисбатан тез ўсиши кузатилди.


Натижаларимизда NaCl тузининг 0,9 % эритмаси кўлланилган варианта унувчанлиги бироз пасайғанлиги ва уруғлар 90 % униб чиқиб юқорида келтирилган намуналарда ҳам унувчанлик бироз пасайғанлиги аниқланди. Фақатгина 1251 намунаси унувчанлигини йўқотмаганлиги колеоптил, ўсимлик бўйи, илдиз сони ва узунлиги белгилари бўйича қолган намуналардан устунлик қилганини ва шунга яқин кўрсаткичлар кўрсатган 1164 ва 1006 намуналари ҳам қолган намуналарга нисбатан ижобий натижага кўрсатди. Унга кўра 1251 намунасида колеоптил ўсимтаси 2,3 см ва поя узунлиги бўйича 3,6 см ва қолган намуналар шунга мос равиша колеоптил кўрсаткичи 1164 намунасида 1,9 см поя узунлиги 3,8 см ва 1006 намунасида колеоптил 2,2 см поя узунлиги бўйича 2,6 см бўлганлиги кузатилди. Қолган 1296; 1289; 1131; 1125; 1088; 1082; 1136 намуналарида



1-расм. Намуналарнинг 0,7 % тузли эритмага таъсири.

(1-Расмдаги ҳарфлар $P>0,05$ ишончлилик даражасини Фишернинг вариациялар анализи асосида олинган)

колеоптил ўсимтаси 1,5 см дан ва поя узунлиги бўйича 1,8 см дан паст бўлганлигини кўрсатди. Бу тузли шароитда уруғлар тўла унмаганлиги ва бир нав ичида ҳам тузли шароитга турлича чидамли уруғлар борлиги намаён бўлди. Илдиз сони ва узунлиги бўйича юқоридаги учта намуна ўзининг унувчанлик хусусиятлари юқорилиги билан ажралиб турди.



2-расм. Намуналарнинг 0,9 % тузли эритмага таъсири.

(2-Расмдаги ҳарфлар $P>0,05$ ишончлилик даражасини Фишернинг вариациялар анализи асосида олинган.)

Ушбу намуналар илдиз сони бўйича (1251) 4,3; (1006) 3; (1164) 4,3 та ва илдиз узунлиги бўйича 8,6 см дан 3,4 см оралиғида бўлганлиги кузатилди. Қолган намуналар илдиз сони 2,9 тадан, илдиз узунлиги бўйича 2,7 см дан паст эканлиги намаён бўлди.

Тажрибамизда намуналарнинг белгилар ўртасидаги коррелятив боғлиқлиги ҳам ўрганилди.

Унга кўра белгилар ўртасидаги кучли коррелятив боғлиқлик борлиги намаён бўлди. Ўсимликнинг белгилари ўртасида ижобий боғланиш борлиги ва ушбу белгиларнинг бир бирига боғлиқлиги албатта ўсимликнинг физиологик ҳамда генетик жиҳатдан яхши ривожланишига ва хосилдорилигига ижобий таъсир кўрсатади.

Белгиларнинг корреляцион боғлиқлиги.№	Ўсимлик бўйи (см)	Колеоптил (см)	Илдиз сони (дона)	Илдиз узунлиги (см)
Ўсимлик бўйи	1			
Колеоптил	0,98±0,34			
Илдиз сони	0,74±0,24	0,71±0,22		
Илдиз унлиги	0,91±0,32	0,92±0,32	0,80±0,27	1

ХУЛОСА

Ўрганилган кузги бугдой навлари уруғи NaCl тузининг хар хил концентрацияларида ундирилганда, концентрация ошиб бориши натижасида уругларнинг унувчанлигига салбий

тасир кўрсатар экан. Тажриба натижаларига кўра танлаб олинган 1251 намунасининг барча белгилари бўйича юкори натижа кўрсатганлиги аниқланди. Ушбу намунани классификатор нав сифатида фойдаланиш учун танлаб олинди.

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

*Қабул қилинган вақти
10 июн 2019 йил*

Адабиётлар

1. Засоление почв: проблема и пути решения АгроПрактика. 3 мая 2017г.
2. Amel A Tammam*, Mona F AbouAlhamd and Mabrouka M Hemeda. Study of salt tolerance in wheat (TriticumaestiumL.) cultivar Banysoif 1 //Australian Journal of Crop ScienceSouthern Cross Journals© 20081(3):115-125
3. Турдибаева М. О деградации земель в Центральной Азии. «Молодой учёный». 2015 ,№ 9.
4. Қурғоқчилик ҳудудларида сув ресурсларини минимал сарфлайдиган ирригация ва мелиорация ҳамда қишлоқ ҳўялигини юритиш усуслари бўйича кўлланма. Тошкент-2012, Б.34-35.
5. М.Куриинный Засоление почвы. Причины и восстановление [http:// sadoved.com](http://sadoved.com).
6. Г.В.Удовенко, Доклады ВАСХНИИЛ 1982г. № 7 С-13
7. Доспехов Б. Методика полевого опыта. М.1973г. С- 177-189.
8. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, www.statview.com.

Мелиев С.К., Бабоев С.К., Боходиров У.Ш

Отбор толерантных образцов пшеницы к засоленным условиям

Первичным материалом для данной статьи был использован генофонд IBWSN Международной организации CIMMYT (Международная селекция салатов из мягкой пшеницы). Образцы были проанализированы на солеустойчивость в лабораторных условиях в концентрации 0,3 и 0,9 % раствора NaCl. По мягкой пшенице преследовалась цель воздействия степени концентрации солевого раствора на высоту стебля, длину и количество корней, колеоптиля и корреляции между указанными признаками. Сорт образцы, показавшие наилучшие положительные результаты исследований были отобраны для дальнейших селекционных работ по мягкой пшенице.

S.k.Meliiev, S.K.Baboev, U.Sh.Bakhadirov

Selection of soil salinity tolerant wheat genotypes from World genetic collection

The main source of the article was the IBWSN gene pool of the International Organization of CIMMYT (International soft wheat selection seedlings). These samples were analyzed by 0.7% and 0.9% NaCl solution in laboratory conditions. The length of shoot, coleoptile, number of root and length of root of germination and dependent correlation were studied. The positive samples of wheat were selected for future wheat selection.

**ТАБИИЙ АСОСЛИ ДАГ-1 ПРЕПАРАТИНИ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА
ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ**

Лаборатория шароитида ДАГ-1 препаратини турли концентрацияларини ғўзанинг эркин пролин аминокислотаси ва малондиальдегиди миқдорига таъсири шўрланиш моделида ўрганилди ва препаратнинг самарали концентрацияси 10^{-7} М эканлиги аниқланди. Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароитида ДАГ-1 препаратини ғўза экинида ўсиш, ривожланиш ва хосилдорлигига таъсири ўрганилди. ДАГ-1 препаратининг кичик (10^{-7} М) концентратацияда чигитларга ишлов бериш ғўза ўсимлигини ўсиш ва ривожланишини стимулловчи таъсири дала тажрибаларида тасдиқланди.

Калит сўзлар: *ғўза, пролин, малондиальдегиди, ДАГ-1 препарати, тупроқ шўрланиши.*

КИРИШ

Сўнгги пайтларда Республикамиз экин майдонлари катта кисмининг турли даражада шўрланиши қишлоқ хўжалиги экинларининг етиширилишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Мъалумки, тупроқ шўрланиши ва унинг таркибида тўпландиган турли миқдордаги туз ионлари таъсирида ўсимликлар керакли озиқ моддалар ва элементларни ўзлаштира олмайди. Бу эса ўсимлик таркибида заҳарли токсик моддаларнинг ҳосил бўлиши натижасида моддалар алмашинувининг бузилишига ҳамда уларнинг хосилдорлиги пасайиб кетишига олиб келмоқда. Бундай ҳолатларни қишлоқ хўжалигининг барча экинларида кузатиш мумкин. Паҳтачилик Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиёти соҳаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, унинг валюта заҳирасига хиссаси каттадир [1].

ЎзР ФА академик О.С. Содиков номидаги биоорганик кимё институтининг бир қатор олимларининг олиб борган тадқиқотларида стимулловчи таъсир кўрсатувчи ширинмия илдизидан олинган глицеризин кислотаси асосида яратилган ДАГ-1 препаратининг ғўзани турли хил тупроқ-иқлим шароитларига, фитопатогенларга қарши чидамлилигини индуцировичи ва ривожланиши стимулловчи таъсирга эгалиги аниқланган [2].

Биологик фаол моддалар ёрдамида ўсимликлар генотипини молекуляр ва биокимёвий мослашувчанлик потенциалини бошқариша ДАГ-1 (глицеризин ва салицил кислоталарининг супрамолекуляр комплекси) препаратидан мухитнинг стресс омилларига ўсимликлар толериантлигини ошириш йўлида фойдаланиш мумкин.

Ушбу тадқиқот ишининг мақсади ДАГ-1 препаратини Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароитида ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва хосилдорлигига таъсирини ўрганишдан иборат.

Дастлаб ДАГ-1 препаратининг турли концентрацияларини аниқлаш мақсадида ғўза 7-

кунлик ниҳолларининг морфологик белгилари, эркин пролин аминокислотаси ва липидларнинг пероксидли оксидланиш (ЛПО) жараёнининг охирги махсулоти – маллон диальдегиди (МДА) таркибий миқдорлари лаборатория шароитида таҳлил килинди.

Ноқулай шароитларда ўсимлик хужайраларида эркин радикаллар яъни кислороднинг фаол шакллари (КФШ) ҳосил бўлиши кўпаяди. Ўсимлик КФШ ни детоксикатсия қилиш мақсадида бир қанча ҳимоя механизмларини ишга тушуради. Улар қаторига антиоксидант ферментлар, куйи молекуляр бирикмалар (бетаин, пролин аминокислоталари) киради. Хусусан тупроқ шўрланиши шароитида ўсимлик хужайрасида эркин пролин аминокислотасининг тўпланиши ўсимлик хужайрасини тузли стресинг салбий оқибатларидан саклаш имконини беради [3, 5].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ

Тадқиқотларда ДАГ-1 препаратининг 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} , 10^{-8} молярли эритмалари кўлланилди. Тадқиқот материали сифатида ғўзанинг С-6524 нави чигитлари олинган. Чигитлар экиш олдидан ДАГ-1 препаратининг 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} , 10^{-8} молярли эритмаларида 6 соат давомида ивитиб қўйилди. Сўнгра чигитлар фильтр қофозларга экилиб, назорат сифатида сувли ва NaCl нинг турли концентрацияли (100 мМ, 200 мМ) эритмаларига солиниб, термостатда (27°C да) 7 кун давомида ўстирилди.

Эркин пролин миқдори Bates услугига кўра аниқланди [6].


МДА миқдори В.В. Рогожин йўрикномасига асосан тиобарбитур кислотаси (ТБК) ёрдамида аниқланди [7]. Максимум комплекснинг ҳосил бўлиши 532 нм да кузатилади.

Олинган натижалар Excel дастури ёрдамида қайта ишланган. Бунда ўртача арифметик кўрсаткич (M), ўртача оғиш кўрсаткичи ($\pm m$) ва статистик ишонарлилик кўрсаткичи (P) ўрганилди. $P < 0.05$ дан кичик бўлган натижалар статистик ишонарли деб қабул қилиган.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Дастлаб шўрданишли мухитда ўстирилган ғўза нихолларига глицирризин кислотаси асосида олинган табиий препаратларнинг эффектив концентратцияси аниқланди. ДАГ-1 препаратининг турли концентратцияларини NaCl нинг 100 мМ, 200 мМ эритмаларида ўстирилган ғўзанинг С-6524 нави нихолларида пролин аминокислотаси миқдорини ўзгаришига таъсири ўрганилди.

Олинган натижаларга кўра назорат намуналарда ДАГ-1 препаратининг концентратцияси камайганда пролин миқдори ошган, ўрта шўрланишли мухитда ўстирилган нихолларда пролин миқдори препаратининг концентратцияси камайганда тегишлича 1 гр қуруқ модда массасига нисбатан 120,3, 98,7, 180,6, 125,7 мкгни ташкил килган (1-расм). Кучли шўрланишли мухит тасирида ДАГ-1 препаратининг 10^{-5} ва 10^{-7} молярли эритмари билан ишловланган намуналарда пролин миқдори кескин ошганлиги аниқланди.



1-расм. ДАГ-1 препаратининг турли концентратияли эритмалари билан ишловланган ғўзанинг С-6524 нави нихолларида пролин аминокислотаси миқдори

Атроф мухитнинг нокулай шароитлари таъсирида ўсимлик хужайрасининг мембранныса миқдорини пероксидли оксидланиш (ЛПО) жараёни интенсив содир бўлади [4, 5]. ЛПО жараёнининг охирги маҳсулоти – малондиальдегид (МДА) ўсимлик хужайрасини чидамлилигини оширишга хизмат қилувчи стресснинг бирламчи медиатори бўлиб ҳисобланади [5].

ДАГ-1 препаратининг турли концентратияли эритмалари билан ишловланган ғўзанинг С-6524 нави нихолларида МДА миқдори ўрганилди. ДАГ-1 препаратининг 10^{-7} М концентратияда экиш олдидан чигитларга ишлов бериш натижасида МДА миқдорини кескин камайганлиги аниқланди (2-расм). Олинган кўрсаткичларни тахлил қилиб, қуйидагиларни хulosга қилишимиз мумкин. Кучли шўрланишли мухит тасирида ДАГ-1 препаратининг 10^{-5} ва 10^{-7} молярли эритмари билан ишловланган намуналарда ўсимликларнинг турли хил абиотик стрессларга жавоб реаксияларида тўпланиши хусусиятига эга бўлган пролин аминокислотаси миқдори кескин ошган.


Ўсимликлар қанчалик абиотик омиллар таъсирига чидамли бўлса, ўсимлик организмида

ЛПО жараёни секин кечади. Натижада бу жараёнининг охирги маҳсулоти ҳисобланган – МДА кам миқдорда тўпланади.

Шўрланишли мухитда олиб борилган тажрибада, ДАГ-1 препаратининг турли хил концентратиялари (10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} , 10^{-8}) таъсирида пролин аминокислотаси кўп тўпланганлиги ва МДА миқдорининг камайганлиги кузатилди. Олинган тахлил натижалари ДАГ-1 препаратининг 10^{-7} концентратияда энг кўп самарага эга эканлигини кўрсатди.

Шундай килиб ДАГ-1 препаратининг табиий фитогормонлар таъсирига мос келувчи кичик 10^{-7} М концентратияда экиш олдидан чигитларга ишлов бериш ғўза ўсимлигини ўсиш ва ривожланишини стимулловчи таъсири лаборатория тажрибаларида аниқланди.

Ғўза чигитлари лаборатория тажрибаларида аниқланган ДАГ-1 препаратининг самарали концентратиясида ишловланиб, Тошкент вилояти Юкори Чирчик тумани фермер хўжалигига синовдан ўтказилди (1-жадвал).



2-расм. ДАГ-1 препаратининг турли концентрацияли эритмалари билан ишловланган гўзанинг С-6524 нави нихолларида малон диялgid миқдори

Морфологик кузатувлар натижасида олинган натижаларга кўра 2018 йил сентябр холатида хосил шохлари сони ўртacha 4% га ошган, бир гектардаги кўчат сони эса ўртacha 1,2 % га кўпайган. Бир тупдаги кўсаклар сони ДАГ-1 препарати билан

ишловлаш натижасида ўртacha 11,3% га ортган ва кўсакларнинг очилиш тезлиги 1 сентябр холатига ўртacha 51% дан 56,6% га кўтарилгани кузатилди. Бу эса пахта хосили теримини тезлаштириш имконини беради.

1-жадвал


Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани фермер хўжаликларида 2018 йил сентябр ойида гўзанинг морфологик кузатуви натижалари

Фермер хўжаликлар номи	Тажриба варианлари	Хосил шохлари сони	Бир гектардаги кўчат сони минг дона	Бир тупдаги кўсаклар сони		Битта кўсакни ўртacha оғирлиги, гр
				Жами	шундан очилгани	
Сайд Жўрахон агро инвест	Назорат	13,1	111,2	8,8	4,7	3,0
	Тажриба	13,7	112,8	10	5,6	3,0
Фародис Хирмони	Назорат	13,5	108,6	9,6	4,4	3,0
	Тажриба	13,9	109,9	10,6	5,6	3,0
Гульчимир агро	Назорат	12,9	114,4	9,4	5,0	3,0
	Тажриба	13,5	115,9	10,3	6,2	3,0
Умар ота ўғиллари	Назорат	13,2	107,8	9,4	4,9	3,0
	Тажриба	13,6	108,9	10,5	6	3,0

Дала шароитида ўтказилган тажрибалар натижаси гўзанинг унувчанлиги ҳамда хосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланди (3-расм).

Бунга кўра Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Сайд жўрахон агро фермер хўжалигига

хосилдорлик назорат майдонларида 29,3 ц/га, тажриба майдонларида 4,5 ц/га ортган ва 33,8 ц/га бўлганилиги кузатилди. Шунингдек Умар ота ўғиллари фермер хўжалигига назоратга нисбатан 3,9 ц/га, Фирдавс хирмони фермер хўжалигига назоратга нисбатан 3,6 ц/га ортганлиги аниқланди.



3-расм Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани тупроқ-иқлим шароитида 2018-йил хосили учун етиширилган гўза экинида ДАГ-1 препаратини хосилдорликга таъсири.

ХУЛОСА, ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР

ДАГ-1 препарати таркибидаги СК нафақат ўсимлик иммунитетини оширувчи таъсирга, балки хосилдорликни ошишига сабаб бўлувчи ўсиш фаоллигини кучайтириш хусусиятига хам эга. ДАГ-1 препарати таркибидаги СК ва ГК кичик (10^{-7} М)

концентратцияда тўзанинг ўсиш ва ривожланишини стимуллаб, стресс шароитларда адаптацияни кучайтирганлиги сабабли экологик хавфсиз ўсиш регулятори хисобланади ва пахтачилик хўжалигига амалий кўллаш учун тавсия қилинади.

ЎзР ФА акад. О.С. Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти

*Қабул қилинган вақти
25 май 2019 йил*

Адабиётлар

1. Самарқанд кишлоқ хўжалик институти Р.Орипов “Пахтачилик” маъruzалар курси Самарқанд, 2011. -4 б.
2. Хашимова Н.Р., Ахунов А.А., Далимов Д.Н., Автономов В.А. Мамасолиева М.А. Диглицерризинаты – препараты нового поколения, повышающие устойчивость хлопчатника к *Verticillium dahliae* // Доклады Академии Наук РУз. Ташкент, 2015. - № 5. - 52-56 б.
3. Ю.Е.Колупаев, А.А.Вайнер, Т.О.Ястреб. “Пролин: физиологические функции и регуляция содержания в растениях в стрессовых условиях” Вестник Харьковского национального аграрного университета серия биология. 2014, - 2 (32), - С. 6-22.
4. Полесская О.Г., Каширина Е.И., Алексина Н.Д. “Влияние солевого стресса на антиоксидантную систему растений в зависимости от условий азотного питания” Физиология растений. 2006. –Т.53, - С:207-214.
5. М.В.Ефимова, А.Л.Савчук, Дж.А.К.Хасан, Р.П.Литвиновская, В.А.Хрипач, В.П.Холодова, Вл.В.Кузнецов “Физиологические механизмы повышения солеустойчивости растений рапса брацциностероидами” Физиология растений, 2014, том 61, №6, с.778–789
6. Г.Н.Шихалеева, А.К.Будняк, И.И.Шихалеев, О.Л.Иващенко “Модифицированная методика определения пролина в растительных объектах”
7. Г.Г.Борисова, М. Г. Малева, Г.Ф.Некрасова, Н. В. Чукина “Методы оценки антиоксидантного статуса растений” Уральский федеральный университет, 2012

Наврузов С.Б., Хашимова Н.Р., Ахунов А.А.

Влияние препарата природного происхождения ДАГ-1 на рост, развитие и урожайность хлопчатника в почвенно-климатических условиях Ташкентской области

В лабораторных условиях на модели засоления было изучено влияние различных концентраций препарата ДАГ-1 на содержание свободной аминокислоты пролина, малонового диальдегида на модели засоления, и определена эффективная концентрация препарата 10^{-7} М. Установлено стимулирующее действие препарата ДАГ-1 на рост и развитие, а также на урожайность хлопчатника в Ташкентской области.

S.B.Navruzov, N.R.Khashimova, A.A.Akhunov.

The effect of the preparation DAG-1 from natural origin on the growth, development and yield of cotton in the soil-climatic conditions of the Tashkent region

Under laboratory conditions on the salinity model, the effect of different concentrations of the DAG-1 preparation on the content of free amino acid proline, malonic dialdehyde on the salinity model was studied, and the effective concentration of the drug was determined to be 10^{-7} М. The stimulating effect of DAG-1 preparation has been established on growth and development, as well as cotton yield in the Tashkent region.

Д.М.УМИРОВ¹, Б.Х.АМАНОВ², Б.К.МАДАРТОВ¹.

ИССИҚХОНА ВА ДАЛА ШАРОИТИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИНГАН БОШЛАНГИЧ МАНБА, F₁, F₁B₁ БЕККРОСС ЎСИМЛИКЛАРИДА БИТТА КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

Ушбу мақолада бошлангич манба сифатида танлаб олинган ўрта толали (*G.hirsutum* L.) маҳаллий гўза нав ва тизмалари ва дурагайлаш натижасида олинган F₁ ва беккросс дурагай ўсимликларининг иссиқхона ва дала шароитида хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсакдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари қиёсий таҳлил қилиш натижасида бир-биридан фарқланганлиги аникланди ҳамда F₁ ўсимликларининг иссиқхона ва дала шароитида таҳлил қилинганда битта кўсакдаги пахта вазни кўрсаткичининг ирсийланиши тўлиқсиз, доминант, ўта доминант ҳолатларда ирсийланиши намоён бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Таянч сўзлар: гўза, дала, иссиқхона, битта кўсакдаги пахта вазни, дурагай, реципроқ, ирсийланиш, доминантлик даражаси, вариация коэффициенти, комбинация, тизма, нав, гетерозис, оралиқ, доминант, ўта доминант.

КИРИШ

Хозирги вактда гўза синтетик селекцияси самарадорлигини оширишда генетик ўзгарувчанлик доирасини кенгайтирувчи дурагайлаш услубларининг аҳамияти жуда муҳимдир. Тадқиқот ишларининг маваффақияти танлаб олинган бошлангич манба ва селекция жараёнидаги чатишириш услугига боғлиқдир. Гўза ўсимлигининг энг муҳим қимматли хўжалик белгиларидан бири битта кўсакдаги пахта вазни хисобланади. Бир қатор муаллифлар туричи ва турлараро чатиштиришлар асосида олинган F₁-F₂ дурагайларида кўсак йириклиги танлаб олинган бошлангич манбалар кўрсаткичидан юқори бўлганлигини ўз изланишларида келтириб ўтганлар ҳамда кўсак йириклигининг ўзгарувчанлиги генотип таъсирида ирсийланиши аникланган. Биринчи авлод дурагайларида белгининг оралиқ ирсийланиш даражаси намоён бўлиши ҳамда F₂ ўсимликларида рўй берадиган ажралиш жараёни бу белгининг кўпчилик микдорий белгилар каби полиген эканлигидан, яъни бир қанча доминант генлар иштирок этишидан далолат беради [1, 2, 3, 4, 6, 7].

О.Х. Кимсанбаев [3], Р.Р. Раҳимбоев, Р.Ф. Зелениналар [4], олиб борган тадқиқотларида, F₁ ўсимликларда кўсак йириклигининг ирсийланиши тўлиқ устунлик ҳолатда кечиши, F₂ ўсимликларининг вариацион қаторида эса, дурагайлар йирик кўсакли ота-она шакллари томонга оғанганини ва йирик кўсакка эга бўлган (трансгресив) ўсимликлар ҳосил бўлишини полигенлар таъсиридан эканлигини кўрсатганлар.

А. Сиддиқов [5] олиб борган илмий тадқиқотларида, гўза ўсимлигига ўтказилган оддий дурагайларда қимматли хўжалик белгилардан бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича ижобий доминант ва оралиқ ҳолатда ирсийланиш кузатилган; Бундан ташқари, ўрганилган F₂ ўсимликларда йирик кўсакли бўлган дурагайлар учинчи бўғинда ҳам ушбу

хусусиятни саклаб қолганлиги ёки аксинча, иккинчи авлодда майдо кўсакли бўлган дурагайлар F₃ ўсимликларда ҳам ирсийланиш коэффициенти паст кўрсаткични намоён қилганлиги аникланган. Маҳаллий навларда эса белгининг бошқарилишида рецессив генларнинг иштироки кўпроқ ва уларни чатиштиришдан олинган дурагайларда белги бўйича танловни камида F₃-F₄ авлоддан амалга ошириш зарурлигини айтиб ўтган.

С.А. Усманов, С.С. Алиходжаева, Ф.Р. Абдиев, К.О. Хударганов [6] томонидан олиб борилган тадқиқотлар, гўзанинг ингичка толали *G.barbadense* L. турига мунсуб географик узоқ бўлган дурагайларнинг юқори авлодларида айrim хўжалик белгилари орасидаги генетик боғлиқликни ўрганган. Уларнинг таҳлилига кўра, ўзгарувчанлик коэффициенти F₈ авлодига бориб, деярли барча белгилар бўйича андоза навлардан фарқланмаган, тола чиқими ортиши билан унинг узунлиги, бир кўсакдаги пахта вазнининг ортиши билан узунлиги, 1000 дона чигит вазнининг ортиши билан тола чиқими камайган.

Р.Р. Эгамбердиев [7] ўзи олиб борган илмий изланишларида, гўзанинг ингичка толали F₁ ўсимликларда битта кўсакдаги пахтанинг вазни асосан оралиқ ҳолда ирсийланишини аниклаган. Бошлангич манбадан бирига томон оғиш кузатилган ҳамда бошлангич ашёларнинг оталик ёки оналик сифатида келишига кўра турлича бўлган. Ўрганилган бир қатор комбинацияларда белги бўйича ижобий гетерозис кузатилган. Олинган F₂ ўсимликларда белгининг ирсийланиш коэффициентини аниклаш ушбу белгининг генетипик ўзгарувчанликнинг таъминланганлиги ўртача ва кучли даражада (h²=36,0- h²=94,0%) эканлигини аниклаган.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ

Сунъий иқлим шароитида режалаштирилган тадқиқот Пахта селекцияси, уруғчилиги ва

етишириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг “Фитотрон” селекция иссиқхона мажмуаси шароитида ҳамда дала таҗрибалари институтнинг Марказий тажриба хўжалигининг бўз тупроқли шароитида олиб борилди. Тадқиқот услуби эса дурагайлаш ва олинган F_1 , F_1B_1 беккросс дурагайларининг битта кўсақдаги пахта вазни белгиси иссиқхона ва дала шароитида таққослаб ўрганилди. Тадқиқот ўтказиш учун бошлангич манба сифатида республикамиизда районлаштирилган Омад, С-6530, истиқболли С-6541 ва сунъий мёклим лаборатория олимлар томонидан яратилган Т-498, Т-442 тизмаларидан фойдаландик.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Бизнинг тадқиқотларимизда иссиқхона шароитида ёзга ўсимликларининг нав ва тизмаларида битта кўсақдаги пахта вазни белгиси 4,1-5,1 граммни ташкил этди. Л-442 тизмаси иссиқхона шароитида битта кўсақдаги пахта вазни белгиси бўйича энг яхши кўрсаткич (5,1 грамм) ташкил этган бўлса, ушбу белги бўйича паст кўрсаткич С-6541 навида (4,1 грамм) аникланди (1-жадвал).

Иссиқхона шароитида ўрганилган F_1 ўсимликларида битта кўсақдаги пахта вазни белгиси бошлангич намуналар орасида деярли фарқ бўлмаганлигини кўришимиз мумкин, яъни $F_1C-6530$ x T-442 дурагай комбинациясида бошқа биринчи авлод дурагайларига нисбатан бироз юкори бўлганлигини кўришимиз мумкин (5,4 грамм), вариация коэффициенти эса 7,2 ташкил этган бўлса, доминантлик даражаси ижобий гетерозис ҳолатда ирсийланиш кузатилди. Ўрганилган F_1T-498 x Омад, F_1C6541 x С-6530 дурагай комбинацияларида бироз паст кўрсаткич (4,8 грамм) кузатилган бўлса, вариация коэффициенти эса 8,1-8,7 ни ташкил этди. F_1C6541 x С-6530 дурагай комбинациясида доминантлик даражаси ўта гетерозис ҳолатда ирсийланиш аникланган бўлса (6,0), F_1 Омад x T-498 реципрок дурагай комбинацияларида ирсийланиш даражаси кузатилмади ва 0 га тенг бўлди. Беккросс ўсимликларда бошлангич намуналар орасида деярли фарқ бўлмаганлигини кўришимиз мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Иссиқхона ва дала шароитида бошлангич манбалар ва F_1 , F_1B_1 беккросс ўсимликларида битта кўсақдаги пахта вазни белгисининг ирсийланиши

№	Бошлангич манбалар ва F_1 ўсимликларида	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	S	V%	hp
Иссиқхона шароитида					
1	Омад	5,0±0,1	0,3	7,1	-
2	C-6530	4,3±0,2	0,5	6,8	-
3	C-6541	4,1±0,2	0,3	7,1	-
4	T-498	5,0±0,1	0,4	6,3	-
5	T-442	5,1±0,3	0,2	6,5	-
6	F_1 Омад x T-498	5,0±0,1	0,4	9,3	0
7	F_1T-498 x Омад	4,8±0,1	0,4	8,7	0
8	$F_1C-6530$ x T-442	5,4±0,1	0,3	7,2	1,7
9	F_1T-442 x C-6530	5,2±0,1	0,4	8,7	1,2
10	F_1 C-6541 x Омад	5,0±0,1	0,4	8,4	1,0
11	F_1C6541 x С-6530	4,8±0,1	0,3	8,1	6,0
12	BC ₁ (Омад x T-498) x Омад	4,5±0,4	0,1	3,5	
13	BC ₁ (Омад x T-498) x C-6530	4,7±0,1	0,4	8,8	
14	BC ₁ (С-6530 x T-442) x C-6530	4,9±0,6	0,1	3,8	
15	BC ₁ (C-6530 x T-442) x Омад	4,9±0,7	0,2	4,9	
Дала шароитида					
1	Омад	6,3±0,2	0,6	6,1	-
2	C-6530	4,9±0,3	0,2	7,1	-
3	C-6541	5,0±0,5	0,7	7,3	-
4	T-498	5,1±0,2	0,4	6,8	-
5	T-442	5,8±0,4	0,5	7,1	-
6	F_1 Омад x T-498	5,8±0,1	0,8	9,7	0,2
7	F_1T-498 x Омад	5,8±0,4	0,9	7,6	0,2
8	$F_1C-6530$ x T-442	6,5±0,3	0,4	6,6	2,4
9	F_1T-442 x C-6530	6,4±0,1	0,1	9,2	2,2
10	F_1 C-6541 x Омад	5,8±0,5	0,3	6,3	0,3
11	F_1C6541 x С-6530	5,4±0,1	0,5	9,7	5,0
12	F_1B_1 (Омад x T-498) x Омад	5,7±0,1	0,5	9,1	
13	F_1B_1 (Омад x T-498) x C-6530	5,7±0,3	0,4	7,6	
14	F_1B_1 (С-6530 x T-442) x C-6530	5,7±0,2	0,4	7,1	
15	F_1B_1 (C-6530 x T-442) x Омад	5,9±0,3	0,6	7,5	

Дала шароитида ўрганилган бошланғич манбаларда битта күсақдаги пахта вазни белгиси бўйича кўрсаткич 4,9-6,3 граммни ташкил этди. Ўрганилган дала шароитида ҳам Омад нави битта күсақдаги пахта вазни белгиси бўйича 6,3 грамм бўлган бўлса, паст кўрсаткич С-6530 навида кузатилди (1-жадвал). Дала шароитида ўрганилган ўсимликларнинг битта күсақдаги пахта вазни белгиси бўйича олинган натижаларни таҳлил киладиган бўлсак, F_1 ва беккросс ўсимликларида бу белги бўйича 5,4-6,5 грамм, вариация коэффициенти эса 6,3-9,7 ни ташкил этди. $F_1C-6530 \times T-442$ дурагай комбинациясида битта күсақдаги пахта белгиси бўйича юқори кўрсаткич (6,5 грамм), вариация коэффициенти эса 6,6 кайд этилган бўлса, бироз паст кўрсаткич $F_1C6541 \times C-6530$ дурагай комбинациясида 5,4 грамм, вариация коэффициенти эса 9,7 кузатилди.

¹Тошкент давлат аграр университети,

²ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Дала шароитида ўрганилган F_1 ўсимликларида битта күсақдаги пахта вазни белгиси бўйича $F_1C6541 \times C-6530$ дурагай комбинациясида ўта доминант (5,0) ҳолатда ирсийланиш аниқланди ва бошқа дурагай комбинацияларда тўлиқсиз доминант ва гетерозис ҳолатда ирсийланиши кузатилди.

ХУЛОСА

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдик, бошланғич манбалар ва F_1 ва F_1B_1 беккросс дурагай ўсимликларининг иссиқхона ва дала шароитида битта күсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари бир-биридан бироз фарқланганлиги аниқланди ҳамда иккала шароитда ҳам F_1 ўсимликларининг битта күсақдаги пахта вазни белгисининг ирсийланиши доминант, тўлиқсиз доминант, ўта доминант ҳолатларда ирсийланиши намоён бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Қабул қилинган вақти

16 май 2019 йил

Адабиётлар

- Максудов З.Ю. Изучение гибридов, полученных от скрещивания экологически отдаленных сортов хлопчатника *G.hirsutum L.*: Автореф. дис. ... канд. с/х. наук. - Ташкент: Таш СХИ. 1967. - 27 с.
- Каменова Е.И. Изменчивость при гибридизации географически-отдаленных форм хлопчатника.: Автореф. дис. ... канд. биол. наук.- Ташкент: Отделения химико-технологических и биологических наук АН Уз ССР . 1967. - 26 с.
- Кимсанбаев О.Х. Выход волокна у гибридов хлопчатника // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. - Ташкент, 2005. - № 1. - 14 б.
- Рахимбоев Р.Р., Зеленина Р.Ф. Наследование некоторых хозяйственных признаков у хлопчатника // Генетика и селекция хлопчатника. - Ташкент: Фан, 1976. - С. 91-96.
- Сиддиқов А.Р. Мураккаб дурагайлаш таъсирида ғўза қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги. К.х.ф.н.... дисс.автореф. -Тошкент, 2006.-24 б.
- Усмонов С.А., Алихўжаева С.С., Абдиев Ф., Хударганов К. *G.barbadense* тури географик узоқ F_{7-8} дурагайлари қимматли-хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги «Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари» номли халқаро илмий-амалий конференция тўплами (Тошкент, 2007 йил. –27-28-август). -Тошкент, 2007. –Б.274-77.
- Эгамбердиев Р.Р. Наследование и сопряженность качества волокна и основных хозяйственных признаков у экологически отдаленных гибридов хлопчатника вида *G.barbadense L.*-Автореф. дисс.с.-х.н. – Ташкент, 2008. – 23 с.

Д.М. Умиров¹, Б.Х. Аманов², Б.К.Мадартов¹

Наследование веса одного коробочка растений беккросса F_1 , F_1B_1 , исходных анализированных материалов в тепличных и полевых условиях

В статье установлена отличия показателей веса сырца одной коробочки гибридных растениях F_1 и F_1B_1 полученных в результате гибридизации и отобранные сорта средневолокнистого хлопчатника (*G.hirsutum L.*) как исходные материалы в тепличных и полевых условиях. В обоих условиях, можно было наблюдать что наследование признака веса сырца одного коробочка растений F_1 проявилось в неполной доминировании, доминантной и высоко доминантной состояниях.

D.M.Umirov¹, B.Kh.Amanov², B.K.Madartov

Inheritance of one boll weight of backcross plants F_1 , F_1B_1 analyzed initial accessions in the greenhouse and field conditions

The establishment of difference of indexes of one boll weight on the hybrid plants F_1 , F_1B_1 , taken in the result of hybridization and selected middle staple cotton varieties (*G.hirsutum L.*) as the initial materials in the greenhouse and field conditions was presented in this article. In both conditions, it could be observed that the inheritance of one boll weight trait has elucidated in the no full dominant, dominant and high dominant states

ҒЎЗАНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ЧИДАМЛИ ЯНГИ НАВЛАРИНИ ЯРАТИШДА ЗАМОНАВИЙ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ушбу мақолада сўрувчи зааркунандаларнинг қишлоқ хўжалик экинлариға келтирадиган заарлари, уларга қарши курашишнинг аҳамияти, зааркунандаларга чидамли янги навларини яратишда биотехнологик усуллардан фойдаланишнинг афзаликлари ва бу борада олиб борилган хориж тажрибалари ҳамда шу асосда олиб борилаётган бошланғич тадқиқотлар қисқача ёритилган.

Таянч сўзлар: *Трансген, ПЗР, хашаротлар, чидамлилик, гўза, Gossypium hirsutum L.*

КИРИШ

Дунёда қишлоқ хўжалиги махсулотларини етиширишда зааркунанда ҳашаротлар кўплаб ҳосилни нобуд бўлишига олиб келмоқда. Шу сабабли уларга қарши курашишда замонавий технологияларни кўллаш долзарб муоммоларидан бири хисобланади.

Зааркунанда ҳашаротлар ўсимликларнинг барча маданий, ёввойи ва манзарали турларига катта иқтисодий зарар етказади. Статистик малумотларга қараганда зааркунандалар туфайли дунё бўйича ҳар йили 203,7 млн.тонна дон, 228,4 млн.тонна қанд лавлаги, 23,8 млн.тонна картошка, 23,4 млн.тонна сабзавот, 11,3 млн.тонна мева ва шу каби бир нечта экин турларининг ҳосили йўқотилади [2]. Ҳашаротлар орасида шира битлари асосий зааркунанда хисобланади. Ўсимлик ширалари тенг қанотлилар (*Hemiptera*) туркумининг *Aphidinea* кенжак туркумига мансуб бўлиб, ғўзага ширалардан бир неча тури зарар етказади. Булар орасида беда ёки акация шираси, полиз ва катта ғўза ширасилари ўта хавфлидир.

Шиralар ҳароратга қараб мавсум давомида 20-26 та, беда шираси эса 12-15 тагача бўғин беради. Шира билан заарланган ғўза майдонлари, йиллик ҳосилнинг 15-20 % қарийб 15 ш/га йўқотилишига олиб келади [3]. Трипс (*Thrips tabaci Lind*) ғўзанинг асосий сўрувчи зааркунандаларидан бири бўлиб, у ғўзанинг ёш ниҳоллик даврида барг хужайралари суюқлигини сўриб озиқланади. Баргларнинг шикастланиши натижасида ўсимликларнинг углерод захирасига путур етиб, ҳосилдорлиги тушиб кетиши кузатилади [4]. Ҳаво ҳарорати иссиқ ва куруқ келган йиллари июнь ойининг бошларида ғўзада ўргимчаккан (*Tetranychus urticae Koch*) катта зарар этказиб бошлади. Ўргимчакканы йилига 20-22 авлод бериб, шундан 10-12 авлоди ғўзанинг вегетация даврига тўғри келади. Ўргимчаккан нормал шароитда пахта ҳосилининг 6-10 фоизини, баъзи массивий тарқалган йилларда 30-35 фоизини нобуд қиласди [5]. Шу каби муаммоларни бартараф этиш мақсадида дунё олимлари томонидан кўплаб замонавий молекуляр-генетик ва ген муҳандислиги

усулларидан фойдаланиб фундаментал тадқиқодлар олиб борилмоқда. Ғўзанинг сўрувчи ҳашаротларига чидамли генларини ва миқдорий белгилар локусларини (QTL) аниклаш, уларни ДНК-маркерлари ҳамда ген муҳандислиги усулларидан фойдаланиб чидамсиз ғўза навларига интрогрессия (трансформация) қилиш ва шу асосида ғўзанинг чидамли навларини яратиш бутун дунё селекцион дастурининг долзарб масалаларидан бири саналади.

Чет эллик олимлар томонидан олиб борилаётган молекуляр ва ген муҳандислиги тадқиқотлари.

Ғўзанинг касалликларга, ҳашаротларга, биотик ва абиотик стресларга чидамлилигини ошириш бўйича дунё олимлари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ғўзанинг зааркунанда ҳашаротларига чидамли трансген ғўза олиш бўйича илк тадқиқотлар 1990 йилда бошланган бўлиб, унда ғўзанинг Сгу 1A (b) ва Сгу 1A (s) генлари ўсимлик тўқималари трансформация қилиниб, кўсак қурти тунламига (*Helicoverpa va Pectinophora*) чидамлилик намоён этган биринчи авлод трансген ғўзалар олинди. Олти йил ўтгач (1996 й.) Америка Кўшма Штатларининг (АҚШ) Монсанто компанияси томонидан илк бор ҳашаротларга чидамлилик намоён этган биотехнологик “Bollgard” ғўза нави жамоатчиликка тақдим этилди “Bollgard” ғўза навида *Bacillus Thuringiensis* (Bt) тупроқ бактеријасининг иккита Сгу1Ac ва Сгу2Ab генлари трансформация қилинган. Ушбу Bt ғўзалар АҚШ Қишлоқ Хўжалиги Департаменти томонидан олиб борилган дала ва лаборатория таҳлилларидан мувофиқиятли ўтиб, *Helicoverpa va Pectinophora* авлодига мансуб ҳашаротларнинг личинкаларига юқори чидамлилик намоён этди.

2015 йилда М. Ф. Аван ва бошқалар., ўз тадқиқотларида шуни кўрсатадики МИН-786 ғўза навига сўрувчи ҳашоратларга ва гербицидларга чидамлилигини ошириш учун турли кассеталарда клонланган Сгу1Ac + Сгу2A ва Glyphosate (GTG) генини 35S промотр асосида трансформация қилинган (1-жадвал).

Тадқиқотда ишлатилган праймер секвенслари.

Праймер номи	Секвенси (5'-3')	Махсулот ўлчами
Cry2A-F	AGATTACCCCAAGTCCAGAT	600 bp
Cry2A-R	GTTCCCAGGACTTTCTAT	
GTG-F	CCCTGGTGACAAGTCCATCT	358 bp
GTG-R	CTGCACACCCATCTCTGA	
Cry1A-F	ACAGAAAGACCCTTCATATC	565 bp
Cry1A-R	GTTACCGAGTGAAGATGTAA	

Трансген тўзаларнинг каллуслари аввал петри идишида, ундан олинган ўсимликлар иссиқхонада тувакларга ўтказилиб иқлимга муваффақиятли мослаштирилган. Олинган трансген ўсимликларда PCR ва ELISA таҳлиллари натижасида трансформация қилинган ген мавжудлиги тасдиқланиб, уларда оқсил экспрессияси сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланган [1].

Шунингдек, *Helicoverpa armigera* нинг личинкалари T_0 авлод трансген ҳамда 0-сегригант (нотрансген) тўзаларнинг барглари билан махсус контейнерларда озиқлантирилганда личинкалар T_0 авлод трансген тўзаларнинг барглари билан озиқланмаган. Аксинча назорат сифатида олинган нотрансген тўзанинг барглари билан озиқланганлиги аниқланган (1-расм).



Расм-1. *Helicoverpa armigera* личинкалари билан зарапланган барглар. А- T_0 авлод трансген тўза барги, В-нотрансген тўза барги.

Шунингдек, М.Санкешвар ўз жамоаси билан биргаликда тўзанинг сўрувчи хашаротларидан бири жассид хашаротига (Ўзбекистон республикаси учун карантин хашарот саналади) *Amrasca devastans* (*Dist.*) (*Hemiptera: Cicadellidae*) чидамлиликка ва ҳосилдорликка бириккан миқдорий белгилар (QTL) локусларини аниқлаш устида тадқиқотлар олиб боришган. Улар тадқиқотларида SNP (*Single nucleotide polymorphism*) маркерлар тўпламидан фойдаланиб 24 та QTL локусларини аниқлашган. Ушбу QTL локусларини мураккаб интервалли хариталаш (*Composite interval mapping* (*IciMapping 3.2/4.0 дастури*)) орқали таҳлил қилинганда, ўта юқори аниқликда еттига QTL локусларини намоён этиб, шулардан бештаси жассид хашаротига специфик бириккан ва уларнинг фенотипик вариацияси 8,83-11,64 фоизни ташкил этган) [7].

Хитой олимлари Mi Ni ва жамоадошлари РНК-интерференция технологиясида олинган тўза линиялари (РНКи) ва *Bacillus thuringiensis* (Bt) тўза линилари ўзаро дурагайлаш орқали генларини бир генотипга (генларни пирамидалаш усули орқали) жамлаб, кўсак куртига (*Helicoverpa armigera*)

чиdamli трансген линиялар олишган. 2015 йил тўзада генларни пирамидалаш усулидан фойдаланиб, Bt GK19 + JHA + JNB тўза навларини дурагайлаб F1 авлодларини олган. Шу йилнинг ўзида иссиқхона шароитида F1 дуругай авлодлари экилиб, улар ичидан гетерозигота холатидаги дурагайлар ажратиб олинган. Гетерозигота холатдаги F2 авлод дурагайларида real-time PCR таҳлилини амалга ошириб, GK19, JHA, JNB тўза навларининг бир хил миқдордаги ген копиясини тутган намуналар ажратиб олинган. Уларнинг нисбати таҳминан 6 фоизни яъни 1/16 нисбатни ташкил этган. 2016 йилларда *H. armigera* личинкаларига чидамли ва сезувчан 7 та тўза (булар 2 та назорат, Bt GK19 тўзаси, 2 та RNAi-тўза (JHAMT ва JHBP линиялари) ва 2 та генларни перамидалаш (Bt тўза ва 2 та RNAi- тўзаларнинг ўзаро дурагайлаш) асосида олинган линиялари) намуналари танлаб олиниб, заарланиш даражалари баҳоланган. Кўсак курти личинкаларига RNAi- тўзаларнинг ҳар иккаласи Bt тўзаларга нисбаттан сезиларли даражада чидамлилик намоён этган [8].

2014 йилда Lebin Li ва бир гурух олимлар

генларни пирамидалаш усулидан фойдаланиб, ғўзанинг асосий икки турига мансуб зааркунанда хашаротларига (*Spodoptera litura* ва *Heliothis armigera*) қарши кураш самарадорлигини ошириш учун, малекуляр-генетик усуллар орқали ёндошган ҳолда чидамлилик стратегиясини ишлаб чиқди ва улар Сгу9С, Сгу 2А ва Cry1Ac Bt генларини бир генотипга жамланган янги трансгенли ўсимликларин яратиш бўйича тадқиқотлар олиб боришиди. Дастроб Сгу9С генини ўз ичига олган, икки плазмидали вектор агробактерия воситасида Simian-3 элита навига трансформация қилинди.




2-расм. S3- Сгу9С генини ўзида тутган линия, Н318- Cry 2A ва Сгу 1Ас генларини ўзида тутган линия ҳамда L16- F_1 авлод дурагайлари.

Шунингдек Ҳиндистон Dharwad фарм қишлоқ хўжалиги университети олимлари 2012-2014 йиллар давомида олиб борилган тадқиқотларда ғўзанинг *Gossypium hirsutum* L. турига мансуб навларида сўрувчи зааркунандалардан бири жассид (*Amrasca beguttella Isida*) хашаротига (Ўзбекистонда карантин объект саналади) чидамлигининг морфологик, анатомик молекуляр-генетик ва биокимёвий асослари ўрганилган. Тадқиқотларда жассид сўрувчи хашаротига чидамли ва чидамсиз намуналар орасида чатиштириш ишлари ўтказилиб, 0774-3-3 × 1-2-1, Raider 276 × 8-1-2, 0774-3-3 × MCU-12, Raider 276 x MCU-13 комбинациялари олинган. F_2 ва F_3 авлодларида 200 га яқин SSR маркерлар панелидан фойдаланиб ПЦР скрининг ишлари олиб борилган, 4та комбинация бўйича ота-она намуналарида 19 та маркер бўйича полиморфизмни номоён килган. Полиморф маркерлар фоизи 9,5 %ни ташкил этган. Комбинацияларнинг F_2 авлодларида чидамлилик белгисига эга ўсимликлар танлаб олиниб, F_3 авлодларда ҳам ўрганилган. Мазкур дурагай комбинацияларидан ўзида

Сгу9С генларини учта трансгенли линияларда интеграцияси ва экспрессияси ПЦР ва RT-ПЦР билан тасдиқланган. Трансген линиялар орасидан ELISA таҳлиллари ёрдамида Сгу9С генининг экспрессия дарражаси энг юқори бўлган T_0 16-линияси (L16) танлаб олиниб, ўзида Сгу2А ва Сгу1Ас Bt генини тутган ўсимликларга чатиштирилган. Олинган F_1 авлод дурагайлари ва ота-она намуналари *Spodoptera litura* хашаротлари билан заарлантирилган. Ота-она намуналариган нисбаттан F_1 авлод дурагайлари юқори чидамлилик намоён этган [9].

чидамлилик маркер локусларини тутган намуналар ажратиб олинган [9].

Дарҳақиқат, заракунанда хашаротларга қарши курашишнинг энг самарали ҳамда экологик хавфсиз усулларидан бири генетик жихатдан чидамли янги биотехнологик навларни яратишdir. Биотехнологик усуллардан фойдаланиб яратилган навларни қишлоқ хўжалигига жорий қилиш орқали нафакат экологик хавфсизлик билан бир каторда пестицидларга сарфланадиган харажатларни қисқариши эвазига иқтисодий самарадорликнинг ошишига ҳам эришиш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Геномика ва биоинформатика маркази маркерларга асосланган селекция лабораториясида ғўзанинг сўрувчи заракунандаларига чидамли намуналарини яратиш устида катор изланишлар олиб борилмоқда. Фенотипик жихатдан чидамлиликни намоён қилган намуналардан геном ДНК си ажратилиб SSR праймерлари билан ПЗР скрининг қилинди ва намуналар орсида ўзаро генетик полиморфизм даражаси ўрганилди (3-расм).



Расм-3. М-маркер ва унинг 3,5% ли агарозали гелда келувчи молекуляр оғирликлари, 1-15-ҳашоратларга чидамли наъмуналар рақамлари ва уларнинг молекуляр оғирлиги бўйича гелдаги оғирлиги.

Ҳамда “геном селекцияси” усулидан фойдаланиб ҳашоратларга чидамли наъмуналар танлаб олиниб, тола сифати ва ҳосилдорлиги

Жадвал-2

№	Комбинациялар
1	F ₀ (Тафакур x Тошкент-1)
2	F ₀ (Тафакур x Deltapine)
3	F ₀ (Тафакур x C-4880)
4	F ₀ (Тафакур x L-91)
5	F ₀ (Саҳоват x Тошкент-1)
6	F ₀ (Саҳоват x Deltapine)
7	F ₀ (Саҳоват x L-91)
8	F ₀ (Равнақ-2 x Тошкент-1)
9	F ₀ (Равнақ-2 x Deltapine)
10	F ₀ (Равнақ-2 x C-4880)
11	F ₀ (Равнақ-2 x L-91)
12	F ₀ (Равнақ-1 x Тошкент-1)
13	F ₀ (Равнақ-1 x C-4880)
14	F ₀ (Равнақ-1 x L-91)
15	F ₀ (Барака x Deltapine)
16	F ₀ (Барака x L-91)
17	F ₀ (Султон x Тошкент-1)
18	F ₀ (Султон x C-4880)
19	F ₀ (Султон x Acala-3080)
20	F ₀ (Султон x L-91)
21	F ₀ (Бухоро-6 x Тошкент-1)
22	F ₀ (Бухоро-6 x C-4880)
23	F ₀ (Бухоро-102 x Тошкент-1)
24	F ₀ (Бухоро-102 x C-4880)
25	F ₀ (F ₂ (Rav-2 x Rav-1)) x Type Wagand 4
26	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-1x Stoneville213-228)) x Punktatum Gambia
27	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-1x Mebane B-1)) x Punktatum Gambia
28	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-1 x W-1)) x Type Wagand 4
29	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-1 x R-4)) x Type Wagand 4
30	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-1 x R-1)) x Baniela a Cross
31	F ₀ (BC1F ₂ (Rav-2 x Las Brenas) R-1) x №8582

Кейинги авлодларда ушбу дурагайлардан барг тўқималарини йиғиши, геном ДНК ажратиш ва уларда тегишли ДНК маркерлар билан ПЗР скрининг ишлари амалга оширилади. Олинган натижаларни генотиплаш ва ўзида донор QTL

локусларини тутган дурагайларда ўз-ўзига чанглантириш ҳамда реципиент генотиплари ёрдамида навбатдаги беккросс дурагайлаш ишларини ўтказиш режалаштирилган.

Адабиётлар

1. Bajaj, Y. P. S. // Biotechnology in Agriculture and Forestry (Cotton) 34: Plant protoplasts and genetic engineering VI. // Springer Publisher. Berlin., 7: 22-133. 1998 year.
2. Perlak, F.J., Deaton, R.W., Armstrong, T.A., Fuchs, R.L., Sims, S.R., Greenplate, J.T., & Fischhoff, D.A. // Insect resistant cotton plants // Bio Technology, 8, 939-943(1990).
3. В.С. Камбурова, Е.Ф. Назарова, И.Ю. Абдурахмонов // Оценка потенциальной токсичности ГМО // Ўзбекистон биология журнали 6-2018 27-31 б.
4. M. F. Awan , M. A. Abbas , A. Muzaffar , A. Ali1 , B. Tabassum , A. Q. Rao, I. Ahmad Nasir , and T. Husnain // Transformation of Insect and Herbicide Resistance Genes in Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // J. Agr. Sci. Tech. (2015) Vol. 17: 275-285.
5. Ҳ.Ў. Кимсанбоев, С.Ф. Эргашев//Энтомология, ўкув қўлланма /160-170 бб.
6. A.M.R. Gatehouse, N. Ferry, M.G. Edwards ва H.A. Bell // Insect-resistant biotech crops and their impacts on beneficial arthropods // Phil. Trans. R. Soc. B (2011) 366, 1438–1452 doi:10.1098/rstb.2010.0330
7. Mahantesh Sankeshwar, M. P. Jadhav, Sateesh Adiger, Rajesh S. Patil and I. S. Katageri // Mapping of QTLs for traits related to leaf pubescence, jassid resistance and yield in cotton (*Gossypium* spp.) // Indian J. Genet., 78(2): 252-260 (2018).
8. Mi Ni, Wei Ma, Xiaofang Wang, Meijing Gao, Yan Dai, Xiaoli Wei, Lei Zhang, Yonggang Peng, Shuyuan Chen, Lingyun Ding, Yue Tian, Jie Li, Haiping Wang, Xiaolin Wang, Guowang Xu, Wangzhen Guo, Yihua Yang, Yidong Wu, Shannon Heuberger, Bruce E. Tabashnik, Tianzhen Zhang, and Zhen Zhu // Next-generation transgenic cotton: pyramiding RNAi and Bt counters insect resistance // Plant Biotechnology Journal (2017) 15, pp. 1204–1213.
9. Lebin Li, Yi Zhu, Shuangxia Jin, Xianlong Zhang // Pyramiding Bt genes for increasing resistance of cotton to two major lepidopteran pests: *Spodoptera litura* and *Heliothis armigera* // Acta Physiol Plant (2014) 36:2717–2727.

Умедова М. Э, Хусенов Н.Н., Тураев О.С.

Создание новых сортов хлопчатника использование современно- молекулярный-генетических методов устойчивых к сосущими вредителями.

В этой статье обобщаются сосущих вредных, насекомых организмов на сельскохозяйственных культурах, важность борьбы с ними, преимущества использования биотехнологических методов при создании вредных организмов, устойчивых к вредителям, и разновидностей, созданных с помощью биотехнологических методов, и базовые исследования на этой основе.

Umedova M.E, Xusenov N.N, Turaev O.S.

Creating in varieties of new cotton resistant to sucking insects using modern molecular-genetic methods.

In this paper the harm of sucking insects to agriculture crops, the importance of combating them, advantages of using biotechnological methods in creating new varieties resistant to sucking insects and basic research on this basis has been described.

УДК:57.033:575.21:577.21

ХОЛМУРАДОВА М.М, ТУРАЕВ О.С, НОРМАМАТОВ И.С, НАБИЕВ С.М, КУШАНОВ Ф.Н.

ҒЎЗА УАК ПОПУЛЯЦИЯСИ БОШЛАНГИЧ НАМУНАЛАРИНИНГ ОПТИМАЛ ВА СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА ЎРГАНИЛГАН МОРФО-БИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Маколада ғўзанинг УАК популяциясини яратишда фойдаланилган бошлангич ота-она шакилларини қурғоқчиликка чидамлилиги бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари ёритилган. Тадқиқот натижаларига кўра ота-она генотиплари ўрганилган белгилар бўйича ўзаро кескин фарқ килиши номоён бўлди. Бу ўз навбатида ўрганилган генотипларни қурғоқчиликка чидамлилиги бўйича кенг тарқалган сегрегациясини кўрсатади.

Калит сўзлар: *Fўза*, қурғоқчиликка чидамлилик, QTL карталаштириши, ДНК маркери, УАК популяцияси

КИРИШ

Тирик организмларда кимёвий бирикмалар орасида миқдор жихатдан сув асосий ўринни эгаллайди. Ҳаётий жараёнларнинг пайдо бўлиши ва фаоллиги сувсиз амалга ошмайди [1]. Бундан ташқари, у туз ва озуқа моддаларнинг транслокациясида муҳим роль ўйнайди. Ёғингарчиликнинг кам бўлиши ва суғориш сувларининг етарли эмаслиги қурғоқчил ва ярим қурғоқчил худудлардаги ўсимликларни суғориша жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Қурғоқчилик, абиотик стресслар ичida пахта ҳосили ва толаси сифатига энг жиддий таъсир этувчи омил сифатида қаралади. Сувсизлик стресси энг аввало фўза ўсимлигининг тургор ҳолатига қолаверса, ҳужайраларнинг ўсиш тезлигига таъсир этади [2].

Фўза (*Gossypium hirsutum* L.) - ҳосилнинг пасайишига олиб келувчи қурғоқчилик стрессига жуда ҳам сезгир ўсимликдир. Қурғоқчилик ёки сув танқислиги фўзанинг физиологик ўсиши ва ҳосилнинг самарадорлигига таъсир қилувчи мураккаб жараён ҳисобланади [3]. Қурғоқчилик ўсимлик гуллаши ва кўсаклаш хусусиятининг пасайишига ва бу орқали ҳосилдорликнинг кескин тушиб кетишига олиб келади. Қурғоқчиликнинг зарарли таъсирини фўзанинг сувсизликка чидамли навларини яратиш орқали қискартириш мумкин [4].

Фўзанинг гуллаш ва кўсагининг ривожланиши даврида суғориш, пахта ҳосилини белгиловчи энг муҳим босқичлар ҳисобланади [5]. Шундай экан, фўзанинг қурғоқчиликка чидамлилигини ўрганиши нафақат назарий қизиқиш, балки соҳада амалий аҳамиятга эга. Бу эса олимларни қурғоқчиликка чидамли фўза навларини яратиш бўйича тадқиқотлар олиб бориши имконини беради.

Дунё олимлари томонидан фўзада қурғоқчиликка чидамлиликнинг молекуляр асосларини тадқиқ этиш натижасида бир қанча ютукларга эришилган. Бирок, кўп холларда аниқланган ДНК маркерлари (QTL локуслари) генетик жихатдан чегараланганди бидурагай популяцияларда амалга оширилганлиги сабабли нофункционалдирлар. Кимматли ҳўжалик белгилари билан бириккан ДНК маркерларни идентификация қилишда турли усууллар ишлаб чиқилган бўлиб, булар орасида уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) усули юқори потенциалга эга ҳисобланади [6].

Карталаштиришнинг илғор технологияларидан бири бўлган уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) – бугунги кунда баъзи ўсимликлар, шунингдек қишлоқ ҳўжалик экинлари генларини карталаштиришда ўз самарасини бермоқда. Бу технологияни фўза молекуляр-генетик

тадқиқотларига тадбиқ қилиш, фўзадаги муҳим генетик локусларни/генларни ўта аниқлиқда карталаштириш имконини беради.

УАК стратегияси кўра фўзада қурғоқчиликка чидамлилик генларни идентификация қилиш учун энг аввало яратилган популяциянинг ота-она генотипларини фенотипик ва генотипик жихатдан чуқур ўрганиш талаб этилади.

Шунга кўра биз, ўз тадқиқотларимизда фўзада яратилган УАК популяцияси бошланғич материалларининг қурғоқчилик шароитида айрим морфо-биологик белгиларни тадқиқ этишни мақсад килдик.

Тадқиқот материали ва услублари

Тадқиқот обьекти сифатида Фўзада УАК-популяциясини яратиш мақсадида танлаб олинган муҳим морфо-хўжалик белгилари ва ноёб QTL (Quanitative Trait Loci) аллеллари билан ҳарактерли кўйидаги KK1796, KK1795, L-1000, C-9006, KK1086, Catamarca 811, C-9008, L-N1, L-141, Napicala-19, 0-030, C-4769, L-45, Занги-Ота, Saenr Pena 85, C-2025, KK-602, SAD-35-11, C-417 генотиплар ва она генотип сифатида танланган маҳаллий Наманган-77 нави олинди.

Фўзанинг ҳосилдорлиги катта аҳамиятга эга бўлган морфо – хўжалик белгилари бўйича олиб борилган тадқиқотларимиз Геномика ва биоинформатика марказининг Махсус ургучилик хўжалиги тажриба даласида амалга оширилди. Тадқиқот обьекти сифатида олинган УАК популяциясининг ота-она генотиплари икки хил фонда, оптималь суғориш режими ва сув танқислиги режимида уч такрордан экиб ўрганилди. Намуналар суғоришнинг оптималь фонида 1x2x1 схемасида (гуллашгача бир марта, гуллаш даврида икки марта ва гуллашдан сўнг бир марта) ва сув танқислиги фонида 0x1x0 схемасида (фақат гуллаш даврида бир марта) суғорилди.


Икки хил суғориш фонида ўстирилган ўсимликларда гуллар сони, ўсимлик бўйи, кўсаклар сони, моноподиал ва симподиал шохлар сони, биринчи ҳосил шохининг баландлиги каби морфо-биологик кузатувлар олиб борилди.

Тадқиқот натижалари

Тадқиқот натижасида оптималь суғориш фонида ўстирилган Наманган-77, Napicala 19, L-141, SAD-35-11 ва Занги-Ота намуналари мос равишида 79, 78, 77, 77 ва 75 сантиметрни ташкил этди. Сув танқислиги фонида ўстирилган худди шу намуналарнинг бўйи тегишли равишида 61, 62, 62, 63 ва 59 сантиметрни ташкил қилди. Шунингдек, оптималь суғориш фонида ўстирилган C-9008 (60 см), C-9006 (61 см), Saenr Pena 85 (61 см), KK-1795 ва KK-1086 (62 см) энг бўйи паст намуналар экнлиги маълум бўлди. Сув танқислиги

фонида ўстирилган ўсимликлар орасида эса C-9008 (41 см), KK-1086 (46 см) ва Catamarca 811 (49 см) энг бўйи паст намуналар эканлиги аниқланди. Ҳар иккала шароитда ўстирилган намуналарнинг бўйи борасидаги энг катта фарқ C-9008 навида 119 см, Catamarca 811 линияси ва Наманган-77 навида 18 см, L-N1 ва Hapicala 19 линияларида 16 сантиметрни ташкил этди. Шунингдек, иккала суғориш фонида

ўстирилган C-417 нави ўсимлик бўйидаги ўртачи фарқ 3 см, KK-1795 навида 8 см ва 0-030 линиясидаги ўзаро фарқ 8 сантиметрни ташкил қилди. Бу эса ўз навбатида, мазкур нав ва линиялар курғоқчилик стресси шароитида бошқа намуналарга нисбатан яхшироқ ўсиши ва ривожланиши мумкинлигидан далолат беради (1-расм).




1-расм. УАК популяцияси бошлангич намуналарининг бўйи (см)

1-Наманган -77, 2-KK-1796, 3-KK-1795, 4-L1000, 5-C-9006, 6-KK-1086, 7-Catamarca 811, 8-C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-C-4769, 14-L-45, 15-Занги-Ота, 16-Saenr Pena 85, 17-C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417.

Сув танқислиги фонида ўстирилган назорат намуналарида ҳосил элементларидан бири ҳисобланган умумий кўсаклар сони ўрганилганда 20 та намуналар орасидан KK-1086, C-9008, C-2025 навлари оптималь фондагига нисбатан кучли фарқ намоён бўлмаган. Бу эса уларда курғочиликка чидамлилик хусусиятининг бошқа намуналарга қараганда юқорироқ эканлигидан далолат беради.

Бундан ташкари, Наманган -77, C-9006, Hapicala 19 ва C-4769 генотиплари мазкур белги бўйича кескин фарқлиликни намоён этди. Шунингдек, кўсаклар сони белгиси бўйича сув танқислиги фонидаги 0-030 генотипи энг юқори кўрсаткич билан оптималь суғориш фонидаги назорат ўсимликларидан хам ўзиб кетганлигини кўришимиз мукин (2-расмга қаранг)



2-расм. УАК-популяцияси ота-она намуналарининг “кўсак сони” белгисининг турли шароитлардаги қиёсий диаграммаси

1-Наманган -77, 2-KK-1796, 3-KK-1795, 4-L1000, 5-C-9006, 6-KK-1086, 7-Catamarca 811, 8-C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-C-4769, 14-L-45, 15-Занги-Ота, 16-Saenr Pena 85, 17-C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417.

Ота-она намуналарининг оптималь шароитда ўстирилган варианtlарида курғоқчилик мухитида ўстирилганларига нисбатан кўсак сони юқори бўлган. Оптималь фонда кўсак сони бўйича энг юқори кўрсаткични Наманган -77 (22 та), C-9006

(20 та), 0-030 (20 та), C-4769 (20 та) ҳамда C-417 (20) намуналари намоён этди. Сув танқислиги фонида ўстирилган ўсимликлар орасида 0-030 (21 та) намунаси кўсак сонининг нисбатан кўпроқ эканлиги билан ажralиб турди.




3-расм. УАК-популяцияси ота-она намуналарининг “очилган кўсак сони” белгисининг турли шароитлардаги қиёсий диаграммаси

1-Наманган -77, 2-КК-1796, 3-КК-1795, 4-L1000, 5-C-9006, 6-KK-1086, 7-Catamarca 811, 8-C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-C-4769, 14-L-45, 15-Занги-Ота, 16-Saenr Pena 85, 17-C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417.

Турли хил экстремал шароитларда ўсимликлар тезроқ ўсиб, етилиб насл қолдиришга харакат қиласидилар, шунинг учун ҳам сув танқислиги шароитида ўсан ўсимликлар нормал мухитдаги ўсимликларга қараганда тез гуллаб ҳосил беради. Шу сабабли биз тадқиқотларимиз давомида назорат ва сув танқислиги фонидаги ўсимликларимизни очилган кўсаклар сонини ҳам аинқладик. Бунга кўра курғоқчилик фонидаги намуналардан C-9008 (17 та) навида очилган кўсаклар сони мазкур фондаги бошқа намуналарга ҳамда айнан шу навнинг оптималь мухитидаги назорат ўсимлигига қараганда

энг юқори бўлди. Шунингдек, сув танқислиги фонидаги С-2025 навида ҳам очилган кўсаклар сони бўйича оптималь фондагига нисбатан кучли фарқ намоён бўлмади (3-расм). Бундай юқори кўрсаткич навнинг курғоқчилик шароитига мослашувчанлигидан далолатdir. Бундан ташқари, Наманган-77, C-9006, Hapicala 19 ва L-45 намуналарида икки мухит ўсимликлири орасида кескин фарқ кузатилди. Бу эса уларнинг қолган генотипларга нисбатан сувсизликка чидамлилиги пастроқ эканлигини билдиради.



4-расм. УАК популяцияси ота она намуналарининг турли хил тажриба мухитда “моноподиал шохлар сони” белгисининг қиёсий диаграммаси


1-Наманган -77, 2-КК-1796, 3-КК-1795, 4-L-1000, 5-C-9006, 6-KK-1086, 7-Catamarca 811, 8-C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-C-4769, 14-L-45, 15-Занги Ота, 16-Saenr pena 85, 17-C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417.

4-расмда кўринадики, қурғоқчилик C-9006 ва C-4769 намуналарида моноподиал шохлар сонининг кескин камайишига сабаб бўлган. Аксинча Hapicala 19 намунасининг сув танқислиги фонидаги ўсимликтин моноподиал шохлари сони

оптималь мухитдаги назорат ўсимликларини каганда юқори бўлган. Ҳар иккала фондаги моноподиал шохлар сонининг деярли тенглигини 0-030 намуналарида кўришимиз мумкин (4-расм).

Симподиал шохлар сони ғўза хосилдорлигини белгиловчи асосий белги хисобланади. Курғоқчилик шароитида ўрганилаётган намуналарнинг “симподиялар сони” белгиси 8 дан 13 тагачани намоён этди (5-расм). Ушбу кўрсаткич бўйича энг яхши натижани Наманган -77, L-N1 ва

0-030 намуналари кўрсатди. Энг паст натижани эса Saenr pena 85 намаунаси намоён этди. 6-расмда келтирилган натижалар диаграммасига кўра Наманган -77 генотипида симподиал шохлар сони ҳар икки фонда ҳам тенг эканлигини кўриш мумкин.




5-расм. УАК популяцияси ота она намуналарининг турли хил тажриба муҳитида “симподиал шохлар сони” белгисининг қиёсий диаграммаси

1-Наманган -77, 2-КК-1796, 3-КК-1795, 4-Л-1000, 5-С-9006, 6-КК-1086, 7-Catamarca 811, 8-С-9008, 9-Л-N1, 10-Л-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-С-4769, 14-Л-45, 15-Занги Ота, 16-Saenr pena 85, 17-С-2025, 18-КК-602, 19-SAD-35-11, 20-С-417.

Ғўза генетикаси ва селекцияси билан шуғулланувчи кўплаб олимларнинг таъкидлашича, ғўза биринчи хосил шохининг баландлиги вегитация фазаси билан ижобий корреляцияга эга. Бошқача қилиб айтганда,

биринчи хосил шохи қанча баланд бўлса, вегетацион фазаси шунча чўзилади. Аксинча қанча паст бўлса, вегетацион фазаси шунча қисқа бўлади ва бундай ўсимликлар эртапишар ҳисобланади.



6-расм. УАК популяцияси ота-она намуналарининг икки хил тажриба муҳитида “биринчи хосил шохининг баландлиги” белгисининг қиёсий диаграммаси

1-Наманган -77, 2-КК-1796, 3-КК-1795, 4-Л-1000, 5-С-9006, 6-КК-1086, 7-Catamarca 811, 8-С-9008, 9-Л-N1, 10-Л-141, 11-Hapicala 19, 12-0-030, 13-С-4769, 14-Л-45, 15-Занги Ота, 16-Saenr pena 85, 17-С-2025, 18-КК-602, 19-SAD-35-11, 20-С-417.

Тадқикотларимизда, қурғоқчилик муҳитида экилган намуналар биринчи хосил шохининг баландлиги белгиси бўйича ўрганилганда олинган натижалар қуидагида тахлил қилинди. Бунда КК-1796, КК-1795, Л-45, С-2025, КК-602 ва SAD-35-11

намуналарда Hs оптималь муҳитдагига қараганда юқори бўлди. Наманган -77 ва Л-141 генотипларда бу белги бўйича деярли тенг кўрсаткичдалигини кўришимиз мумкин (6-расм қаранг). Бу намуналарни Hs белгиси бўйича қолганларига

қараганда қурғоқчиликка мослашувчан дейиш мүмкин. Қолган намуналарда эса Нс кўрсаткичи отимал муҳит назорат ўсимликларига қараганда қурғоқчилик муҳитидаги ўсимликларда паст бўлди.

ХУЛОСА

Хулоса килиб айтганда, УАК популяцияси ота-она шаклларининг қурғоқчилик шароитидаги

Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази

хилма-хил фенотипик кўрсаткичлари улар асосида яратилган популяциянинг мазкур кўрсаткилар бўйича кенг генетик сегрегациясидан далолат беради ва натижада ушбу популяция қурғоқчилик каби ташки муҳит стрессларига жавобгар геном регионаларини чуқурроқ ўрганишнинг имконини берувчи муҳим восита бўлиб хизмат қиласди.

Қабул қилинган вақти
18 апрел 2019 йил

Адабиётлар

1. Rampino P. 2006. Drought stress Responses in Wheat: Phisiological and Molekular analysis of Resistant and Sensitive Genotypes//Plant, cell, Environ., pp. 365-375.
2. Wiggins MS, Leib BG, Mueller TC, Main CL. 2013. Investigation of physiological growth, fiber quality, yield, and yield stability of upland cotton varieties in differing environments. J. Cotton Sci. 17:140-148. (101)
3. Abid Ullah, Heng Sun, Xiyang Yang and Xianlong Zhang. 2017. Drought coping strategies in cotton: increased crop per Drop. Plant Biotechnology Journal 15, pp. 271–284.
4. Muhammad Iqbal, Mueen Alam Khan, Muhammad Naeem, Usman Aziz, Javeria Afzal and Muhammad Latif. 2013. Inducing Drought Tolerance in Upland Cotton (*Gossypium hirsutum* L.), Accomplishments and Future Prospects. World Applied Sciences Journal 21 (7): 1062-1069.
5. Han HL, Kang FJ. 2001. Experiment and study on effect of moisture coerce on cotton producing. Trans. CSAE 17:37-40 (36)
6. Abdurakhmonov, I.Y.; Kohel, R.J.; Yu, J.Z.; Pepper, A.E.; Abdullaev, A.A.; Kushanov, F.N.; Salakhutdinov, I.B.; Buriev, Z.T.; Saha,S.; Scheffler, B.E.; Jenkins, J.N. & Abdukarimov, A. (2008). // Molecular Diversity and Association Mapping of Fiber Quality Traits in Exotic *G. hirsutum* L. Germplasm. Genomics, Vol. 92, No. 6, (October 2008), pp.478-487, ISSN 0888-7543.
7. Muhammad Asif Shahzad, Sami Ullah Jan, Fakiha Afzal, Maria Khalid, Alvina Gul, Iti Sharma, Adriano Sofo and Parvaiz Ahmad. (2016). Drought stress and morphophysiological responses in plants. Book “Water Stress and Crop Plants”. A Sustainable Approach, Volume 1, Chapter 27. P.452-467. (3)
8. Ahmed M, Asif M, Sajad M, Khattak JZK, Ijaz W, Fayyaz-ul-Hassan, Wasaya A, Chun JA (2013). Could the agricultural system be adapted to climate change. A review. Aust. J. Crop Sci 7:1642-1653.(13)

Холмурадова М.М, Тураев О.С, Нормаматов И.С, Набиев С.М, Кушанов Ф.Н.

Аналзы морфо-биологических показателей у исходных образцов ГАК популяции хлопчатника в оптимальной и засушной условиях

В статье освещены исследования по изучению устойчивости к засухе по некоторых показателей у исходных родительских форм, взятых для создания ГАК популяции хлопчатника. Результаты исследования показали, что родительские генотипы резко различаются между собой по данному признаку. Это, в свою очередь, свидетельствует о широкой сегрегации генотипов по их устойчивости к засухе.

Kholmuradova M.M, Turaev.O, Normamatov I.S, Nabiev S.M, Kushanov F.N.

Analysis of morpho-biological parameters of the original samples of the NAM population on optimal and drought conditions

This article highlights studies on the drought tolerance of the original parental forms, taken to create the NAM-cotton population. The results of the study showed that the parental genotypes differ sharply among themselves according to this trait. This, in turn, indicates a wide segregation of genotypes because of their resistance to drought.

НОРМАМАТОВ И.С., ТУРАЕВ О.С., ХОЛМУРОДОВА М.М., ХУСЕНОВ Н.Н., МАКАМОВ А.Х., УМЕДОВА М.Э., ЙЎЛДАШОВА Н.З.

ЎРТА ТОЛАЛИ (*G.hirsutum*) ФЎЗА НАВЛАРИНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК БЕЛГИЛАРИГА ШЎРЛANIШНИНГ ТАЪСИРИ

Ушбу маколада, фўзада яратилган уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) популяцияси ота-она генотипларининг морфо-биологик белгиларига тупроқ шўрланишининг таъсирини ўрганиш натижалари ёритилган. Тадқиқотда фўза намуналари шўрланган ва оптимал шароитида уч тақордан экилиб, ўсимлик бўйи, биринчи ҳосил шохининг баландлиги, симподиал ва моноподиал шохлар сони, ҳосил элементлари сони каби белгилар ўзаро таққосланган.

Калит сўзлар: *ғўза, шўрланиш, фенотип, морфо-биологик белгилар, УАК, MAC, QTL, NAM.*

КИРИШ

Ҳозирги кунда молекуляр биология ва амалий селекция учун муҳим аҳамиятга эга бўлган фўзанинг ҳосилдорлиги юқори, тезпишар, турли хил касалликларга, биотик ва абиотик муҳитга мослашувчан хусусиятларга эга бўлган истиқболли навларни яратиш долзарб муаммолардан биридир [1]. XXI аср бошига келиб иқлим сезиларли даражада ўзгарди, бунинг асосий сабабларига тупроқ шўрланиши, курғоқчилик ва температуранинг кескик ўзгаришини айтишимиз мумкин. Бу абиотик стресслар тупроқдаги органик моддалар таркибининг ўзгариши ва ундаги микроорганизмларнинг йўқолишига олиб келди ва бу қишлоқ хўжалиги самарадорлигига салбий таъсир кўрсатди[2]. Статистик маълумотларга қараганда, бугунги кунга келиб дунёдаги барча сұфориладиган ер майдонларининг 1/3 қисми турли хил даражада шўрланганлиги аниқланган [3]. Тупроқдаги ортиқча туз ўсимлик танасида керакли органик моддаларнинг шакланишига салбий таъсир кўрсатади ва натижада ўсимликнинг турли хил стрессли шароитларга нисбатан чидамсизлиги ортиради. Бундан ташкари, ўсимлик ҳосилини кескин камайтириб, сифатининг пасайишига олиб келди[4]. Шуларни хисобга олган ҳолда, бугунги кунда ўсимликларда шўрланиш стрессига бардошли, содда ва арzon биологик усувларни ишлаб чиқиши шунингдек, ўсимликларнинг кучли шўрланган тупроқларда ҳам ривожлана оладиган янги фўза навларини яратиш олимларимиз олдида турган муҳим вазифалардан биридир. [5].

Шўрланган тупроқли муҳитда экилган фўзанинг ҳужайраларида кечадиган физиологик жараёнларига салбий таъсир қилиб, маълум даражада уларнинг фенотип ҳамда морфобиологик белгиларининг ўзгаришига ҳам олиб келади. Шуларни инобатга олган ҳолда, фўзада яратилган уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) популяцияси ота-она генотипларида морфобиологик белгиларининг ривожланишига тупроқ шўрланишининг таъсирини ўрганиш мақсад қилинган.


МАТЕРИАЛЛАР ВА УСЛУБЛАР.

Мазкур тадқиқотда келиб чиқиш турли минтақалардан бўлган ва тола сифат белгилари бўйича ўзида маркер белгисини тутган KK-1796, KK-1795, L-1000, C-9006, KK-1086, Catamarca 811, C-9008, L-N1, L-141, Hapicala-19, 0-030, C-4769, L-45, Занги-Ота, Saenr Pena 85, C-2025, KK-602, SAD-35-11, C-417 донор линиялар ва реципиент сифатида Наманганд-77 нави тадқиқот обьекти сифатида фойдаланилди. УАК популяцияси ва уларнинг бошланғич намуналарини шўрга чидамлилигини ўрганиш максадида икки худудда Геномика ва биоинформатика марказининг Maxsus уруғчилик хўжалиги (МУХ)да ва ПСУЕАИТИ (Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти) да уч тақорда 10 метрдан 90x20x1 схемада Рондом усулидан фойдаланиб экилди. Тажриба майдони тупроғининг шўрланиш даражасини аниқлаш мақсадида турли жой ва чуқурлиқдаги тупроқ намуналари таҳлил қилинди ва тажриба майдони ўрта даражада сулфат тузлари билан шўрланганлиги аниқланди. УАК ота-она ўсимлик намуналарининг бўйи, моноподиал шохлар сони, симподиал шохлар сони, шохланиш типи, кўсаклар сони, поясининг тукланиш даражаси, биринчи ҳосил шохи баландлиги каби морфологик белгилари ўрганилди.

Статистик таҳлил. Маълумотларни статистик таҳлил қилиш SOFA ва NCSS 2003 статистик пакет дастурларининг GLM (General Linear Model) моделидан фойдаланиб амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Таҳлил натижаларига кўра ўзаро икки хил муҳитда ўстирилган намуналарда, ўсимлик баландлиги белгиси бўйича сезиларли даражада фарқ қилди (1-расм). Сирдарё вилоятида шўрланган тупроқда ўстирилган намуналар, оптимал муҳитда ўстирилган ўсимликларга қараганда сезиларли даражада калталигини кўриш мумкин.




1-расм. NCSS статистик дастурий пакетининг GLM (General Linear Model) умумий чизиқли модел ёрдамида УАК папуляцияси ота-она генотипларида ўсимлик бўйининг қиёсий таҳлили.

Оптимал мухитда ўстирилган ғўза генотипларидан L-N1 ва L-141 намуналарида бўйининг баландлиги 100-120 см оралиғида, C-9008, KK-1086 ва Catamarca 811 генотипларида эса ўртacha 70-80 см баландликни ташкил этди. УАК ота-она намуналарининг орасидан C-9006, 0-030 ва SAD-35-11 генотиплари икки мухитда хам ўсимлик бўйи бир хил натижини кўрсатди. Шўрланган тупроқ мухитда эса экилган ғўза намуналаридан L-N1, L-141 ва SAD-35-11 генотиплари энг юқори кўрсаткични ўртacha 80-90 см, шунингдек KK-1796, KK-1086, C-9008 хамда C-4769 намуналарида энг паст кўрсаткични ўртacha 60-65 см баландликни ташкил

этди. Такидлаш керакки шўрланган тупрокли мухитда ғўзанинг ўсиш оптимал мухитга нисбатан сезиларли даражада фарқликни намоён этган.

Ғўза ўсимликларида биринчи ҳосил шохининг баландлиги (hs) жуда мухим аҳамиятга эга бўлган морфобиологик белгилардан бири ҳисобланади. Ўрганилаётган белги бўйича олинган таҳлил натижалари шуни кўрсатдиги шўрланган мухитда ўстирилган тола сифат белгилари бўйича ўзида маркер белгисини тутган 19 та донор линиялари ҳаммасида оптимал мухитда ўстирилган намуналарга қараганда биринчи ҳосил шохининг баландлиги юқорида жойлашганини кўриш мумкин.




2-расм. УАК папуляцияси ота-она генотипларида ўсимликларнинг биринчи ҳосил шохи баландлигининг қиёсий таҳлили.

Фақат реципиент сифатида олинган Наманган-77 навида биринчи ҳосил шохининг баландлиги оптимал мухитда ўстирилган ўсимлик намунасида шўрланган мухитдагига нисбатан юқорироқ кўрсаткични кўрсатди.


Шунингдек, барча генотипларнинг ҳосил элементларини таққослагандা кўпчилигини орасида

фарқлик деярли кўринмади. Факатина KK-602 ва SAD-35-11 генотипларида шўрланган мухитда 10 - 16 донани ва оптимал мухитда 22-32 донани ташкил этди. Ушбу намуналарнинг шўрланган мухитдаги ҳосил элементлар сони (ҳосилдорлик) нинг тенг икки бараварга камайганини кўриш мумкин (3-расм).



3-расм. УАК папуляцияси ота-она генотипларида ўсимликларнинг ҳосил элементлари сонининг қиёсий таҳлили.

Ўрганилаётган УАК ота-она генотипларида шўрланиши сабаб бўлганини кўриш мумкин симподиал шохлар сонининг камайишига тупроқ (4-расм).



4-расм. УАК папуляцияси ота-она генотипларида ўсимликларнинг симподиал шохлар сонининг қиёсий таҳлили.

Симподиал ҳосил шохларининг шўрланган мухитда умумий ўртача сони 10 донани, оптималь мухитда эса 16 донани ташкил етди. Шунингдек, KK-1796, C-9006 ва Saenr Pena 85 линияларида ҳар икки мухитда симподиал шохлар сони бир хил кўрсаткични намоён этган бўлсада, аммо KK-1086, C-2025 ва SAD 35-11 линияларида ушбу белги шўрланган мухитга нисбатан оптималь мухитда юқори кўрсаткични намоён қилди.

Хулоса қилиб айтганда, таҳлил қилинган морфобиологик белгилари бўйича яхши кўрсаткичларга эга УАК популацияси ота-она шакллари келгусида ғўзада молекуляр генетик карталаштириш учун бебоҳо манбага айланади. Шунингдек, хилма-хил шароитларда ўстирилган ота-она намуналарининг шўрга чидамлилик каби белгиларга генетик боғланган QTL (Quantitative Trait Locus) ларни аниқлашга хизмат қиласди.

Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази

Қабул қилинган вақти 12 май 2019 йил

Адабиётлар

- Ahmad P., Hashem A., Abd_Allah E.F., Alqarawi A.A., Gucel S. Role of *Trichoderma harzianum* in mitigating NaCl stress in Indian mustard (*Brassica juncea* L) through antioxidative defense system. Front. Plant Sci. 2015;6:868.

2. Bartels D, Sunkar R. Drought and salt tolerance in plants. *Cri Rev Plant Sci* 2005; 24:23-58.
3. Battisti DS, Naylor RL. Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal heat. *Science* 2009; 323:240-4.
4. Yeo, A.R. (1999) Predicting the interaction between the effects of salinity and climate change on crop plants. *Sci. Hortic. (Amsterdam)* 78, 159–174
5. Epstein, E. et al. (1980) Saline culture of crops: a genetic approach. *Science* 210, 399–404

**Нормаматов И.С., Тураев О.С., Холмуродова М.М.,
Хусенов Н.Н., Макамов А.Х., Умедова М.Э., Йўлдашова Н.З.**

**Влияние солене в морфобиологических признаков у средно волокнистного хлопчатника
(*G.hirsutum*)**

В статьи приведены результаты исследований хлопчатника созданных в (картографирование клеточных ассоциаций (УАК),) популяции родительских генотипов воздействии морфологических признаков солевых почвенных условиях. В исследования использованный образцы изучена в солевых и несолёных условиях и засеяна трех повторности, анализировано высота растений, количество симподиальных и моноподиальных ветвей, количество коробочек.

**Normamatov I.S., Turayev O.S., Kholmuradova M.M.,
Khusenov N.N., Makamov A.X., Umedova M.E, Yuldasheva N.Z.
Effect of salinity to morphologic traits in upland cotton (*G.hirsutum*)**

In this article observed the effects of soil salinity on morphological markers of parent genotypes nested associative mapping (NAM) populations created in cotton. The studies used samples were studied in salt and unsalted conditions and were seeded in triplicate, the plant height, the number of sympodial and monopodial branches; the number of boxes were analyzed.

ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

УДК: 632.731

И.Р. САЙДОВ

ТРИПС (PLEOTHRIPIDAE) ОИЛА ВАКИЛЛАРИНИ ФАУНАСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА ПОПУЛЯЦИЯСИННИГ ШАКЛЛАНИШИ

Бу масалада дунё олимларининг кўп йиллик изланишлари мавжуд. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш билан бирга унинг зарарли организмлардан ҳимоя қилиш, экологик тоза усуllibарини ишлаб чиқиш ва ресурстежамкор технологиялардан фойдаланган ҳолда халқимизни экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш ўта долзарб ҳисобланади.

Калит сўзлар: *триплар, фауна, биоэкология, ареал, дунё, миқдор, тухум қўювчилар, туркум, популяция, маҳсулот, қанот, личинка, биоценоз, ҳашарот.*

Дунё қишлоқ хўжалигидаги барча экинларни 1500 дан ортиқ турдаги хавфли ҳашаротлар зарарлайди ва инсоният уларга қарши ҳар йили жуда катта маблағ ва ишчи кучи сарфлайди. Ушбу зараркунандаларни чукур ўрганиш ва илмий шартларга кўра тадқиқ этиш ҳамда илмий асосда ҳашаротлар миқдорини бошқариш осон иш эмас. Бу масалада дунё олимларининг кўп йиллик изланишлари мавжуд. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш билан бирга унинг зарарли организмлардан ҳимоя қилиш, экологик тоза усуllibарини ишлаб чиқиш ва ресурстежамкор технологиялардан фойдаланган ҳолда халқимизни экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш ўта долзарб ҳисобланади.

Триплар оиласи жаҳон фаунаси ичига анча катта бўлиб 4500га яқин турлари бор, улардан ҳамдўстлик давлатларида 300 тури, Марказий Осиёда эса 200 га яқин турлари учрайди (Дербенева, 1980). Триплар туркуми иккита кичик туркумга бўлинib, биринчиси тухум қўювчилар (*Terebrantia*) ва иккинчиси трубадумлиларга (*Tubulitera*) бўлинади.

Пучгултрипси (*Haplothrips saculeatus* Fabr.). Пучгултрипси деб аталмиш вояга етган ҳашарот 1,4-1,7 мм катталикда, ранги қора ёки тўқ кўнғир рангда бўлади. Мўйлови 8 бугими, учинчи бўгими оқиш, олди кўкрагининг кенг томони камроқ кенгайган. Танаси ингичка ва узун, қорин сегментининг охирини чўзилиб найга айланган, бу найнинг туби учига

нисбатан икки марта кенгрок, қанотларида томирлари бўлмайди. Тиниқ рангда четларида узун тукчалари бор.

Янги қўйилган тухуми оқ сариқ, кейинчалик сариқ рангда бўлади. Тухумининг узунлиги 374-425 мк., эни 125-135 мк. Катталикда бўлади. Личинкаси қизғиши сариқ тусда, қорнининг охирги бўллаги қизил рангда, унинг охирда узун қиллари бор, бу қиллар қориннинг охирги бўллагидан 3 марта узун. Личинкасининг узунлиги 0,8 мм. Гача бўлади. Пучгул трипсининг урғочиси вояга етган ҳолда қишлияди. Эркаги эса кузда урғочиси билан жуфтлашгандан кейин ўлиб кетади. Улар ғалла далаларида, ўсимлик қолдиклари орасида, тупроқдаги кесаклар орасида, ёввойи ғалласимон ўтларда, айниқса дала четларида, дараҳтларнинг тўкилган барглари орасида қишлиб чиқади. (Дядечко 1963-1964).

Эрта баҳорда жинсий етилган урғочи пучгул триплар учиги чиқиб, кузги ғалла экинларига, ёввойи ғалласимон ўтлар ва экинларга тушади. (Джиембоева ва бошқалар 1961) Улар ўсимликни барг қинчалари ва бошокларига жойлашиб олади. Пучгул трипси бегона ўтлардан ғумай, ажриқни яхши кўради. Бундан ташқари, трипс, откулок ўсимлигига ҳам яшайди. Бу ўсимликларда трипсининг дастлабки авлоди ривожланади. Пучгул трипсининг иккинчи авлоди шолини, кисман маккажўхорини ҳам шикастлайди, шунингдек бошқа ўсимликларга, ғалласимон ўтларга ҳам ўтади.

Трипс шоли баргини ҳали ёзилмаган вақтида сўра бошлайди. Шунинг учун барг ёзилганда унинг шикастланган жойлари кўриниб туради. Баргнинг трипс сўрган жойидаги тўқималарини нобуд бўлиши натижасида унинг тўқималари очилиб оқ парда каби бўлиб колади. Бу парда кейинчалик йиртилиб, барглarda тешиклар пайдо бўлади. Айрим ҳолларда трипс сўрган жойдан барглар куриб колади. Пучгул трипси шикастлаган баргнинг учи осонгина узилиб кетади. Пучгул трипсининг ургочиси ўз тухумини бошокдан кобикларига ҳамда ғалласимон ўсимликларнинг бошок бандига ва бошокчалар орасидаги бандга тўп-тўп килиб кўяди. Тухумини кўйиш мuddати анча узоққа чўзилади, хатто 15-20 кун давом этиши мумкин. (Дядечко, Атаев; 1965).

Тухум кўювчи *Thripidae* трипсларнинг асосий вакиллари ичида қуидагиларни кўриш мумкин: Тамаки трипси (*Thrips tabaci* L) жуда кенг тарқалган зараркунанда бўлиб, гўзага, пиёзга, тамакига, помидорга, картошкага, карамга ва бошқа кўплаб ўсимлик турларига зарар етказади (Бурланов 1965, Тонекай 1962-1965).

Тамаки трипси ургочисининг узунлиги 0,8-0,9 мм, эркагиники 0,7-0,75 мм га боради. Тамаки трипсининг танаси оч сарик рангда бўлади. Чўзинчоқ ургочисининг охирги бўгинида узун, йирик 0,17-0,18 мм узунликдаги тишли тухум қўйичи бор. Трипснинг мўйловлари 7 бўғимли, боши кўндаланг бўйи энидан калта, олдинги кўкраги бўйига қараганда деярли 1,4 марта камрок, қанотлари ҳошияли, четларида узун киприксимон узун туклари бор. Устки қанотларида узунасига кетган олдинги томирининг уч қисмида тўртта кил бор (Яхонтов, 1950). Личинкасининг ранги имагога қараганда очроқ сарғиш рангда, қанотсиз бўлиб, ургочиларнинг тухум қўйичи бўлмайди. Кўзлари 3-4 катакли мўйлови 6 бўғимли бўлади. (Яхонтов 1950, Павлов 1950).

Тухуми ловия шаклида, оқимтири, узунли 0,21-0,25 мм бўлади. Тамаки трипси вояга етган ҳолда тупроқнинг юза қатламида ҳар хил ўсимликлар қолдиклари орасида ва бегона ўтлар орасида қишлоғ чиқади. Тамаки трипси эрта кўкламда ҳаво ҳарорати 10⁰С дан ошганда қишлоғдан чиқиб бегона ўтлар билан озиқланади. Улар кейинчалик қишлоқ хўжалик экинлари ва гўзага айниқса кеч экилган экинларга учеб ўтиб зарар етказади. Трипсларнинг ургочилари эркагидан кўпроқ бўлиб барг тўқимасини, айниқса ўсимликнинг ёш баргларини хуш кўради ва уларга кўплаб тухум кўяди. (Яхонтов, 1953). Мутахассислар тамаки трипсини фойдали ҳашарот-канахўр трипсдан фарқ қилишлари керак. Улар аввало, ранги жиҳатдан тафовут қиласи, яъни тамаки трипси оч-сарғиш, йиртқич канахўр эса қора кўндаланг оч тус йўллик. Жуда серҳаракат бўлади: у тамаки трипсига қараганда анча кеч муддатларда ўргимчак кана яшайдиган муҳитда пайдо бўлади

(Алимухамедов, Адашкевич, 1990).

Битта ургочи трипс ҳаёти давомида 100 тагача тухум кўяди (Мигулин, 1976). Катта ёшдаги вояга етган трипс жуда серҳаракатчан бўлиб, ҳамма вақт бир ўсимликдан иккинчи ўсимликка бир даладан иккинчи далага учеб ўтади. Трипслар ҳаво ҳарорати курук ва иссиқ вақтда айниқса туш пайтида серҳаракатчан бўлади. Ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлса, трипс ўсимликда ҳаммаси бўлиб бирнече соат туради. Ургочи трипс бир неча ўсимликка тухум кўяди. Ёз вақтида катта ёшдаги вояга етган трипс 10-25 кунгача яшайди. Тухумини барг томирлари атрофига биттадан қўйгандан сўнг улардан 4-5 кун ўтиб личинкалар чиқади. Чиқкан личинкалар вояга етган трипсларга қараганда кам ҳаракатчан бўлиб, улар факат барг доирасида юради, лекин баъзан янги баргларга ва хатто ёнидаги ўсимликларга ҳам ўтади (Кимсанбаев ва бошқ., 2002). Личинкалар асосан барнинг орқа томонида 8-10 кун озиқланаб шу давр ичида 4 марта пўст ташлайди. Шундан сўнг улар тупроқни 10-15 см чукурлигига тушиб 4-5 кун ўтгандан сўнг қанотли трипслар пайдо бўлиб, тупроқ юзасига чиқиб, ғўза ва бошқа экинларга жойлашади. Вояга етган трипслар асосан барг томирлари бўйлаб озиқланади. Трипсларнинг ривожланиш жараённида тухумдан имагога айланиш муддати ёз ойларида 20 кундан ошмайди. Бизнингшароитимиздатамакитрипси 1 йилда 7-8 та авлодберади. Иссиқхоналарда 1 мавсумда 6-8 тагачаавлодберади. Ургочиси 25-30 кун яшаб шу вактмобайнида ўсимлик тўқималарига 100 тагачатухум кўяди (Алимухамедов, Ходжаев, 1991; Рашидов, Ибрагимов, Тошев, 2005).

Иссиқхона трипси (*Hebiotrips haemorrhoidales* Behe). Катта ёшдаги трипс тўқ жигарранг, тўрсимон, корин қисми, оёғи ва мўйловлари сарик рангда, мўйлови 8 бўғимли бўлиб, улардан 2 бўлинган бўғими косачасимон, 3-6 бўғимларида 1 тадан ўсимтаси бор, қанотлари сарик-кора рангда битта икки баробар қалинлашган томири ва ҳошиялари бор, танасининг узунлиги 1,2-1,4 мм га teng. Личинкалари сарғичроқ, мўйловлари кулранг, корин қисмининг охиридаги сегменти тўрсимон. Иссиқхона трипси одатда партеногинетик йўл билан кўпаяди. Ургочилари тухумини тухум қўйичи билан ўсимлик тўқимасига кўяди.

Тухумни эмбрионал ривожланиши 5-8 кун бўлиб, шундан кейин тухумдан личинка чиқади. Личинка худди вояга етган трипсдек ўсимлик кутикуласини тешиб, ширасини сўриб озиқланади. Личинка 14-16 кун ривожлангандан сўнг тупроқда, ўсимлик қолдикларида, тўқилган барглар остига кириб нимфага айланади. Шундан 6-8 кун ўтгандан сўнг катта ёшдаги вояга етган трипс учеб чиқади. Иссиқхона шароитида йил давомида кўпайиб тўхтовсиз кўплаб авлод беради. (Яхонтов 1968).

Тамаки трипснинг ғўза шоналангандан кейинги

зарари камайиб боради, лекин кураш чораси олиб борилмаса улар август ойигача ғўза баргларига зарар етказиб туриши мумкин. Тамаки трипси билан зааралган гўзаларда зааралмаган гўзаларга қараганда камида битта кўсак кам бўлади. Умуман ҳар гектар майдондан 5 ц гача хосил нобуд бўлади ёки трипс пахта хосилини 10-15% гача камайтириб юборади. Заарланиш окибатида пахта хосилидан тола чиқиши, унинг сифати чигитларнинг оғирлиги камайиб, униб чиқиши қобилияти сусаяди.

Биз табиатда триплар туркумининг энг кўп таркалган турларини ўргандик халос. Ушбу турлар сонининг ўзгарувчанлиги қайсиdir даражада популяциянинг яшовчанлигини белгиловчи ирсий

хусусиятларнинг ўзгаришига ҳам боғлиқдир. Трипс популяциясининг зичлигини белгиловчи ташки ва ички омилларнинг барча комплексини назарда тутиш лозим. Ҳозирги вактгача популяция зичлиги динамикаси учун кўплаб математик моделлар таклиф қилинганига қарамай, уларнинг ҳеч бири қониқарли, деб топилмаган. Шунинг учун турлараро тенглик жараёнини ўрганишда умумий тенглик унинг асосий қисми бўлган популяцияга боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, табиий шароитда алоҳида тур популяция табиий бошқарув механизми муҳим ахамиятга эга. Табиий популяция маълум табиий ариалдаги эркин тур зотли популяция билан ўзаро яшashi ҳам мумкин.

ТошибДАУ

Қабул қилинган вақти
16 май 2019 йил

Адабиётлар

1. Кимсанбоев Х.Х., Нурмухамедов Д.Н., Улмасбаева Р.Ш., Рашидов М.И., Сулайманов Б.А., Юсупов А.Х. Трихограммани урчиши, сақлаш ва кўллаш – Тошкент: Укитувчи, 1999. – 12-69 б.
2. Кимсанбоев Х.Х., Сулаймонов Б.А., Рашидов М.И., Болтаев Б.С. Фўза зааралкунандаларига карши биолабораторияларда ҳашаротларни кўпайтириш ва кўллаш асослари. Тошкент: Талқин.- 2007. -Б. 3.
3. David Smith W. Nutrient management. Flue – Cured Tobacco information /North Carolina Cooperative Extension Service, 2003, pp. 47-68.
4. David C. Jones. Insects on Tobacco. Georgia Tobacco grower's Guide, 2003, pp. 117-121.
5. Hasanov B.O “Cotton pests and control measures” Tashkent 2001. 36 p.
6. Alimuhammedov S. N., Xojaev Sh.T. “Cotton pests and control measures” <<Mehnat>>. Tashkent, 1991. 198 p.
7. Шамутдинов Ш.Ш. Гранулированные инсектициды для борьбы с вредителями хлопчатника. Ташкент. 1991 г. 127 с.
8. Blackman R.L. Ahpids – Aphidinae-Handbook for the Identification of British Insects, 2010. 2(7): 413 pp.

И.Р. Саидов

Развитие популяции, экология, фауна представителей семейства Трипсов (Pleothripidae)

В мире насчитывается около 1500 вредителей сельскохозяйственных культур и человечество каждый год тратит много денег и рабочего труда. Углубленное изучение этих вредителей, научное представление и контроль количества этих вредителей не легкая работа. По этой проблеме в мире ведут исследования многие ученые.

I.R.Saidov

Population development, ecology, fauna of the representatives of the Trips family (Pleothripidae)

There are about 1500 pests of agricultural crops in the world and mankind spends a lot of money and labor for management of agricultural crop pests every year. Indepth study of these pests, scientific approach and management of the number of these pests is not an easy job. Consequently, many scientists are conducting research on this problem in the world.

ЭНТОМОПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ ЮҚОРИ ВИРУЛЕНТЛИККА ЭГА ШТАММЛАРИНИ ТАНЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Ушбу мақолада *B. bassiana* энтомопатоген замбуруғининг морфологик-культурали белгилари, физиологик ва биокимёвий хусусиятлари ҳамда мазкур замбуруғининг юқори вирулентликка эга штаммларини ажратиб олиш ва танлаш усууллари түғрисидаги тажриба натижасидаги маълумотлар келтирилган.

Тажрибаларимиз натижасида *B. bassiana* замбуруғини агарли Сабура озиқа муҳитда ўстирилган штаммлари ҳосил қилган колонияларини ривожланишига қараб тўртта типга бўлинди ҳамда уларнинг вирулентлиги ўрганилди.

Калит сўзлар: *энтомопатоген, замбуруғ, B. bassiana, вирулентлик, штамм, колония, патогенлик, сабура, конидия, биопрепарат.*

КИРИШ

Замбуруғларнинг патогенлик хусусияти ҳашаротларда касаллик кўзгатишнинг муҳим омилларидан ҳисобланниб, улар зааркунандаларнинг ҳимоя функциясини бузган холда ҳашаротларнинг танасига кириб, бутун организми бўйлаб тарқалишига имкон беради. Патогенликнинг сифат кўрсаттичи бу уларни вирулентлиги ҳисобланади. Унинг намоён бўлиши касаллик билан зарарланган ҳашаротларни нобуд бўлишининг фоиздаги ифодасида кузатилади. Айниқса микоинсектицид препарат яратиш учун замбуруғ штаммларини танлаб олишда асосий эътиборни уларнинг вирулентлик хусусиятларини намоён қилишига каратилади [1].

Энтомопатоген замбуруғларнинг вирулентлиги кўп омилли белгилари бўлиб, улар ҳозиргача таъсири этиш механизми охиргача ўрганилмаган генлар томонидан бошқарилади. Патогенни маълум доирадаги ҳашаротларга нисбатан ихтисослашуви, уларни маҳсус озиқа манбаларига мосланишига боғлик деб ҳисобланади. Замбуруғларнинг вирулентлиги штаммлар ўртасидаги ўзаро фарқдан келиб чиқади [1;2;3].

Энтомопатоген замбуруғларни саклаш даврида одатда уларнинг вирулентлик хусусиятлари пасаяди. Шу сабабли биопрепаратлар тайёрлашда уларнинг бу хусусиятлари доимо ўрганиб борилади ва селекция усулида штаммлар танлаб олинади. Бу усууллар орасида энг осони энтомопатоген замбуруғларни лаборатория шароитида соф культураларини ўстириш вақтида уларнинг морфологик-культурали белгилари ва физиолого-биокимёвий хусусиятларини ўрганиш ҳисобланади [4;6].

ТАДҚИҚОТНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИ.

Замбуруғ турларининг соф культурасини ажратиб олиш. Замбуруғ турларини аниқлаш учун аввал уларнинг соф культураси ажратиб олинди. Бунинг учун, сұйний озиқа муҳитлари: агарли пиво сусло, агарли Сабура ва бoshқа муҳитлар тайёрланди: [5]. Тайёр муҳитлар пробиркаларга кўйиб

стерилланди ва уларга ўсиб чиққан замбуруғ колониялари спирт лампаси алансаси олдида пробиркаларга ўтказиб, саклашга кўйилди.

Энтомопатоген замбуруғларнинг вирулентлигини ва патогенезини аниқлашда патологияда кўлланиладиган усууллардан фойдаландик. Шунингдек, микроорганизмларнинг физиологик ва биокимёвий анализ усуулларидан фойдаландик.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

B.bassiana замбуруғининг морфологик-культурали белгилари иссиқхонадаги нобуд бўлган намуналаридан ажратилган соф культураларнинг штаммларида ўрганилганда улар агарли пиво сусло озиқа муҳитида ҳосил қилган колонияларининг кўриниши силлиқ, субстратдан бироз кўтарилган, юмалок, оқ ёки қаймок рангда. Аммо айрим штаммларининг колониялари радиал бурмали кўринищда ёки сирти нотекис бўлиши кузатилди. Агарли пиво суслосида барча штаммларнинг колонияларини орқа томонини сарғиши туслаги кириши кайд этилди.

B. bassiana замбуруғини агарли Сабура озиқа муҳитда ўстирилган штаммлари ҳосил қилган колонияларини ривожланишига қараб уларни тўртта типга бўлинди. Биринчи гурух штаммларининг асосий қисми озиқа муҳитида зич мицелидан иборат тақир-бахмалсимон, сиртидаги ғубор унсимон кўринищдаги колонияларни ҳосил қилди. Мазкур колониялар радиал бурмали, буришган кўринишига эга бўлди. Уларнинг ўзига хос хусусиятлари зич мицелиларни ҳосил қилиши ва экиш вақтида мицелиларни озиқа муҳитидан осон ажралиши билан фарқланаб турди.

Кейинги иккинчи гурухга мансуб штаммларнинг субстратдан кўтарилган мицелилари пахтага ўхшаш момиксизмон кўринишига эга, субстратга яқин мицелилари эса зич холатда бўлиши кузатилди. Колонияларини сирти буришган, нотекис тузилишига эга. Мицелилари жуда пишиқ парда ҳосил қилган. Шу сабабли уларни экиш пайтида колониялардан бир

бўлагини ажратиб олиш жуда қийин бўлса, ёш культураларнинг колониялари бир бутун холда агарли озиқадан ажралиб чиқиши қайд этилди.

Учинчи гурухга мансублари ҳосил қилган колонияларининг сирти теккис, баҳмалсимон бўлиб, унсимон ғубор билан қопланган. Бу гурух учун хос бўлган белгилари, улар қайта экилганда мицелилари бир-биридан ва конидийлардан осонгина узилди.

Тўртинчи гурух штаммларини колонияси пахтасимон-тўрга ўхшаш мицелиларни ҳосил қилиши, субстратдаги мицелиларини жуда зич бўлиши ва уларни қайта экилганда колонияларидан мицелий бўлакларини осон узилиши билан ажралиб турди.

Кузатишлар давомида қайта экилган штаммларни морфологик жихатидан фаркландиган колонияларни ҳосил қилиши аниқланди. Биринчи гурух штаммларининг кўпчилиги дастлабки штаммлар каби (80-90%) сирти такир-баҳмалсимон, буришган колонияларни ҳосил қилди. Иккинчи ва учинчи гурух штаммлари қайта экилганда эса дастлабки штамм ҳосил қилган кўринишдаги колонияларни ҳосил қилди. Тўртинчи гурух штаммлари қайта экилганда улардан ҳосил бўлган колониялар пахтасимон – тўрли ва такир-баҳмалсимон кўринишга эга бўлган колонияларга ажралиб кетди.

Учинчи гурух штаммларининг колонияларини орқа томони оч-сариқ тусга эга бўлса, колган 1,2,4 гурухга мансуб штаммларники тўқ сариқ рангли бўлиши қайд этилди.

Кузатишлар давомида штаммлар ҳосил қилган колониялар икки хил бўлиши, биринчиси теккис баҳмалсимон бўлиб, унсимон ғубор билан қопланган (3-гурух), иккинчиси эса такир-баҳмалсимон кўринишдагидан бошлаб, пахтасимон-тўрли кўринишга эга (1,2,4 гурухлар) бўлиши аниқланди.

B. *bassiana* замбуруғларининг штаммлари ҳосил қилган субстрат сиртидаги ва ичидаги мицелилар бир-бири билан туташшиб кетган зич холдаги гифлардан иборат бўлиб, кейинчалик бундай гифларда кўндаланг чизиклар ҳосил бўлди. Бу гифларнинг диаметри 2,2-3,4 мкм бўлиб, уларнинг ўлчами озиқа муҳити таркибига қараб ўзгариб турди. Штаммлар экилгандан сўнг икки сутка ўтгач гифларда конидиянлар юзага келди. Уларнинг шоҳланиши нотўғри дихотамик бўлиб, бундай

гифларнинг бўғимларида 2 ёки 3 санчиқли, ўлчами 9,9-14,0 мкм бўлган конидиянларни сақлаган фиалидалар ҳосил бўлди. Бу конидиянларда ости йўғон, учки қисми ингичкашган стеригмалар юзага келди. Стеригмалар учда эса ўлчами 1,6-3,4x1,2-3,7 мкм бўлган бир хужайрали, рангиз, шарсимон ёки чўзиқ конидиялар ҳосил бўлди.

Бу замбуруғ турини пиво сусло озиқа муҳитида ўстирилганда, озиқа муҳити силкитилмагандан, унинг сиртида замбуруғ мицелиларидан иборат парда юзага келди.

Агар замбуруғ экилган озиқа муҳити качалкаларга кўйиб, силкитиб ўстирилса, у холда ўлчами 2,1-7,7x1,1-1,3 мкм бўлган бластоспоралар ҳосил бўлиши қайд этилди.

B. *bassiana* замбуруғининг штаммлари ўртасидаги фаркларни ўрганиш давомида моноспорали культурапарни агарли сусло озиқа муҳитида ўстирилганда 7 суткадан сўнг пахтасимон ва унсимон кўринишдаги колониялар гурухини ҳосил қилди. Пахтасимон кўринишдаги колонияларнинг ўлчами 2,1-3,3 см бўлиши, унсимон кўринишдаги колонияларнинг ўлчами эса 3,3-4,5 см бўлиши кузатилди.

Пахтасимон кўринишдаги колониялар сиртини буришиш холати у қадар кўзга ташланмаган бўлса, бу холат унсимон кўринишдаги колонияларда яққол кўзга ташланди. Колонияларининг орқа томонидаги ранги биринчи гурухда кўнғир тусга эга бўлса, иккинчи гурухдагиларда сариқ рангли бўлиши қайд этилди.

ХУЛОСА

Амалга оширилган тажрибалар натижасида B. *bassiana* замбуруғининг штаммларини морфологик-культурал белгилари ўрганилганда, улар гетероген хусусиятга эга эканлиги аниқланди. Энтомопатоген замбуруғларни фенотипик жихатидан гетероген бўлиши уларни катта селекцион потенциалга эга эканлигини кўрсатади. Бу эса улар орасидан юкори вирулентликка эга бўлган штаммларни ажратиб олишда ва улардан зааркунанда ҳашаротларга қарши кўлланиладиган, атроф муҳитга салбий таъсири йўқ самарали биопрепаратлар яратища бошланғич материал сифатида фойдаланиш учун катта имконият беради деган хулосани чиқаришга асос бўлади.

ТошибДАУ

ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази

Қабул қилинган вақти

20 апрель 2019 йил

Адабиётлар

- Геитовт Н.Ю. Энтомопагенные грибы (биотехнологические аспекты). – Алматы: 2002. – 288с.
- Геитовт Н.Ю., Сулейменова Ж.Б. Факторы вирулентности энтомопатогенных грибов Beauveria *bassiana* (Bals.) Vuil. и *Verticillium lecanii* Zimm. //Den. В Каз. Гос. ИНТИ. –№6948 – Ка 96. – 18 с. – 1996. – В.3. – С. 38-39.

3. Иесси И., Воронина Э.Г. Пути использования облигатных паразитов – энтомофторовых грибов и микроспоридий – в интегрированной защите растений/Биоценотическое обоснование критериев эффективности природных энтомофагов. – Л.: 1983. – С. 17-31.
4. Кирсанова В.А. Физиологическая изменчивость энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana (Bals) Vuill., индуцированная физическими и химическими мутагенами // Микология и фитопатология. - 1968.-Т. 2. №3. - С. 183 - 193.
5. Поликсенова, В.Д. Методы экспериментального изучения микроскопических грибов / В.Д. Поликсенова, А.К. Храмцов, С.Г. Пискун // Методические указания. – Минск: БГУ, 2004.–36 с.
6. Havukkala I. Induction and purification of Beauveria bassiana chitinolytic enzymes / Havukkala, I., Mitamura, C, Hara, S., Hirayae, K., Nishizawa, Y, and Hibi, T. // J. Invertebr. Pathol. 1993. - V. 61. - P. 97-102.

Аблазова М. М., Зупарова Д. М.

Патогенные и вирулентные особенности энтомопатогенных грибов

В данной статье приводятся сведения о морфоло-культуральных, физиологических, биохимических и вирулентных свойствах энтомопатогенного гриба *B.bassiana* а также о методах, определении, выделения и изучения выше указанных свойств гриба.

На основании полученных данных авторами было установлено, что гриб *B.bassiana* при выращивании на агаризованной среде Сабура образует четыре типа колоний различающиеся между собой по вирулентным свойствам.

Abzalova M.M., Zuparova D.M.

Pathogenic and virulent features of entomopathogenic fungi

This article provides information about the morphological and cultural physiological, biochemical and virulent properties of the entomopathogenic fungus *B.bassiana*, and also about the methods for determining, isolating and studying the above referred properties of fungus.

Based on the data obtained by the authors, it was found that the fungus, when grown on Aloe agarosed sphere, forms four types of colonies differing in their virulence properties.

УДК: 632.934

У.Х.РАХИМОВ, У.К.ХАМИРАЕВ

**АСС-ФОРТЕ 80% с.п. ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА И РИЗОКТОНИОЗА
КАРТОФЕЛЯ**

В статье отмечается, что в Ташкентской области наблюдается широкая распространенность заболеваний фитофтороза и ризоктониоза картофеля, в следствии чего рост и развитие картофеля ниже, чем у здоровых, также снижение урожайности. Также обработка перед посевом семенных клубней картофеля против этих болезней препаратами Ass-Forte составляет 80% с.п. (Тирам 800 г/т) - 2,5 кг/т и Витавакс 75% с.п. -при дозе 2,5 кг/т биологическая эффективность составила от 91,0% до 96,0%.

Ключевые слова: картофель, питания, препарат, клубни, биологическая.

ВВЕДЕНИЕ

Картофель по объему производства занимают второе место в мире после зерновых культур.

В Узбекистане среди овощных культур по объему производства картофель занимают первой место.

Картофель – один из основных продуктов питания, второй хлеб, сырье для промышленности. Он обладает высокими вкусовыми свойствами, содержит необходимые для человека минеральные соли, витамины и другие биологически активные вещества. Уровень его потребления составляет 120 кг на человека в год.

Получения высоких и стабильных урожаев картофеля ограничивается рядом определенных абиотических и биотических факторов среды, в частности, развитием комплекса вредоносных заболеваний, суммарные потери клубней от поражения которыми в отдельные годы достигают 35%.

Картофель относится к числу культур, в сильной степени поражаемых болезнями, которые нередко являются причиной резкого снижения урожая. Болезни поражают картофель, как во время вегетации, так и в период хранения. Возбудителями болезней картофеля являются грибы, бактерии,

вирусы и микоплазменные организмы. Значительный ущерб экономике многих картофелеводческих стран мира наносят такие распространенные болезни как фитофтороза, альтернариоза, ризоктониоз, обыкновенная парша, вызываемых микроскопическими грибами, актиномицетами и другими [4].

Недобор урожая от поражения фитофторозом, сухой пятнистостью, ризоктониозом, бактериозом и другими болезнями составляет в среднем 30% от валового сбора. Отход клубней из-за гнилей в период хранения увеличивается на 5-20% и более [2].

Посадочный материал, пораженный патогеном в слабой степени и высаженный в почву, становится причиной значительного выпада растений и сокращения урожая картофеля [3].

Фитофтороз картофеля являются самим опасным заболеванием. Воздушный фитофтороз – гриб *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary. Фитофтора из Южной Америки с больными клубнями была завезена в Европу.

В Узбекистане фитофтороз картофеля был отмечен в конце прошлого века.

Исследователями воздушителя корневой гнили установлено, что основными воздушителями болезни являются грибы *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Pythium* и другие в комплексе.

Сейчас фитофтороз и ризоктониоз не наносит такого значительного ущерба, но и на сегодняшний день является самым распространенным и опасным заболеванием картофеля. У основных возделываемых сортов в настоящее время сильно поражаются клубни, из-за чего теряется 20-30% урожая [1].

В связи с чем, была поставлена задача использования новых фунгицидов в борьбе с болезнями картофеля в условиях Узбекистана.

Целью поставленной перед нами задачи было провести испытание нового препарата Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг) против фитофтороза и ризоктониоза на картофеля с нормой расхода 2,5 кг/т.

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Исследование проводили на поле ООО «Мехнат», Ташкентского района, Ташкентской области против фитофтороза и ризактониоза на картофеля.

Обработки клубни картофеля проведены 24 февраля 2018 года. Обследование всходов на культуре картофеля на пораженность фитофторозом и ризактониозом проводились в период развития второй пары листьев и массового цветения. На обследуемом участке брали 10 проб по диагонали поля.

Схема опыта:

1. Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг) – 2,5 кг/т
2. Витавакс 75% с.п. (Эталон) - 2,5 кг/т
3. Контроль – без обработки

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$\text{БЭФ} = \frac{a - b}{a} * 100;$$

Где: БЭФ – биологическая эффективность, а - развитие болезни в контроле, б - развитие болезни в опыте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Препарат Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг) был применён в борьбе с фитофторозом и ризоктониозом картофеля.

Проведенные учеты на поражаемость фитофторозом картофеля показывают, что в контроле поражаемость составляла 45,7%, при развитии болезни 7,8%.

Наилучший результат показал препарат Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг) в норме 2,5 кг/т, где биологическая эффективность составила 92,3%, при поражаемость растений 2,5%, развитии болезни 0,6% (таблица 1).

Проведенные учеты на поражаемость ризоктониозом картофеля показывают, что в контроле поражаемость составляла 31,9%, при развитии болезни 7,6%.

Таблица - 1

**Биологическая эффективность фунгицида Асс-Форте 80% с.п.
(Тирам 800 гр/кг) против болезни фитофтороза и ризоктионоза картофеля
(Производственный опыт, Ташкентская область, Ташкентский район, ООО «Мехнат», 2018 г)**

№	Варианты опыта	Норма расхода, кг/т	Поражаемость растений, %		Развитие болезни растений, %		Биологическая эффективность, %	
			фитофтороз	rizoktonoz	фитофтороз	rizoktonoz	фитофтороз	rizoktonoz
1	Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг)	2,5	2,5	1,1	0,6	0,4	92,3	94,7
2	Витавакс 75% с.п (Эталон)	2,5	2,1	0,9	0,7	0,3	91,0	96,0
3	Контроль – без обработки	–	45,7	31,9	7,8	7,6	–	–

Наилучший результат показал препарат Асс-Форте 80% с.п. в норме 2,5 кг/т, где биологическая эффективность составила 94,7%, при поражаемость растений 1,1%, развитии болезни 0,4%.

В опытных вариантах наблюдалось интенсивный рост и развитие по сравнению с контролем.

Биологическая эффективность эталонного препарата Витавакс 75% с.п в норме расхода 2,5 кг/т для фитофтороза составила 91,0%, при поражаемость растений 2,1%, развитии болезни 0,7%. Препарата Витавакс 75% с.п в норме расхода 2,5 кг/т для ризоктониоза составила 96,0%, при поражаемость

растений 0,9% и развитии болезни 0,3%.

ВЫВОДЫ

Биологическая эффективность препарата Асс-Форте 80% с.п. при обработки клубни картофеля в норме расхода 2,5 кг/т, в борьбе с фитофторозом картофеля составила 92,3%, в борьбе с ризоктониозом биологическая эффективность составила 94,7%. Препарат Асс-Форте 80% с.п. показал высокую эффективность при обработки клубни картофеля в норме расхода 2,5 кг/т. Препарат не фитотоксичен, препаративная форма удобна для применения.

ТашГАУ

Поступила
22 апреля 2019 года

Литературы

1. Журомский Г.К. Расовый состав *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary –возбудителя фитофтороза картофеля в условиях Беларусии. // Ахова раслін. Минск. – 1999. №5. –С. 30–31.
2. Супрун В.И. Усовершенствование методов прогнозирования развития фитофтороза картофеля с учетом особенностей сортов и применяемых фунгицидов. Автореф. канд. дис. –М.: 1986. –16 с.
3. Тютерев С.Л., Ткаченко М.П. Рациональное использование современных фунгицидов. // Защита и карантин растений. Москва. –2000. –№9. –С. 28-30.
4. Шестеперов А.А. Вопросы защиты картофеля от вредных организмов в хозяйствах разного типа. // Главный агроном. Москва. –2005. –№9. –С.54-57.

У.Х.Рахимов, У.К.Хамираев

Асс-Форте, 80% с.п. фунгицидини картошканинг фитофтороз ва ризоктониозига таъсири

Мақолада Тошкент вилояти шароитида картошканинг фитофтороз ва ризоктониоз касалликлари кенг тарқалганлиги, касалликлар билан заарланган картошканинг ўсиш ва ривожланиши соғломига нисбатан анча паст бўлиб, хосилдорлиги кескин камайиши хақида маълумотлар берилган. Шунингдек картошканинг ушбу касалликларига қарши уруғлик туганакларни экишдан олдин Асс-Форте 80% с.п. (Тирам 800 гр/кг) – 2,5 кг/т ва Витавакс 75% с.п. - 2,5 кг/т миқдорида уруғ дорилагичлар билан ишлов беруб экилиши натижасида биологик самарадорлик 91,0% дан 96,0 % гачани ташкил этди.

U.KH. Rakhimov, U.K. Khamiraev

Ass-forte 80% sec. against phytoftuorosis and potato rizoktonioza

In the Tashkent region, phytophthora and rysotonia of potatoes are widespread, and the growth and development of potatoes infected with the disease is lower than that of healthy ones, as a result of which their productivity decreases sharply. When processing seed tubers of potatoes before sowing with drugs Ass-Forte 80% sec. (Thiram 800 g / kg) - 2.5 kg / t and Vitavaks 75% p. - 2.5 kg / t, their biological efficiency will be from 91,03% to 96,0%.

УЎК:632.25:632.4.01/08

**Ш.М.САЛОМОВ, М.А.ЗУПАРОВ, М.С.МАМИЕВ, А.А.ХАКИМОВ, Ф.У.ҚУЧҚОРОВ,
У.Н.РАХМОНОВ, М.М.АБЛАЗОВА**

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ИССИҚХОНАЛАРИДА *BOTRYTIS* ТУРКУМИ ЗАМБУРУГЛАРИНИ ТАРҶАЛИШИ

Тошкент вилояти шароитида помидор ўсимлигига *Botrytis* туркумининг турлари қўзғатадиган касалликларни тарҷалиши ва зарарини аниқлаш ҳамда касаллик қўзғатувчиларининг биологик хусусиятларини ўрганиш бўйича олиб борилган тажриба натижалари баён этилган.

Таянч сўзлар: помидор, замбурург, тур, қўзғатувчи, биология, экология, физиология, *Botrytis cinerea*, *Botrytis sp1*, *Botrytis sp2*, туркум, зарарланган, нав, касаллик, новда, тўқима, ҳужайра, паразит, конидия.

КИРИШ

Дунё бўйича касаллик ва зараркунандарлар таъсирида қишлоқ хўжалик экинларининг ФАО маълумотларига кўра, йилига ўртача 30% ҳосил йўқотилар экан. Ўсимликларни турли касалликлардан химоя қилишда, касалликка тўғри ташхис қўйиш ва унинг қўзғатувчисини соф ҳолда ажратиб, биологик хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўсимликларни факат ҳосилига эмас, балки унинг сифатига ҳам таъсир қилувчи зарарли организмлардан бири *Botrytis* туркумига мансуб замбуруғлар хисобланади. Бу замбурург турлари кўпгина қишлоқ хўжалик экинларида касаллик қўзғатиши тўғрисида бир қатор манбаларда келтирилган (N.Korolev, M.Mamiev, T.Zahavi, and Y.Elad, 2011).

Помидор ўсимлиги ҳам бошқа қишлоқ хўжалик экинлари сингари бу замбурург тури билан зарарланади. *Botrytis* туркуми замбуруғларини ўрганиш бўйича бир қатор илмий ишлар бажарилган. Мазкур тадқиқотларда касалликнинг зарари, касалликнинг ташхиси ва уларнинг тарқалиш қонуниятлари ҳамда касаллик қўзғатувчи замбуруғларнинг биологик, экологик ва физиологик хусусиятлари берилган. Лекин Республика шароитида эса бу туркум замбуруғларини ўрганишгатегишли маълумотлар кам учрайди.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси шароитида *Botrytis* туркуми замбуруғларини ўрганиш бўйича амалга оширилган тадқиқот натижаларига тегишли маълумотлар деярли йўқ. Шу сабабли помидор ўсимлигига *Botrytis* туркуми замбуруғларини тарқалишини ўрганиш учун Тошкент вилоятининг

Қибрай ва Ўрта Чирчик туманларидағи помидор билан банд бўлган иссиқхоналарда илмий-тадқиқот ишлари ўтказилди.

Тадқиқотларни олиб боришида микробиология, микология ва фитопатологияда қабул қилинган усуллардан, яъни касалликларни тарқалиши (Дементьев, 1985; Чумаков, Захарова, 1990), касал ўсимликлардан гербарий тайёрлаш (Боровицкий, Гордеева, Круберг, Матисен, Сказкин, 1955), замбурург турларининг морфологик хусусиятларини ўрганишда (Коваль, Горбек, 1982), касал ўсимликларнинг тўқималаридан замбурург турларини ажратиб олиш (Билай, 1977), замбурург турларининг соф культурасини олиш (Хохряков, 1969) усулларидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Иссиқхона шароитида *Botrytis* туркуми вакиллари помидор ўсимлигига асосан кулранг чириш касаллигини қўзғатади. Касалликни бу белгилари ўсимликтин асосан фунчалари, гуллари, меваларида, кам ҳолларда барги ва новдаларида кузатилди. Касаллик кўпроқ помидорнинг генератив аъзоларида учраши бу паразит замбуруғни табиатда янгидан тикланиб, атрофга тарқалашига яхши имконият беради (A.Garibaldi, L.Gullino, & G.Minuto, 1997).

Помидор ўсимлигининг аъзоларидан ажратилган *Botrytis* туркуми вакилларидан *Botrytiscinerea*, *Botrytis* sp1 ва *Botrytis* sp2 турлари қайд этилди (1-расм). Лекин асосан *Botrytiscinerea* тури кўпроқ учради, колган иккита тур замбуруғи факат бир марта Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчик туманидаги «Fresh Rose» МЧЖ хўжалигига кузатилди. Қайд этилган *Botrytiscinerea* тури зарарланган помидор ўсимлигига факат конидиялар ҳосил қилган ҳолда учради.



1-расм. Ажратилган замбурург штаммлари

Мазкур турнинг «Fresh Rose» МЧЖ чидамсиз бўлган помидор нави экилганилигига деб хисобланиши мумкин (2-расм).



2-расм. Касалликни иссиқхонада тарқалиши

Касаллик билан кўпроқ гулларнинг заарланиши (10-25%), ундан сўнг эса меваларининг заарланиши (3-10%) кузатилди. Помидорнинг новдалари бошқа аъзоларига қараганда камроқ касалликка чалиниши қайд этилди (3 ва 4 расмлар).



3-расм. Касаллик билан помидор мевасини заарланиши



4-расм. Касаллик билан помидор поясини заарланиши

Botrytis Cinerea замбуругини помидор ўсимлигини генератив аъзоларида кўпроқ учрашига асосий сабаб шундаки, ўсимликнинг бу аъзоларидаги тўқима хужайралари вегетатив аъзоларига қараганда тезроқ қаришида. Маълумки, ўсимликнинг қариган тўқима хужайралари ёш хужайраларига нисбатан касалликка кўпроқ чалинади (Талиева, 1960). Чунки қариган тўқима хужайраларида хосил бўлган ўстирувчи гормонлар – этилен ва абсиз кислоталарида эркин радикаллар мавжуд бўлиб, улар ўсимликнинг касалликка чидамлигини пасайтиради (Elad, 1996; Audenaert et al., 2000).

Помидор ўсимлиги гулидан ажратилган эксадат (суюқлик) *B.cinerea* замбуругини атмосферадаги

ҳолатига таъсир қилиб, ўсимлик тўқимасига кириб борадиган структураларни юзага келишига олиб келади (Tukey, 1970; Hammer, Evensen, 1994).

Шу билан бирга помидорнинг нобуд бўлган генератив аъзоларида гул чанги *B.Cinerea* замбуругини жадал ривожланишига турткি бўлади (Натальина, Светов, 1972; McNicol et al. 1989).

ХУЛОСА

Иссиқхона шароитида помидор ўсимлигига *Botrytis* туркуми вакилларини кўзғатадиган касаллеклари ўрганилганида асосан кулранг чириш касаллиги кузатилди. Кулранг чириш касаллиги помидорнинг барча ер устки аъзоларини заарлаши ва касалликка кўпроқ ўсимликнинг генератив аъзолари чалиниши аникланди.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти
21 май 2019 йил

Адабиётлар

1. Билай В.И. Фузарии. Киев, "Наукова думка". 1977. -С.434.
2. Боровицкий П.И., Гордеева Т.Н., Круберг Ю.К., Матисен В.А., Сказкин Ф.Д. Краткий справочник преподавателя естествознания. –Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1955.- С. 3-162.
3. Дементьева М.И. Фитопатология. –М: Агропромиздат, 1985.-397с.
4. Коваль Э.З., Горбек Л.Т. Микроскопическое изучение грибов // Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова думка, 1982. - С. 76-105.
5. Натальина С.Б., Светов В.Г. К изучению взаимоотношений грибов *Botrytis cinerea* *Aspergillus violáceo fuscus*, вызывающих гниль винограда //Тр. Кубанск. с-х ин-та, 1973, вып. 47 (75). -С. 20-23.
6. Талиева М.Н.О реакции растительной ткани на фитотоксины //Бюлл.ГБС, 1960, Вып. 36. -С. 61-66.
7. Хохряков М.К. Методические указания по экспериментальному изучению фитопатогенных грибов. –Л: 1969. -68с.
8. Чумаков А.Е., Захарова Т.И. Вредоность болезней сельскохозяйственных культур. – М: Агропромиздат, 1990. - 128 с.
9. Audenaert K., Kersschot B., Hofe M. Abcisi cacid determines basal susceptibility of tomato to *Botrytis cinerea* through suppression of salicylic acid-dependent defense mechanisms// XII International Botrytis symposium. Reims. France. 2000. -L.7.
10. Elad Y. Mechanism involved in the biological control of *Botrytis cinerea* incited disease //XI Intern. Botrytis Sympos. 1996. -P. L4-1.
11. Garibaldi, A., Gullino, L., & Minuto, G. Diseases of basil and their management. Plant Disease, 81, 1997. - P.124-132.
12. Korolev, N., Mamiev, M., Zahavi, T. and Elad, Y. Screening of *Botrytis cinerea* isolates from vineyards in Israel for resistance to fungicides. European Journal of Plant Pathology. 129: 2011. -P.591-608.
13. Hammer P.E., Evensen K.B. Difference between rose cultivars in susceptibility to infection by *Botrytis cinerea*. //Phytopathology. 1994. 84. -P.1305-1312
14. McNicol K., Williamson B. Systemic infection of black currant flowers by *Botrytis cinerea* and its possible involvement in premature abscission of fruits //Ann. Appl. Biol. 1989.114.2. -P. 243-254
15. Tukey H. The leaching of substance from plants //Annual Rev. Of Plant Physiology. 1970. 21. -P. 305-324.

**Ш.М.Саломов, М.А.Зупаров, М.С.Мамiev, А.А.Хакимов, Ф.У.Қучқоров,
У.Н.Рахмонов, М.М.Аблазова**

Распространение грибов рода *botrytis* в тепличных хозяйствах Ташкентской области

В статье обсуждаются вопросы распространения и вредоносности возбудителей болезни томатов рода *Botrytis* в условиях Ташкентской области, результаты их изучения, биоэкологические свойства а также меры борьбы с ними.

**Sh.M.Salomov, M.A.Zuparov, M.S.Mamiev, A.A.Khakimov, G.U.Quchqorov,
U.N.Rakhmonov, M.M.Ablazova**

Distribution offungi the genus *botrytis* in the greenhouses of the Tashkent region

Hereby presented the results of research conducted on the determination of the spread and damage of

tomato diseases caused by *Botrytis* group species in the condition of Tashkent region, the study of biological peculiarities of disease agents and their control measures.

УДК:634+732+632.

А.Р.АНАРБОЕВ, Н.Қ. САЙИМОВ, Д.Т.МАМАДЖАНОВА.

ОЛМА ҚОН ШИРАСИ (*ERIOSOMA LANIGERUM HAUSM*) ГА ҚАРШИКУРАШДА ЗАМОНАВИЙ ИНСЕКТИЦИДЛАРНИ САМАРАДОРЛИГИ.

Ушбу мақолада олма қон ширасига карши Actare 20 s.d.g препарати билан 0,3-0,4 кг/га ишлов берилганда самарадорлик 14-чи кунга келиб, 91,2-93,8 % ни ташкил этди. Кузатувларимиздан маълум бўлдики, олма қон шираси билан олманинг Семеренко нави кучли заарланиши аниқланди.

Калит сўзлар: *Олма, нав, қон шира, инсектицид, дараҳт, заараркунанда, ҳосилдорлик, Семеренко, биологик самарадорлик.*

КИРИШ

Мамлакатимиз табиий икклим шароити мевали дараҳтларни ўстириш учун ниҳоятда кулаг ҳисобланади. Шу боисдан олма, нок, беҳи кўчатлари кўплаб экилади. Бироқ боғларни заараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қиласдан туриб юқори ва мўл ҳосил олиб бўлмайди. Масалан, олма қон ширасига қарши кураш олиб борилмаса ҳосилнинг 40 – 50% қисми нобуд бўлиши мумкин. Мевали боғларда 200 дан ортиқ заараркунанда ва 50 дан зиёд касаллик кўзгатувчи замбуруғлар учрайди. [1].

Бу йилги қиши юртимиз учун жуда илиқ келди. Баҳор ойининг бошларида намгарчилик юқори бўлиб заараркунанда ва касалликлар ривожланиши учун кулаг шароит туғилди. Шу жумладан мевали боғларда олма қон шираси билан кучли заарарланган олма, нок ва беҳи каби уруғ мевали дараҳтлар кўплаб кузатилди. Мевали боғларда заараркунандаларнинг олдини олишда муҳим давр ҳисобланган май ойида боғбонларимиз олдида масулиятли вазифалар туради. Бу даврда илмий асосланган башоратга кўра уруғ мевали дараҳтларидан: олма, нок ва беҳига қон шираси жиддий зарар етказади. [2].

Биринчи марта олма қон шираси 1802 йилда Hausmann томонидан *Aphis lanigera* номи билан аталган. 1820 йилда Leach linnean типидаги ширадан *Eriosoma* жинсини ажратиб чиқди ва охири шира *Lanigerum hausm* деб атади. [5; 10 б.]

Eriosoma lanigerum Hausm. Олманинг ашаддий заараркунандаларидан бири. У Ўзбекистоннинг барча худудларида кенг тарқалган.

Олма қон ширасининг қанотсизи тўқ қизил рангда, 2,1-2,6 мм келади. Бундай ширани эзиб юборилса қизил рангли консимон суюқлик чиқади, шунинг учун ҳам ушбу шира бу номга эга бўлган. Ширанинг усти мумсимон оқ момиқ тубор билан

қопланган бўлиб, бу уни аниқ белгилайдиган хусусиятидир. Бундай тубор қанотли зотнинг факат корнининг охирида бўлади. Танаси цилиндр шаклида бўлиб, узунлиги 2,2 мм келади, боши, кўкраги ва оёклари кора, қорни тўқ жигаррангда. Тухуми чўзинчоқ, 0,5 мм бўлиб, дастлаб заргалдок рангда, кейинчалик кўнғир тусга киради. [5]

Олма қон шираси Ўзбекистон шароитида турли ёшдаги личинка ва етук зот шаклларида олма дараҳт-ларининг илдизлари, пўстлоқ ости ва йўғон шохларнинг асосида қишлиайди. Март-апрел ойларида уйғониб, ҳаракат кила бошлайди. Дараҳт танасининг нозик (очик) жойларига ёпишиб, тўда ҳосил қиласди. Бундай жойлар оқ паҳта каби қоплама билан қоплангандай бўлиб туюлади. Олма қон шираси мавсумда 15-17 та бўғин бериб ривожланади. Заарарланган дараҳт ва новдаларда фурралар пайдо бўлиб, новда қийшаяди ва ривожланишдан орқада қолади. олма қон ширасининг личинкалари тўрт марта пўст ташлаб ривожланади. Улар дараҳтга ёпишиб олган жойидан кўчмай, бир жойда вояга етади. Май ойидан бошлаб олма қон шираси колонияларида бошқа жойларга тарқаш учун қанотли зотлар пайдо бўла бошлайди. Лекин бу заараркунанда жойдан-жойга асосан кўчатлар билан тарқайди. Қизил қон ширасининг жуда самарали табиий кушандаси мавжуд. Бу – майда афелинус яйдоқчисидир (*Aphelinus mali* Hald.). Мазкур яйдоқчининг лабораторияларда кўпайтирилиб табиатни бойитишга қаратилган усуслари яратилган ва фойдаси амалий тасдиқланган. [3].

Олма қон шираси олманинг “Бумажной ранет”, “Розмарин” ва “Золотой пармен” навларига кўпроқ зарар етказади, аммо “Дамир олма”, “Абилаури”, “Кандил Синап”, “Кулранг”, “Франсуз ранети” навларига кам зарар етказиши аниқланган [4; 12-13 б].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Юқоридагилардан келиб чиқиб олма қон шираси миқдорини бошқариш мақсадида тадқиқотлар 2019 – йилнинг март ойида Тошкент вилояти Қибрай тумани “Нават Агроплюс” МЧЖ га қарашли олма мева боғида олиб борилди. Олма боғларидаги олма дараҳтларидан 460 та ўрганилганда 390 та дараҳт қон шираси билан ўртача заараллангани аниқланди. 42 таси кучли зааралланган, қолган 28 таси кучсиз заараллангани аниқланди. Зааралланган олма дараҳтининг нави Семеренко бўлиб, 5 йиллик дараҳтлар хисобланади. Қарши кураш мақсадида қон ширасига қарши кимёвий воситага андоза сифатида Вертиmek профи 0,18 к.э препарати 0,3 кг/га меъёрида олинди ва Actare 20 s.d.g. инсектициди 0,3-0,4 кг/га меъёр сарфда кўлланилди.

Давлат метрология қўмитаси томонидан тасдиқланган “Методик кўрсатмалар”(2004) га мувофиқ тажрибалар амалга оширилди, кейинги ҳисоб китоблар ва биологик самарадорлик ҳисоб китоблари Аббот формуласи асосида хисобланди. [6;104 б].

Тажриба мажмуаси учун синаладиган дори, андоза ва назоратдан иборат. Тажрибада синаладиган дори сифатида Actare 20 s.d.g. ва андоза Вертиmek профи 0,18 к.э.инсектицидлари ҳар

3,7,14,21 назоратдан ўтказилди.

Кичик дала тажрибалари учун катталиги 100м² бўлган 4 варианtlар қайтарилишда амалга оширилди.

Олма қон шираси қўйидаги ҳисобланади: ҳар вариант тақрорининг ўртасидан 10 та намуна олинади. Уларнинг ҳар бири дан 1тадан зааралланган ўсимлик текширилади. Назорат дори сепишдан олдин ва ундан кейинги 3, 7, 14 ва 21-кунларда (яъни зааралланнинг сони тақроран кескин кўпая бошлагунча) назорат ўтказилади.

Тошкент вилояти Қибрай тумани “Нават Агроплюс” МЧЖмевали боғларida олма қон ширасига қарши Вертиmek профи 0,18 к.э ва Actare 20 s.d.g. инсектицидлари самарадорлиги қўйидаги ҳисоб китоблари Аббот формуласи асосида хисобланди. Тажрибада Actare 20 s.d.g. препарати билан 0,3 кг/га ишлов берилгандан сўнг, самарадорлик 3- кун 65,4 % ни, 7- кун 77,1 % ни, 14- кун 91,2 % ни ташкил этди. Actare 20 s.d.g. препарати билан 0,4 кг/га ишлов берилгандан сўнг, самарадорлик 3- кун 70,1 % ни, 7- кун 82,7 % ни, 14-чи кун 93,8 % ни ва 21-кун 96,7 % ташкил этди. Андоза вариант сифатида Вертиmek профи 0,18 к.э инсектициди 0,3 л/га кўлланилганда 3- кун 39,6 % , 7-кун 79,6%, 14-чи кун 86,5 % ни ва 21-кун 90,6%самарадорликка эришилди.

Жадвал-1

Олма қон ширасига қарши Actare 20 s.d.g. препаратининг биологик самарадорлиги (Тошкент вилояти Қибрай тумани, “Нават Агроплюс” МЧЖ 29.03.2019 йил)

№	Вариантлар	Препаратнинг сарф меъёри л/кг/га	Кон шираси билан заараланиш даражаси 15 см да %				
			ишловдан олдин	ишлов ўтказилган кунлар			
				3	7	14	21
1	Actare 20 s.d.g.	0,3	48,2	21,1	15,3	6,9	5,2
2	Actare 20 s.d.g.	0,4	51,5	19,8	12,3	5,2	2,9
3	Вертиmek профи 0,18 к.э (Андоза)	0,2-0,3	47,8	37,1	13,5	10,5	7,8
4	Назорат (Ишловсиз)		45,6	58,6	63,1	74,2	78,8
Биологик самарадорлик (кунлар бўйича) %						3	7
1	Actare 20 s.d.g.	0,3	48,2	65,9	77,1	91,2	93,8
2	Actare 20 s.d.g.	0,4	51,5	70,1	82,7	93,8	96,7
3	Вертиmek профи 0,18 к.э (Андоза)	0,2-0,3	47,8	39,6	79,6	86,5	90,6
4	Назорат (Ишловсиз)		45,6				

ХУЛОСАЛАР

Олма қон ширасига қарши кимёвий воситалар самарадорлик бўйича кузатув натижалрига асосан қўйидаги хulosага келиш мумкин:

1. Қибрай туманидаги “Нават Агроплюс” МЧЖ мевали боғларидаги олма дараҳтлари ўрганилганда 460 та олма дараҳтидан 390 та дараҳт қон шираси билан ўртача заараллангани аниқланди. 42таси кучли, қолган 28 таси нисбатан кучсиз

заараллангани аниқланди.

2. Actare 20 s.d.g. препарати билан 0,4 кг/га сарф меъёрида ишлов берилгандан сўнг, самарадорлик 14- кун 93,8 % ни, 21-кунга келиб 96,7% ташкил этди.

3. Андоза вариант сифатида Вертиmek профи 0,18 к.э инсектициди 0,3 л/га кўлланилганда 14-кун 86,5% ни, 21-кунга келиб самарадорлик 90,6 % га эришилди. Мевали боғларда олма қон шираси

миқдорини бошқаришда Actare 20 s.d.g. кимёвий ҳисоблаймиз.
восита билан ишлов бериш мақсадга мувоғиқ деб

*Тошкент давлат аграр университети
Ўсимликлар карантини илмий маркази илмий ходими*

*Қабул қилинган вақти
16 апрель 2019 йил*

Адабиётлар

1. Хўжайев О, Тешабоев Б. Мевали боғлар заарқунандалари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги Тошкент №5, 2016 39-б.
2. Гаппаров Ф., Пўлатов Ж., Мевали боғларни заарқунандалар мажмуудан ҳимоя қилиш тадбирлари. Ж. Ўсимликлар ҳимояси ва карантини.-Тошкент, №1(5) 2015, 14-15 б.
3. Хўжаев Ш.Т, Холмуродов Э.А, Ўсимликларни заарқунандалардан уйгуналашган ҳимоя қилиш, агротоксикалогия асослари Тошкент 2014. 285-286 б.
4. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С., Анорбаев А.Р., Эргашев И.К., Муродов Б.Э., Сулаймонов О.А., Ўсимликлар клиникасида боғ, токзор ва дала экинларининг заарқунанда касалликларини аниқлаш ҳамда уларга қарши курашиш усуслари.-Тошкент, “Навруз” нашрёти 2018.Б 12-13.
5. Зинковская. Л. А. Кровяная тля в молдавии Кишинев “Штиинца” 1987. С-45-46.
6. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш буйича услубий курсатмалар. –Тошкент, 2004.104-б.

A.R.Anarboev, N.Q.Sayimov, D.T.Mamadjanova.

**Эффективность современных инсектицидов при сопротивлении яблочного сока
(*Eriosoma Lanigerum haustm*)**

В данной статье приведены данные по испытанию препарата Актара 20% в.д.г. кровянной тле на яблоне сорта Семеренко. Результаты испытания подтверждают высокие эффективность препарата Актара при норме 0,3-0,4 кг/га обработки биологическую эффективность составим 91,2-93,8%.

A.R.Anarboev, N.Q.Sayimov, D.T.Mamadjanova

**The effectiveness of modern insecticides in the resistance of apple juice
(*Eriosoma Lanigerum haustm*)**

This article presents data on the testing of the drug Aktara 20Vdg are aphid on apple varieties Semerenko. The results of the test result in the high efficacy of the drug Aktara at a rate of 0,3-0,4 kg/ha of treatment, and the biological efficiency is 91,2-93,8%.

УДК:631.11

Д.Т.ТУРДИЕВА, С.Н.ЮЛДАШЕВА, М.Б.ТУРАБОЕВ

МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ ШИПОВНИКА

Болезни шиповника и борьба с ними являются насущной проблемой начинающего цветовода. Именно для таких людей была подготовлена эта статья. В неё представлены наиболее распространенные болезни шиповника с описанием симптомов, фотографиями поврежденных мест и способами ведения борьбы с инфекциями на приусадебном участке своими руками.

Ключевые слова: болезнь, инфекция, грибы, факторы, химическая обработка

Болезни шиповника мешают получить тот результат, на который рассчитывает каждый цветовод при высадке кустов. Представленное в статье описание поможет вовремя заметить признаки неблагополучия и предпринять меры для санации. Советуем заранее прочитать описание болезней шиповника и способы лечения, поскольку, когда начинается инфекция времени на

поиск информации зачастую не остается. Обычно кусты шиповника страдают от поражения вирусами, бактериями и грибами. Для проникновения этих патогенных микроорганизмов важно наличие высокого уровня влажности, отсутствие регулярного проветривания ветвей, скопление сорняков и многие другие факторы. Своевременный и правильный уход за кустарником

избавляет от необходимости проводить химическую обработку. Просмотрите распространенные болезни шиповника на методы лечения представлены в простой и доступной для понимания форме.

Диплодиозный некроз коры: Возбудитель – гриб *Diplodiarosarum Fr.* На стеблях роз крупные темнобурые участки засохшей коры. Под ней со временем формируются многочисленные мелкие черные плодовые тела. Пораженная кора засыхает, и стебли постепенно отмирают. При сильном распространении болезни на листьях появляются крупные бурые пятна неправильной формы, без окаймления, на которых также сформировываются мелкие точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Кусты теряют декоративность, слабо цветут, при сильном распространении некроза полностью засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в коре пораженных стеблей.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала без каких-либо некрозов коры и язв на стеблях. Своевременная обрезка пораженных стеблей.

Болезни кустов шиповника.

Существуют различные болезни кустов шиповника, при которых преимущественным образом поражаются стебли и одревесневшие части.

Цитоспороз ветвей: Возбудитель – гриб *Cytosporarosarum Grev.* Заболевание проявляется побурением и отмиранием коры ветвей. На пораженной ткани сформировываются многочисленные выпуклые стромы в виде серобурых бугорков. Сначала они погруженные, затем прорывающиеся, тупоконусовидные. Пораженная кора отсыхает, но не отслаивается, а мочалится. Гриб проникает в растение через механические повреждение и из коры распространяется в камбий и древесину, вызывая преждевременное усыхание ветвей. Инфекция сохраняется в пораженных ветвях.

Меры борьбы: Такие же, как против

диплодиозного некроза коры.

Усыхание ветвей: Возбудитель – гриб *Botryosphaeriadethidae (MougetFr.)Ces. EtdN.* На пораженных ветвях сформировываются подушковидные или приплюснуто-конусовидные многочисленные стромы, которые часто расположены тесными, часто сливающимися группами. Плодовые тела однорядные, бурого цвета, погруженные в строму. Ветви буреют и засыхают. Инфекция сохраняется в пораженных ветвях кустов. Во всех случаях на пораженной коре сформированы стромы в виде бугорков различной формы и цвета. Идентифицировать гриб можно только при проведении микологического анализа пораженного материала.

Меры борьбы: Такие же, как против диплодиозного некроза коры.

Болезни шиповника ржавчина.

Возбудитель болезни шиповника ржавчина – гриб *Phragmidiumdisciflorum (Tode) James.* Показывается стебли, молодые побеги и листья. Молодые побеги в основании утолщаются и растрескиваются. Из трещин выступают споры в виде обильного пылящего желтого порошка. Трещины со временем расширяются и на их месте образуются неглубокие бурые язвы. На листьях ржавчина проявляется отдельными округлыми пятнами без окаймления, с обратной стороны которых разрастаются оранжевые пустулы с порошащими спорами. При массовом проявлении болезни листья покрываются многочисленными разбросанными округлыми желтыми пятнами, с обратной стороны которых сформированы многочисленными оранжевые пустулы. Пораженные листья преждевременно опадают, побеги буреют и постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и пораженных стеблях кустов. Чаще поражаются штамбовые розы, у которых в районе корневой шейки и нижней части штамба заметные бурые изъязвления с обильным желтым спороношением.



Rис.

Меры борьбы: Если обнаружена болезнь роз ржавчина, то её лечение начинается с таких агротехнических приемов, как обрезка пораженных стеблей и побегов, сбор всех растительных остатков.

Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

*Поступила
5 мая 2019 года*

Литература

1. Б.А.Хасанов., Несовершенные грибы как возбудители основных заболеваний злаков в Средней Азии и Казахстане. 1992 г.
2. Пидопличко Н.М. Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 2. Грибы несовершенный. Киев: Наука Думка, 1997 г.
3. Азбукина З.М., Барбаянова Т.А., Лукьянчикова В.П., Зайєва А.В. Возбудители грибных болезней зерновых культур.

Д.Т.Турдиева, С.Н.Юлдашева, М.Б.Тўрабоев

Наъматакнинг занг касаллигига қарши кураш усуслари

Наъматакнинг занг касаллиги ва унга қарши кураш чораларини ўрганиш хар бир гулчилик билан шуғулланувчининг вазифасидир. Шу мақсадда ёзилган ушбу мақола томорқада этиштириладиган наъматакнинг кенг тарқалган касаллклари белгилари, кураш чораларини ташкил этишга қаратилган.

D.T.Turdieva, S.N.Yuldasheva, M.B.To'raboev

Methods of struggle against roses of hips

Diseases of roses and the fight against them are the immediate problem of a novice grower. It was for such people that this article was prepared. It presents the most common diseases of roses with a description of the symptoms, photographs of damaged areas and ways of dealing with infections in the backyard with their own hands.

УДК:579.64

ЗУПАРОВА Д. М., АБЛАЗОВА М.М.

ЭНТОМОПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ ПАТОГЕНЛИК ВА ВИРУЛЕНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ушбу мақолада *B. bassiana* энтомопатоген замбуругининг морфологик-культурал белгилари, физиологик ва биокимёвий хусусиятлари ҳамда мазкур замбуругнинг юкори вирулентликка эга штаммларини ажратиб олиш ва танлаш усуслари тўғрисидаги тажриба натижасидаги маълумотлар келтирилган.

Тажрибаларимиз натижасида *B. bassiana* замбуруғини агарли Сабура озиқа мухитда ўстирилган штаммлари ҳосил қилган колонияларини ривожланишига қараб тўртта типга бўлинди ҳамда уларнинг вирулентлиги ўрганилди.

Калит сўзлар: энтомопатоген, замбуруғ, *B. bassiana*, вирулентлик, штамм, колония, патогенлик, сабура, конидия, биопрепарат.

КИРИШ

Ҳашаротларни сонини чегараловчи омиллардан бири, бу уларнинг инфекцион касалликларидир. Уларнинг жадал ривожланиб, оммавий кўпайиши энтомопатоген микроорганизмлар юзага келтирган эпизоотий туфайли кескин тўхташи мумкин [4;5].

Инфекцион касалларга билан кўп холларда

ҳашаротларнинг личинкалари чалинади. Замбуруғлар қўзғатадиган айrim инфекцион касалликлар эса ҳашаротларнинг тухумлари, ғумбаклар ва имаголарини ҳам заарлаши мумкин.

Замбуруғлар қўзғатадиган инфекцион касалликларнинг ўзига ҳослиги шундан иборатки, улар ажратган ферментлар ҳашаротларни бевосита

кутикуласи орқали уларнинг тана бўшлиғига кириб боради ва касаллик туфайли нобуд бўлган ҳашаротлар сирти замбуруғ мицелилари билан қопланади. Замбуруғларнинг ҳашаротларда бундай касалликларни қўзғатиши патогенлик ва унинг даражаси эса вирулентлик дейилади [1;2;3].

ТАДҚИҚОТНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИ

Энтомопатоген замбуруғларнинг вирулентлигини ва патогенезини аниқлашда патологияда қўлланиладиган усуслардан фойдаландик. Шунингдек, микроорганизмларнинг физиологик ва биокимёвий анализ усусларидан фойдаландик.

Сунъий озиқа мухитларида энтомопатоген замбуруғларни ўстириб, етиштириш уларнинг патогенлик ва вирулентлик хусусиятларига таъсир қиласди. Бу ҳолатни *Paecilomyces varioti* Bain. ва *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuil. замбуруғларини озиқа мухитларига қайта-қайта экиб, узоқ муддат саклашнинг уларни патогенлик хусусиятига таъсири

лаборатория шароитида иссиқхона оққанотига нисбатан ўрганилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Тадқиқотларимизнинг дастлаб даврида ажратилган коллекциядаги *P.varioti* ва *B. bassiana* замбуруғларини 1 мл да спора титри $2 \cdot 10^7$ бўлган суспензия билан иссиқхона оққанотини сунъий заарлантирилганда ҳашаротлардаги касалликнинг белгилари бу энтомопатоген замбуруғлар юзага келтирадиган касалликлар учун хос бўлган ташки белгилари билан бир хил бўлди. Бу ҳолат замбуруғлар озиқа мухитларида узоқ сакланган бўлса ҳам патогенлик хусусиятлари йўқотмаганлигидан дарак беради.

Лабораторияда сакланган *P.varioti* ва *B. bassiana* замбуруғларининг бир неча штаммларини иссиқхона оққанотининг турли ёшига нисбатан патогенлик хусусиятларини намоён қилиш 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Иссиқхона оққанотига нисбатан *P.varioti* ва *B. bassiana* замбуруғи штаммларини вирулентлик хусусиятларини намоён қилиши

№	Замбуруғларнинг штаммлари (суспензиядаги споралар микдори $2 \cdot 10^7$ спор/мл)	Нобуд бўлган ҳашаротлар, %				
		Ҳашаротнинг ривожланиш босқичлари				
		тухум	I-II-ёшдаги личинкалар	II-III-ёшдаги личинкалар	III-IV-ёшдаги личинкалар	има-го
		Сунъий заарлантирилгандан сўнг хисоби олинган кунлар, сутка				
		10	5	5	7	7
1.	<i>P.varioti</i> ЭМР-5	9,4	84,9	75,5	73,2	82,1
2.	<i>P.varioti</i> ЭМР-11	6,7	63,3	51,4	21,3	43,1
3.	<i>P.varioti</i> ЭМР-33	19,4	53,1	42,1	27,1	86,7
4.	<i>P.varioti</i> ЭМР-46	23,1	72,7	67,3	18,1	39,3
5.	<i>P.varioti</i> ЭМР-57	12,4	32,3	30,7	10,1	89,4
6.	<i>B. bassiana</i> ЭМВ-8	14,3	61,3	59,4	52,3	84,8
7.	<i>B. bassiana</i> ЭМВ-154	12,1	65,2	54,1	44,3	42,1
8.	<i>B. bassiana</i> ЭМВ-71	10,8	35,4	59,4	72,3	75,2
9.	Назорат (сув)	3,5	7,1	5,3	4,5	4,2

Олинган натижалардан шу нарса маълум бўлди *P.varioti* нинг ЭМР-5, ЭМР-46 ва ЭМР-11 штаммлари оққанотнинг личинкаларнинг I-II ёшларига нисбатан юқори вирулентликни 84,9%; 72,7% ва 63,3% намоён қилган бўлса, бундай хусусиятни ЭМР-33 ва ЭМР-57 штаммлар имаголарга нисбатан 86,7% ва 89,4% намоён қилди. Бу замбуруғ штаммларини барчасига оққанотнинг тухумлари нисбатан чидамли эканлиги маълум бўлди.

B. bassiana замбуруғининг штаммлари ўртасида ҳам вирулентлик бўйича фарқлар кузатилди. ЭМВ-8 штамми личинкалар ва имаголарга нисбатан 52,3-84,8% вирулентлик намоён қилган бўлса, ЭМВ-71 ва ЭМВ-154 штаммлар имаголарни 75,2% ва 42,1% гача заарлаб, уларни нобуд бўлишига сабабчи бўлди.

Амалга оширилган тажрибалар натижасида энтомопатоген замбуруғларнинг штаммлари

ҳашаротларни нафакат маълум бир турларига нисбатан, балки уларнинг ривожланишини турли босқичларида, тухумидан имагосигача намоён қилган вирулентлик хусусиятларида ҳам бир-биридан фарқ қилиши аниқланди.

ХУЛОСА

Юкоридаги *Denteromycetes* синфида мансуб энтомопатоген замбуруғларнинг ривожланишини кузатиш орқали шундай хулосага келиш мумкин, бу замбуруғларни лаборатория шароитида сапрофит ҳолда кўпайтириш уларнинг паразит ирки ва популяциясини ҳашаротга нисбатан табиатда намоён қиладиган патогенлик хусусиятларини у ёки бу даражада ўзгаришига олиб келар экан. Шу сабабли *Denteromycetes* синфида кирган энтомопатоген замбуруғларнинг патогенлик ва вирулентлик хусусиятларини саклаб қолиш ва яхшилаш бўйича олиб бориладиган селекция ишларини маълум бир зааркунандага қаратилган

холда олиб бориш ҳамда замбуруғларни таркибини түгри танлаш мухим аҳамиятга эга. кўпайтирища ишлатиладиган озиқа мухити

*Геномика ва биоинформатика маркази
ТошДАУ*

*Қабул қилинган вақти
20 марта 2019 йил*

Адабиётлар

1. Гештова Н.Ю. Энтомопагенные грибы (биотехнологические аспекты). – Алматы: 2002. – 288с.
2. Громовых Т.И. Энтомопатогенные грибы в защите леса. – Новосибирск: Наука, 1982. – 80с.
3. Исси И., Воронина Э.Г. Пути использования облигатных паразитов – энтомофторовых грибов и микроспоридий – в интегрированной защите растений. / Биоценотическое обоснование критерииев эффективности природных энтомофагов. – Л.: 1983. – С. 17-31.
4. Кирсанова В.А. Физиологическая изменчивость энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana (Bals) Vuill., индуцированная физическими и химическими мутагенами // Микология и фитопатология. -1968.-Т. 2. №3. - С. 183 - 193.
5. Havukkala I. Induction and purification of Beauveria bassiana chitinolytic enzymes / Havukkala, I., Mitamura, C, Hara, S., Hirayae, K., Nishizawa, Y, andHibi, T. // J. Invertebr. Pathol. 1993. - V. 61. - P. 97-102.

Зупарова Д. М., Аблазова М.М.

Патогенные и вирулентные особенности энтомопатогенных грибов

В данной статье приводятся сведения о морфоло-культуральных, физиологических, биохимических и вирулентных свойствах энтомопатогенного гриба *B.bassiana* а также о методах, определения, выделения и изучения выше указанных свойств гриба.

На основании полученных данных авторами было установлено, что гриб *B.bassiana* при выращивании на агаризованной среде Сабура образует четыре типа колоний различающиеся между собой по вирулентным свойствам.

Zuparova D.M., Abzalova M.M.

Pathogenic and virulent features of entomopathogenic fungi

This article provides information about the morphological and cultural physiological, biochemical and virulent properties of the entomopathogenic fungus *B.bassiana*, and also about the methods for determining, isolating and studying the above referred properties of fungus.

Based on the data obtained by the authors, it was found that the fungus, when grown on Aloe agarosed sphere, forms four types of colonies differing in their virulence properties.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

МЕВАЧИЛИК ВА САБЗАВОТЧИЛИК

УДК: 635.61

Т.М. АЗИМБАЕВ, С.И. ДУСМУРАТОВА

ГИДРОПОНИКА ИССИҚХОНАЛАРИДА ЕТИШТИРИШГА МОС ҚОВУН НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ

Мақолада гидропоника иссиқхонасида кичик ҳажмли субстратда қовуннинг Ўзбекистонда районлаштирилган ва хориждан келтирилган 20 та навлари ва дурагайлари синови бўйича маълумотлар келтирилган. Тажрибада ўрганилаётган ҳар бир нав намуналари уруғларининг тавсифи, униб чиқиши, ўсиши ва кўчат сифат кўрсаткичлари баён этилган. Нав намуналари эртапишар ва эрта-ўртапишар бўлиб, уруғлари униб чиқишида чет элдан келтирилган F₁ дурагайлари устунлик қилди, ўсиш жадаллигига кўра Роҳат нави ва дурагайлар яхши натижа кўрсатди.

Калит сўзлар: гидропоника иссиқхонаси, қовун, уруғлар, кўчат, субстрат, навлар, дурагайлар.

КИРИШ

Дунё аҳолисининг ўсиб бориши жараёнида озиқ-овқатга бўлган эҳтиёж, хусусан сабзавот-полиз маҳсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда жаҳонда сабзавот-полиз маҳсулотларини етишириш кўрсаткичи 1150 млн. тонна деб баҳоланмоқда. Дунё бўйича кенг тарқалган сабзавот-полиз экинлари турларини ишлаб чиқариш ҳажмида қовун 29,5 млн. тоннани ташкил этмоқда. (<http://www.docplayer.ru>).

Хусусан, ҳимояланган ер иншоатларида қовун етишириш Франция, Италия, Венгрия, Испания, АҚШ, Болгария ва Япония каби мамлакатларда кенг тарқалган. Ҳаттоқи, Ироил, Миср, Марокаш каби иссиқ иқлимли мамлакатларда ҳам қишики даврда пленкали иссиқхоналарда қовун етиширилади.

Иссиқхоналарда қовун етишириш эса Япония, Хитой, Италия, Испания, Франция, Венгрия ва АҚШ каби мамлакатларда ривожланган. Нидерландияда ойнаванд иссиқхоналарда қовун 150 гектардан ортиқ майдонда экиласди. Йилига 2-3 млн. дона қовун етиширилиб, бу маҳсулотларнинг 43% Гарбий Германияга, 47% эса – Буюк Британияга экспорт қилинади.

Японияда кўпроқ Америка, Осиё мамлакатларидан олиб келинган қовун нав намуналари экиласди. Шунингдек, ҳитой қовунлари ҳам консервалаш мақсадида экиласди. Бу намуналар ичida кўпроқ эти яшил тусли, думалоқ шаклдаги ва

юзаси тўр билан копланган нав ва дурагайлар алоҳида эътиборга эга.

Ўзбекистонда очик ерда мевалари апрел ойигача сақланадиган қовун навлари етиширилади. Шу боис ҳимояланган ерлардан май-июн ойларида, очик ердан хали янги ҳосил чиқмаган даврларда маҳсулот ишлаб чиқариш талаб қилинади. Гидропоника иссиқхоналарида сифатли маҳсулот етишириш, полиз маҳсулотлари билан аҳолини таъминлаш, шу билан бирга, хорижга экспорт қилишни ташкил этиш муҳим саналади. Шу сабабдан гидропоника иссиқхоналарида қовун етишириш технологиясини ўрганиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон шароитида гидропоника иссиқхоналарида кичик ҳажмли субстратларда етишириш технологияси, хусусан, мамлакатимиз шароитига мос келадиган қовун навлари ва дурагайларини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган.

Юкоридагиларни инобатга олиб, биз магистрлик диссертация тадқиқотларини «Гидропоника иссиқхоналарида етиширишга мос қовун нав намуналарини танлаш» мавзусида олиб боришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ

Монографик тадқиқотлар Тошкент давлат аграр университети «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкочилик» кафедрасида бажарилмоқда. Дала

тажрибалари Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтидаги баҳорги иссиқхонада олиб борилмоқда. Тажрибалар сабзавотчилиқда мавжуд тадқиқотлар методикалари: «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992); «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликта тажрибалар ўтказиш методикаси» (Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б., 2003); «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) номли услубий нашрлардан фойдаланилган ҳолда ўтказилмоқда.

Ўзбекистонда районлаштирилган ҳамда чет мамлакатлардан келтирилган жами 20 та нав намуналари гидропоника иссиқхонаси шароитидаги кичик ҳажмли субстратларда синалмоқда. Жумладан: Ўзбекистонда яратилган Роҳат (стандарт 1); Кичкинтой (стандарт 2); Дилхуш нави; Л-160; Л-161; F₁ 179/23; Ҳитой Ҳалқ Республикасининг Мингийуз F₁ K1217; Менгми F₁ K1526; Хуелихонг F₁; F₁ 9818; Заозухиа F₁ дурагайлари; Қозогистоннинг Муза, Жансая, Медовая, Прима, Эфиопка, Майская навлари ва Голландиянинг Дақаро F₁, Sereen F₁; Bisan F₁ дурагайлари устида тажрибалар ўтказилмоқда.

Нав намуналари қайтариқсиз, стандарт навлар ҳар 10 та намунадан кейин экилган. Қовун кўчатлари кичик ҳажмли кокосли субстратда, ҳар бир қопчасида 3 донадан, ўсимликлар оралиғи 35 см, ҳар бир вариантда 5-7 тадан ўсимликлар жойлашган. Кокосли субстратларга 30 кунлик кўчатлар экилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

2019 йилги тажрибаларнинг дастлабки натижаларига кўра, экиш олдидан ҳар бир намунанинг уруғлари ўлчаниб, уларнинг шакл индекси, 1000 дона уруғлар вазни, 1 кг даги уруғлар сони аниқлаб олинди. Йирик-майдалиги бўйича ўрганилган нав намуналари бир-биридан фарқ килди. Шаклига кўра барча намуналар уруғлари чўзинчоқ овал, индекси 1 дан юкори, уруғларнинг абсолют оғирлиги (1000 дона уруғлар вазни)га кўра бирмунча йирик уруғлиларга: Жансая, Майская, Муза, Заозухиа F₁, Дилхуш ва F₁ 179/23 дурагайлари кирган бўлса (50,1-67,6 г.), энг майда уруғлиларга Л-160 ва Л-161 намуналари киритилди (17,6-19,4 г.). шунга тегишли равишда уруғлар қанчалик йирик бўлса, 1 кг даги уруғлар сони шунчалик кам бўлиши қайд этилди (жадвал 1).

Жадвал 1.

Қовун навлари ва дурагайларининг уруғлари тавсифи ва кўчатнинг сифат кўрсаткичлари, 2019 й.

№	Нав намуналари номи	Экишдан олдин			Уруг экилганидан униб чикишигача, кун	Учинчи чинбарг чикиши, кун	Кўчат сифати 1.04.2019 й.		
		уруг индекси	1000 дона уруг вазни, г	1 кг уругда уруглар сони, дона			поя баландлиги, см	поя диаметри, см	барглар сони, дона
1.	Роҳат (St)	2,25	49,5	20202	8	22	5,8	0,3	3
2.	Кичкинтой (St)	2,32	29,8	33557	8	21	4,36	0,16	3
3.	Дилхуш	3,0	62,8	15924	9	23	4,23	0,35	3
4.	Л-160	2,0	19,4	51546	8	21	4,6	0,28	3
5.	Л-161	2,6	17,0	58824	9	21	4,26	0,32	3
6.	F ₁ 179/23	1,92	67,6	14793	7	22	4,63	0,36	3
7.	Мингийуз F ₁ K1217	2,26	42,7	23420	7	21	4,8	0,3	3
8.	Менгми F ₁ K1526	2,5	38,8	25774	7	21	2,8	0,36	3
9.	Хуелихонг F ₁	2,8	46,4	21552	7	21	3,26	0,36	3
10.	F ₁ 9818	2,32	40,7	24570	7	21	3,8	0,32	3
11.	Заозухиа F ₁	2,7	52,8	18940	7	21	4,43	0,4	3
12.	Дақаро F ₁	2,6	44,6	22422	7	21	4,06	0,46	3
13.	Муза	2,05	53,9	18553	9	23	4,16	0,46	3
14.	Жансая	2,7	50,1	19960	8	23	3,6	0,32	3
15.	Медовая	2,32	46,3	21598	8	23	4,23	0,33	3
16.	Прима	2,13	42,1	23753	8	23	4,4	0,3	3
17.	Эфиопка	2,32	49,4	20243	8	22	3,2	0,3	3
18.	Майская	2,37	54,8	18248	9	22	3,63	0,4	3
19.	Sereen F ₁	2,4	45,0	22223	7	21	3,6	0,32	3
20.	Bisan F ₁	2,5	41,5	24097	7	21	3,83	0,33	3

Қовун кўчатларини етиштириш учун 8 см диаметрли пластик кассеталардан фойдаланилди. Кўчатлар иситиладиган плёнкали иссиқхоналарда 30 кун давомида етиштирилди. Фенологик кузатувларида уруғлар униб чикиши, майсалашдан то биринчи чинбарг ва учинчи чинбаргчикишигача кунлар сони аниқлаб олинди. Натижаларга кўра, чет эл дурагайлари 7 кунда, қолган навлар 8-9 кунда униб чиққанлиги қайд этилди. Учинчи чинбарг чикиши ҳам дурагайларда 2 кун олдин кузатилди (21 кунда), қолган навларда эса – 22-23 кунда учинчи чинбарг чиққанлиги, яъни, стандарт навларга нисбатан 1 кун

олдин қайд этилди.

30 кунлик кўчатларни экиш олдидан сифат кўрсаткичлари аниқланди, бунда кўчатнинг баландлиги (бўйи), поясининг диаметри (уругпалла барглари остидан) ўлчанганд, кўчатдаги барглар саналган. Маълум бўлди, Роҳат стандарт нави энг баланд бўйли (5,8 см), Ўзбекистон селекцияси навларидан поя баландлиги 4,2-4,6 см бўлгани қайд этилди. Қолган дурагайларда поя баландлиги 3,2-4,2 см ташкил этди. Ҳитойнинг Менгми F₁ K1526 дурагайи пояси энг кичик - 2,8 см бўлди (расм 1).



1- расм. Иссикхонага экилган күчтаптар
кўриниши.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти 15 май 2019 йил

Адабиётлар

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси // Тошкент, (ЎзМЭ). 2002. – 9–11 Б.
2. Белик В.Ф. Особенности методики проведения опытов в сооружениях защищенного грунта. // Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва. ВО Агропромиздат. 1992. – С. 189-193.
3. Буриев Х.Ч. Способы выращивания ранней продукции. // Бахчеводство. Ташкент. УзМЭ. 2002. - С. 278-271.
4. Зуев В.И., Атакаджаев А.А., Асатов Ш.И., Кадирходжаев А.К., Акрамов У.И. Ҳимояланган жой сабзавотчилиги. – Тошкент. ТошДАУ. 2018. – Б. 86-122.
5. <http://www.docplayer.ru>

Т.М. Азимбаев, С.И. Дусмуратова

Подбор сортообразцов дыни для выращивания в гидропонных теплицах

В статье приводятся сведения об испытанных 20 районированных и зарубежных сортов и гибридов дыни в условиях гидропонных теплиц на малообъемном субстрате. Даны характеристика семян, описание времени появления всходов, особенности роста и качественные показатели рассады сортообразцов дыни, изучаемых в опыте. Сортообразцы являются раннеспелыми и средне-раннеспелыми, по времени появления всходов выделились зарубежные гибриды F₁, по интенсивности роста рассады сорт Рохат и гибриды показали хорошие результаты.

Т.М. Azimbayev, S.I. Dusmuratova

Selection of variety samples of melons for cultivation in hydroponic greenhouses

The article provides information about the tested 20 Uzbek, foreign variety samples and melon hybrids in hydroponic greenhouses on a small size substrate. The characteristics of seeds, the description of the time of emergence of shoots, features of growth and quality indicators of seedlings of melon samples studied in the experiment are given. Breeding samples are early maturing and mid-early maturing, foreign F₁ hybrids stood out by the time of emergence, and Rohat variety and hybrids showed good results according to the growth rate of seedlings.

УДК: 634.721

Д.У.ЖАНАКОВА, И.Т.НОРМУРАТОВ

ҚОРАҒАТНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЯНГИ НАВЛАРИНИ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИ

Маколада хориждан келтирилган қорағат навларини ўсиши ва ривожланишининг морфобиологик хусусиятларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқикот натижалари келтирилган. Кузатувларга кўра ўрганилган навлар шоҳ-шаббасини тарқоклиги бўйича бир-биридан фарқланган. Бунда кучли тарқоқ туп ҳосил қилиш фақатгина олтинсимон турга мансуб Ермак ва Валентина навларида қайд этилган. Қорағатнинг қора турига мансуб барча навлар тупининг ихчамлиги ва шоҳ-

шаббасининг аксарият ҳолларда тик ўсиши билан ажралиб турган. Ҳосилдорлик бўйича эса олтинсимон турга мансуб навларда умумий устунлик қайд этилган.

Калит сўзлар: Қора қорагат, олтинсимон қорагат, ҳосилдорлик, тупи, шох-шаббаси, нави, тури.

КИРИШ

Республикамизда аҳоли саломатлиги, соғлом овқатланиш, бир сўз билан айтганда озиқ-овқат хавфсизлигига биринчи даражали вазифа сифатида қаралади. Ушбу масала мамлакат Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонининг кўпгина бандларида алоҳида таъкидлаб ўтилган[1].

Резавор мевалар, хусусан қорагат республикамизда соғлом овқатланишни ташкил этишда муҳим ўрин эгаллаши мумкин бўлган қимматбаҳо мевали ўсимликдир. Негаки унинг қора (*Ribes nigrum*) турларитаркибида С витаминининг (аскорбин кислотаси) кўплиги (98-417 мг%) билан ажралиб турса, олтинсимон (*Ribes aureum*) тури эса А провитамина бойлиги (айрим навларида А провитаминининг микдори ўрик ва ҳатто қалампирдан ҳам кўпроқ бўлади) билан ажралиб туради [5, 8].

Бироқ, республикамизда ушбу сервитамин резавор мева тури жуда кам тарқалган бўлиб, унинг саноат боғлари мавжуд эмас. Жаҳонда эса бугунги кунда қарийб 650230 тоннадан ортиқ смородина етиширилмоқда ва унинг майдони 12820 гектарни ташкил этмоқда. Ушбу мева билан бир қаторда бошқа резавор меваларга талаб ва уларни етишириш ҳажми ҳам ортиб бормоқда [6]. Қорағат етишириш ва уни экспорт қилиш ҳажми бўйича дунёда Россия, Польша, Украина ва Молдавия каби давлатлар етакчилик қилиб келмоқда.

Кўриниб турибдики, бундай витаминга бой ва кўп ҳалқлар томонидан суйиб истеъмол қилинадиган ушбу резавор мева турини республикамизда қўпайтириш ва ҳалқимизни етарли даражада таъминлаш муҳим вазифалардан биридир. Бунинг учун мамлакатимизда тарқалган ва интродукция қилинаётган навларнинг ўсиши ва ривожланишининг

морфо-биологик хусусиятлари ва хўжалик аҳамиятини чукур тадқиқ қилиш тақозо этилади.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ

Қорағатнинг янги интродукция қилинган навларини ўсиши ва ривожланишининг морфо-биологик хусусиятлари X.Ч.Буриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқа олимлар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишида хисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси»[2], В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» [3] ва мевали ва резавор мевали ҳамда ёнғоқ мевали ўсимликлар билан тажриба ўтказиши дастури ва услуби[4] асосида олиб борилди. Тажрибадаянги интродукция қилинган қорағатниқора (*Ribes nigrum*) турига мансуб йирик мевали Ядрёна, Селеченская-2, Экзотика ва Душистая навлари, олтинсимон (*Ribes aureum*) турига мансуб йирик мевали Ермак, Изабелла, Ляйсан, Валентина навлари ўрганилди. Назорат варианти сифатида республикада туманлаштирилган [7] Узбекистанская крупноплодная ва Восточная (23-3) навларидан фойдаланилди. Тажриба майдонининг тупроғи – қадимдан сугориладиган типик бўз тупроқ. Тупларнинг жойлашиш схемаси 2,5x1 м, тажриба тақориийлиги – тўрт қайтарикли.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Хар бир мевали ўсимликнинг яхш ривожланганлиги тупининг габитуси билан ифодаланади. Тажрибалар шуни қўрсатдики, қорағатнинг ўрганилган навлари З ёшли туплари ўзининг турлича ўлчамдаги габитуси билан фарқланди. Қорағат тупларининг габитуси уларнинг ботаник турига эмас, балки унинг навига кўпроқ боғлиқ бўлди. Негаки иккала тур қорағат навларида ҳам тарқоқ габитуси ва ихчам габитуси намуналар қайд этилди.

1-жадвал

Қорағат навлари уч ўшли тупларини ўсиши ва ривожланишининг морфологик хусусиятлари, 2015-2018 йй

Нав	Тупининг баландлиги, см	Шох-шаббасининг диаметри, см		Тупининг морфологик тавсифи
		қатор оралиғида	қаторда	
Қорағатнинг олтинсимон (<i>Ribes aureum</i>) тури				
Узбекистанская крупноплодная – назорат	132,5	107,7	101,5	Кучли ўсуви, шох-шаббаси ўртача тарқоқ, шохлари кучли ўсади
Ермак	138,7	137,7	128,9	Кучли ўсуви, шох-шаббаси жуда тарқоқ, шохлари кучли ўсади
Изабелла	91,8	89,7	85,6	Кучсиз ўсуви, шох-шаббаси кучсиз тарқоқ, тупи ихчам
Ляйсан	112,9	104,5	100,1	Кучли ўсуви, шох-шаббаси

				ўртача тарқоқ, тупи етарлича ихчам
Валентина	115,8	114,7	111,8	Кучли ўсувчи, шох-шаббаси тарқоқ, тупи қуюқ шохли
Қорағатнинг қора (<i>Ribes nigrum</i>) тури				
Восточная (23-3) – назорат	109,7	89,1	87,2	Кучли ўсувчи, шох-шаббаси ихчам, кучсиз тарқоқ
Ядрёная	99,7	87,8	81,4	Кучсиз ўсувчи, шох-шаббаси кучсиз тарқоқ
Селеченская-2	134,6	78,5	74,6	Кучли ўсувчи, шох-шаббаси тик ва тұғри ўсувчи
Экзотика	128,9	71,5	71,8	Кучли ўсувчи, шох-шаббаси ихчам, шохлари тик ўсади
Душистая	101,4	91,7	89,8	Ўртача ўсувчи, шох-шаббаси кучсиз тарқоқ, тупи қуюқ шохли

Кузатувлар шуни күрсатдиди, барча навнамуналар Тошкент вилоятининг қадимдан сугориладиган типик бўз тупроқлари шароитида яхши ўсиб ривожланди. Бунда назорат Узбекистанская крупноплодная навига нисбатан баланд бўйли ўсимликлар қорағатнинг олтинсимон (*Ribes aureum*) турида Ермак навида қайд этилди. Қорағатнинг қора (*Ribes nigrum*) турида эса энг баланд ўсимликлар Селеченская-2 навида қайд этилди, ушбу нав тупларининг ўртача баландлиги 134,6 см га етди ва назорат – Восточная (23-3) нав тупларидан 24,9 см га баландроқ бўлди. Энг кучсиз ўсиш олтинсимон турга мансуб Изабелла (91,8 см) ва қора турига мансуб Ядрёная (99,7 см) навларида қайд этилди. Қорағатнинг иккала турида ҳам қолган навлар назорат варианти даражасида ва ундан бироз пастрок бўлди.

Шох-шаббасининг тарқоқлиги бўйича ҳам

қорағатнинг навнамуналари бир-биридан фарқланди. Бунда кучли тарқоқ туп ҳосил қилиш фақатгина олтинсимон турга мансуб Ермак ва Валентина навлари қайд этилди. Қора турига мансуб барча навлар тупининг ихчамлиги ва шох-шаббасининг аксарият ҳолларда тик ўсиши билан ажралиб турди.

Таъкидлаш жоизки, ўсимликнинг бўйи, шохшаббасининг тарқоқлиги ёки тик ўсиши асосий хўжалик белги ҳисобланмайди ва ҳар қандай ҳолатда ҳам пировард натижага тупдан ва майдон бирлигидан олинадиган ҳосил билан баҳоланади. Кузатувлар шуни күрсатдиди, қорағатнинг олтинсимон (*Ribes aureum*) турида ҳосилдорлиги бўйича назорат Узбекистанская крупноплодная навидан устун бўлган навлар қайд этилмади. Бироқ ўрганилган янги навлар мевасининг дегустация баҳосининг юқорилиги, рангининг назоратдан фарқланиши (Ляйсан – сарик) билан ажралиб турди (2-жадвал).

2-жадвал

Қорағат навларида ҳосилнинг шохлар бўйича тақсимланиши ва ўртача ҳосилдорлиги, 2015-2018 йй

Навлар	Ҳосилнинг шохлар бўйича тақсимланиши, ўртача, кг				Тупнинг ўртача ҳосилдорлиги, кг
	бир йиллик	икки йиллик	уч йиллик	тўрт йиллик	
Қорағатнинг олтинсимон (<i>Ribes aureum</i>) тури					
Узбекистанская крупноплодная – назорат	0,6	1,2	3,7	2,6	8,1
Ермак	0,4	1,1	2,2	2,0	5,7
Изабелла	0,4	1,2	2,5	2,2	6,3
Ляйсан	0,5	1,3	3,2	2,9	7,9
Валентина	0,3	1,0	1,8	1,4	4,5
Қорағатнинг қора (<i>Ribes nigrum</i>) тури					
Восточная (23-3) - назорат	0,2	0,9	1,4	1,3	3,8
Ядрёная	0,3	1,1	2,1	1,9	5,4
Селеченская-2	0,3	1,0	1,5	1,3	4,1
Экзотика	0,3	1,0	1,3	1,1	3,7
Душистая	0,3	0,9	1,3	1,1	3,6

Қорағатнинг қора (*Ribes nigrum*) турида ҳосилдорлик бўйича бирмунча бошқача ҳолат қайд этилди. Бунда Ядрёная ва Селеченская-2 навлари ўзининг юқори ҳосилдорлиги билан назорат – Восточная (23-3) навидан фарқланди ва мос ҳолда ҳар тупидан ўртача 1,6 ва 0,3 кг кўпроқ ҳосил берди.

Колган навнамуналар ҳосилдорлиги назорат варианти даражасида бўлди.

Жадвал маълумотлари шуни ҳам қайд қилиш имконини бердики, ҳосилнинг шохлар бўйича тақсимланиши қорағатнинг иккала турида ҳам бир хил тенденция асосида кечди. Бунда энг юқори

бериш уч ёшли шохлар улушига тўғри келди. Иккала турда ҳам уч ёшгача ҳосилнинг динамик ортиб бериши ва тўртинчи йилдан бошлаб бирмунча пасайиши қайд этилди.

ХУЛОСА

Қорағатнинг олтинсимон (*Ribes aureum*) тури янги интродукцион навларининг ҳосилдорлиги назорат Узбекистанская крупноплодная навидан юкори бўлмасада, мевасининг дегустация баҳосининг

юқорилиги, рангининг назоратдан фарқланиши (Лайсан – сарик) билан ажralиб туради.

Қорағатнинг қора (*Ribes nigrum*) турида эса юқори ҳосилдори навлар сифатида Ядрёнаява Селеченская-2 навларидан фойдаланиш мумкин, уларда бир тупнинг ўртacha ҳосилдорлиги назорат - Восточная (23-3) навига нисбатан мос ҳолда 1,6 ва 0,3 кг кўпроқ бўлди.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти 20 май 2019 йил

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. ПФ-4947-сон. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Президент Фармони. – Тошкент, 2017 йил 7 феврал.
2. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишида ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
3. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами. – Методические рекомендации. – Киев, 1967. – С. 33-37.
4. Программа и методика сортозучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Отв.ред. Г.А.Лобанов) – Мичуринск, 1973. – С. 378-391.
5. Степанова Е.Л. Черная смородина – витаминная культура. – М.: Пищепромиздат. – 60 с.
6. Текущее состояние и тенденции развития сектора производства ягод на мировом плане и в Республике Молдова. https://east-fruit.com/storage/conference_materials/pdf/d1/
7. Ўзбекистон Республикасида етиштириш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестри. – Тошкент, 2018.
8. <https://cyberleninka/article/v/biohimicheskiy-sostav-plodov-smorodiny>

Д.У.Жанакова, И.Т.Нормуратов

Рост, развитие и продуктивность новых интродуцированных сортов смородины в Узбекистане.

В статье приведены результаты исследований по изучению морфо-биологической особенности роста и развития интродуцированных из зарубежья сортов смородины. Наблюдения показали, что сорта смородины различались между собой по структуре кроны. Самая раскидистая крона отмечена у сортов золотистой смородины Ермак и Валентина. Сорта черной смородины различались компактной кроной. А по урожайности общее преимущество было у сортов золотистой смородины.

D.U.Janakova, I.T.Normuratov

Growth, development and productivity of new introduced currant varieties in Uzbekistan.

The article presents the results of studies on the study of the morpho-biological features of growth and development of currant varieties introduced from abroad. Observations showed that the varieties of currants differed among themselves in the structure of the crown. The most spreading crown is found in the varieties of golden currant Yermak and Valentina. Black currant varieties differed in a compact crown. And in terms of yield, the common advantage was in varieties of golden currant.

УДК 577.152.582.282

АБДУЛЛАЕВ Ф.Т., ЖАМОЛОВА Л.Ю., ТУРАЕВА Г.С., УММАТОВА Х.С.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ХИТОЗАНА И ЕГО КОМПЛЕКСА С ГЛИЦИРИЗИНОВОЙ КИСЛОТОЙ В РАСТЕНИЯХ

В статье приведены антивирусные свойства вновь синтезированных препаратов на основе хитозана и его комплекса с глицерризиновой кислотой против вирусов табачной мозаики. Показано, что препарат комплекса хитозана с глицерризиновой кислотой проявляет высокую антивирусную активность.

Ключевые слова: табачная мозаика, глицирризиновая кислота, хитозан, вирус, мононекроз, штамм.

Хитозан является гетерополимером, поэтому степень полимеризации, количественное соотношение ацетилированных и деацетилированных звеньев, а также расположение вдоль полимерной цепи обуславливают многообразие его химических и биологических свойств. Поиск и установление структуры, соответствующей требуемым свойствам, является одной из главных задач в биотехнологии хитозана.

Антибактериальное, антивирусное и антигрибковое действие, иммуномодулирующее свойство, элистиорная активность в растениях, способность связывать металлы, образовывать полизелектролитные комплексы с другими веществами позволяют применять хитозан в пищевой, косметической и лёгкой промышленности, в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве [1].

Нетоксичность, неаллергенность, биосовместимость и биодеградируемость делают этот биополимер необычайно привлекательным для биотехнологии. Наличие реакционноспособной аминогруппы в составе глюкозаминных звеньев позволяет получать множества производных хитозана, расширяющих его свойства и сферы применения.

В сельском хозяйстве хитозан используется, в основном, в качестве натурального средства для предотвращения болезней семян и усиления роста растений, а также в качестве экологически чистого биопестицида, который повышает врожденную способность растений защищаться от грибковой инфекции. Такие виды биологической активности хитозана обусловлены его антибактериальными, антивирусными, фунгицидными, адсорбционными и антиоксидантными свойствами [2,3].

Комплексы хитозана с глицирризиновой кислотой усиливают антивирусные и антибактериальные свойства, так как глицирризиновая кислота (ГК) активна в отношении вирусов, содержащих ДНК и РНК. Противовирусное действие глицирризиновой кислоты по-видимому связано с индукцией образования интерферона. Она прерывает репликацию вирусов на ранних стадиях и вызывает выход вириона из капсида, тем самым не допуская его проникновения в клетки. Взаимодействуя со структурами вируса, изменяет различные фазы вирусного цикла, что сопровождается необратимой инактивацией вирусных частиц (находящихся в свободном состоянии вне клеток), блокированием внедрения активных вирусных частиц через клеточную мембрану внутрь клетки, а также нарушением способности вирусов к синтезу новых структурных

компонентов [4].

Вирус табачной мозаики (ВТМ) входит в группу табакомавирусов и уничтожает большое количество растений технических и овощных культур. От овощных культур томатов, баклажанов, лукович и горького перца и других культур в результате заболеваемости резко снижается урожайность растений. Эти зараженные вирусом растения становятся уязвимыми для других вирусов, а также грибковых, бактериальных и вредных микроорганизмов, что в результате приводит к высыханию растений.

Палочкообразная форма ВТМ, размером 300x18 нм, устойчива к внешним воздействиям при температуре 88-98°C, теряет своё активное действие, её конечная точка растворения до 10^{-10} . Вирус содержит 95% белков, 5% нуклеиновых кислот, геном представляет односпиральную РНК. В природе вирус распространяется через семена растений, при обработке растений и другими способами, известно более 300 штаммов, четыре из которых были изучены в Узбекистане.

Применение препаратов природного происхождения в борьбе с фитопатогенными вирусами сельскохозяйственных культур занимает особое место не только в нашей стране, но и во всем мире.

Препарат FM-1 -0,2%-ный раствор хитозана в уксусной кислоте - является природным биологически активным препаратом, с явно элистиорными свойствами. Препараты на основе хитозана повышают иммунитет растений и усиливают их устойчивость к фитопатогенным агентам.

Препарат FM-2 - комплекс 0,2%-ного раствора хитозана в уксусной кислоте с 0,01%-ным раствором глицирризиновой кислоты в этиловом спирте при соотношении 1:1.

В последние годы в защите растений быстро развивается использование глицирризиновой кислоты из-за её антибактериальных, антивирусных и иммуномодулирующих свойств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

Штамм ВТМ получили из томата методом мононекроза и размножили в растении табака, *Nicotiana tabacum* и индикаторное растение с *Nicotiana glutinosa* вырастили в изоляторе.

Для экспериментов вирусный гомогенат готовили следующим образом. 50-60 г листьев табака, поражённых размноженным вирусом, в течение одного месяца обрабатывали ВТМ-ТШ с 0,2 М фосфатным буфером (рН-7,2). Заражённые вирусом листья измельчали и растворяли буферным раствором в соотношении 1:1, равном массе полученного вирусного гомогената, затем его

центрифугировали в течение 15 мин при 6000 об/мин. Полученный таким образом вирусный гомогенат был использован в наших экспериментах [5-7].

Были проведены исследования *in Vitro* *Nicotianaglutinosa* и *Nicotiana tabacum* при изучении влияния FM-1 и FM-2 на ингибирующую активность в отношении ВТМ-ТШ.

Для каждого варианта использовали по четыре листа индикаторного растения ВТМ-ТШ наносили на листья и обрабатывали препаратами FM-1 и FM-2.

В первом варианте первоначально на правой стороне листа *Nicotiana glutinosa*, а также листа *Nicotianatabacum* наносили препарат FM-1 и FM-2 по 100 мкл, после 5, 15, 30, 60 и 120 минут инфицировали вирусным гомогенатом ВТМ-ТШ 100 мкл.

Во втором варианте по всем листьям первоначально нанесли вирусный гомогенат ВТМ-

ТШ, затем половину каждого листа обрабатывали препаратами FM-1 и FM-2 через 5, 15, 30, 60 и 120 минут. Вторая половина листьев служила в качестве контроля.

Тестовые листья хранили в асептической влажной камере и через 48-72 ч у индикаторных растений появился специфический для ВТМ некроз коричневого цвета.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ.

Быстрое появление специфического вирусного некроза у *Nicotiana glutinosa* и *Nicotiana tabacum* и устойчивость ВТМ к внешнему воздействию при использовании с ВТМ позволяет использовать этот вирус для лабораторных исследований. Показана ответная реакция на ВТМ в искусственно инфицированных листьях *Nicotiana glutinosa*. Количество обнаруженных некрозов зависит от концентрации вирусов.

Таблица 1.

Влияние препарата FM-1 и FM-2 на инфицирование ВТМ-ТШ. Вариант первый.

Время, мин	<i>Nicotiana glutinosa</i>		<i>Nicotianatabacum</i>	
	Контроль	Опыт	Контроль	Опыт
FM-1				
5	15	13	34	26
15	40	36	16	12
30	36	34	20	14
60	46	32	94	86
120	90	78	34	26
FM-2				
5	49	34	72	60
15	33	28	89	65
30	46	35	56	43
60	52	43	71	62
120	93	85	86	78

В табл.1 приведены результаты экспериментов после обработки поверхности листьев FM-1 и FM-2, а также нанесения ВТМ-ТШ для разного периода времени. Как видно из таблицы, когда идет обработка препаратом, а затем заражение вирусом ВТМ-ТШ, препарат ингибирует определенное количество вирусной инфекции за 5 минут. Однако

интерференция не менялась со временем, а через три часа число некрозов уменьшалось на 20% по сравнению с контролем. Однако было показано, что FM-2 более активен, чем FM-1. Число некрозов *Nicotiana glutinosa* и *Nicotianatabacum* уменьшалось до 30% по сравнению с контролем.

Таблица 2

Влияние препарата FM-1 и FM-2 на инфицирование ВТМ-ТШ. Вариант второй.

Время, мин	<i>Nicotiana glutinosa</i>		<i>Nicotianatabacum</i>	
	Контроль	Опыт	Контроль	Опыт
FM-1				
5	23	12	52	33
15	46	29	66	47
30	29	11	89	41
60	25	15	79	35
120	45	28	82	56

FM-2				
5	39	16	43	18
15	57	38	84	43
30	44	31	38	27
60	53	38	75	54
120	65	43	86	63

В табл.2 приведены результаты экспериментов после нанесения на листья *Nicotiana glutinosa* и *Nicotiana tabacum* ВТМ-ТШ и обработки поверхности листьев FM-1 и FM-2 для разного периода времени. Показано, что препарат проникает в вирусную оболочку ВТМ-ТШ и истребляет инфекцию от 50% до 80%. В этом

варианте препарат FM-2 показал, что он более активен по сравнению с препаратом FM-1.

Таким образом препараты FM-1 и FM-2 показали свои высокие антивирусные свойства. Они способны снижать инфекцию ВТМ-ТШ на листьях *Nicotiana glutinosa* и *Nicotiana tabacum* от 50% до 80%.

Ташкентский государственный
аграрный университет

Поступила 22 мая 2019 года

Литература

- Хитин и хитозан: получение, свойства и применение /под ред. Скрябина К.Г., Вихоревой Г.А., Варламовой В.П. М.: Наука, 2002.- С.368.
- Мукатова М.Д., Боева Т.В. Биостимулятор повышения урожайности для сельскохозяйственных культур.-Рыбпром.- 2010.- № 3.- С.106-107.
- BadawyMohamed. Фунгицидные и инсектицидные свойства О-ацилированного хитозана. Polym. Bull.- 2005.- V.54.- № 4-5.- P.279-289.
- Душкин А., Метилеева А.В., Хомченко Е.С., Халилов О.И., Халилов М.С. Новый пестицидный препарат на основе комплексов тебуконазола и производных глициризина. //Успехи современного естествознания.- 2016.- № 11-2.- С.296-300.
- VahobovA.H. Virusologiyaasoslari// -Toshkent: Universitet, 2017. 289-297 б.
- ВахобовА.Х. Умумий вирусологиядан амалий машгулотлар. I-жилд// –Тошкент: Университет, 2004. – 36-37 б.
- Новикова И.И. Полифункциональные биопрепараты для защиты растений от болезней. /И.И.Новикова //Защита и карантин растений.- 2005.- № 2.- С.22-24.

Абдуллаев Ф.Т., Жамолова Л.Ю., Тураева Г.С., Умматова Х.С.

Аннотация

Мақолада хитозан ва унинг глициризин кислотаси билан комплекси асосида олинган янги препаратларнинг тамаки мозаикаси вируси инфекциясига қарши самарадорлиги устида олиб борилган изланишлар келтирилган. Хитозан ва унинг глициризин кислотаси билан комплекси асосида олинган препаратларни антивирусли хусусияти юқори самарадорликка эга эканлиги кўрсатилган.

Abdullaev F.T., Jamolova L.Yu., Turaeva G.S., Ummatova X.S.
Antiviral activity of chitosan and its complex with glycirrizinic acid in plants

In the article there are studies on the effectiveness of antioxidant anti-inflammatory drug derivatives from cytosan and its glycyrrhetic acid complex. Antiviral properties of cytosan and its glycyrrhetic acid complexes are shown to be highly effective.

Й.ХУРМАТОВ, Ш. ДЕҲҶОНОВА, Н. ЗАЙНОБИТДИНОВ, Ф.ТУРДИЕВА, Н.ЮСУПОВ.

ПИЁЗНИ ҚУРИТИШГА ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ ВА ПИЁЗ ҚУРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ушбу мақолада мева – сабзавотларни қуритишга тайёрлаш учун хом-ашёни навлаш, саралаш, бир ўлчамга келтириш (калибрлаш), ювиш, тозалаш, майдалашни замонавий жиҳозларда бажариш ва қуригичда намуналарни қуритиш тезлигини ошириш бўйича илмий тажрибалардан олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: цехлар, пиёз, фронтал, Афруз Камол Наби, фронтал, акционерлик.

Хозирги кунда озиқ-овқат саноатида қуритилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш борган сари кенг оммалашмоқда. Шу боисдан серқуёш Ўзбекистонда етиштирилаётган мева–сабзавот маҳсулотларини нес-нобут қилмасдан тезда йиғишириб олиш чора тадбирлари мухимаҳамиятга эгадир, сабаби мевалар кун иссиқ даврда пишиб етилди шуни инобатга олган ҳолда маҳсулотлар қайта ишлаш саноатига ва жумладан қуритиш цехларига юборилади шуни инобатга олган ҳолда хозирги кунда мамлакатимизда мева–сабзавотларни қуритишга катта эътибор қаратилмоқда ва шунинг натижасида кичик хажмга эга бўлган мини қуритиш цехлари жадал суратларда ривожланиб бормоқда ва меваларни тезда исроф қилмасдан интенсив қуритиш жараёнларни такомиллаштирилмоқда. Йиғишириб олинган пиёз транспортларда акционерлик жамиятининг пиёзни қабул қилиб олиб вақтинчалик саклаш омборига қабул қилиб олинади. Пиёз омбордан цехга чиқарилади. Пиёз цехда боши думи олиниб уни ювилади сўнгра пиёзни пўстидан арчиб машинага тўкилади. Тадқиқотлар Наманган шаҳрида жойлашган “Афруз Камол Наби” кичик корхонасида пиёзни қуритиш цехида ўтказилди.

Мавжуд ва таклиф этилган технологиялар бирхил шароитда киёсий синовдан (тажрибадан) ўтказилди. Тажриба ўтказиш пайтида мавжуд технологияда қуритиш агенти сифатида печнинг ичига вентилятор орқали атмосфера ҳавоси юборилади. Такомиллаштирилган технологияда қуритиш агенти сифатида печнинг ичига вентилятор орқали иситгичда исиган ҳаво юборилади.


Иккала технологиялардаги ҳавонинг температураси термометр ёрдамида,

электроэнергия сарфи эса электр ўлчагич ёрдамида ўлчаб борилди.

Пиёзниң қалинлигини ўзгаришини қуриш тезлигига таъсирини ўрганиш.

Тозаланган ва ювилган пиёз РИТМ машинасида майдаланади. Машинада пиёзни доирасимон, туртбурчак призмасимон (устун) ва кубик қилиб кесиш мумкин. РИТМ машинасида пиёзни доирасимон қилиб кесишда битта фронтал текисликда харакатланувчи пичноқдан фойдаланилади. Пиёзни призмасимон қилиб кесиш (бўлаклаш) да иккита фронтал ва горизонтал текисликларда харакатланувчи пичноқлардан фойдаланилади. Пиёзни кубик қилиб кесишда учта фронтал, горизонтал ва профил текисликларда харакатланувчи пичноқлардан фойдаланилади. Пиёзбоши хом ашёси қават-қават қисмлардан иборат бўлиб, улар бутун холатда бир бири билан ёпишган бўлади. Пиёзни кесиш (бўлаклаш) пайтида улар бир биридан ажралади. Пиёзни доирасимон қилиб кесганда бир биридан ажралиб айланасимон холга келиб қолади. Шунинг учун пиёзни қуритишга таъсир этувчи асосий параметр (ўлчам) пиёзни кесиш қалинлиги бўлиб ҳисобланади. Пиёзни сотиб олиб қуритишдан аввал “Афруз Камол Наби” хусусий корхонаси истеъмолчи корхона билан шартнома тузади. Истеъмолчи корхонанинг талабига кўра пиёзни доира, туртбурчак призмасимон ёки кубик қилиб кесиб қуритиб берилади. Истеъмолчи корхона кўп холатларда доирасимон қилиб кесиб қуритиб беришга буортма бераётганлиги муносабати билан биз ҳам тажрибаларимизни доирасимон қилиб кесилган пиёзниң асосий ўлчами бўлган кесиш қалинлигини пиёзниң қуриш тезлигига таъсирини ўрганишни мақсад қилиб олдик.

ПИЁЗНИ ҚУРИТИШГА ТАЙЁРЛАШ ВА ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ КЕТМА-КЕТЛИГИ



Пиёзнинг кесиш қалинлигини қуриш тезлигига ўтказилди ва олинган натижалар 1-жадвалда таъсирини ўрганиш учун тажриба тадқиқотлари келтирилган.

1- жадвал

Пиёзнинг кесиш қалинлигини қуриш тезлигига таъсири

Пиёзнинг кесиш қалинлиги, мм	Қайтаришлар сони	Куриш вакти, мин.
4,0	1	75,0
	2	80,0
	3	85,0
	Ўртача	80,0
6,0	1	85,0
	2	90,0
	3	95,0
	Ўртача	90,0
8,0	1	95,5
	2	100,0
	3	105,0
	Ўртача	100,0

Жадвалдан кўриниб турибдики, пиёзнинг кесиш қалинлиги 4,0 мм бўлганда биринчи қайтаришда 75,0 минутда, иккинчи қайтаришда 80,0 минутда, учинчи қайтаришда эса 85,0 минутда куриган бўлиб ўртача 80,0 минутда куриган. Пиёзнинг кесиш қалинлиги 6,0 мм бўлганда биринчи қайтаришда 85,0 минутда, иккинчи қайтаришда 90,0 минутда, учинчи қайтаришда эса 95,0 минутда куриган бўлиб ўртача 90,0 минутда

куриган. Пиёзнинг кесиш қалинлиги 8,0 мм бўлганда биринчи қайтаришда 95,0 минутда, иккинчи қайтаришда 100,0 минутда, учинчи қайтаришда эса 105 минутда куриган бўлиб ўртача 100,0 минутда куриган. Ўтказилган тажриба маълумотларига асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, пиёзни куритиш учун 4,0 мм қалинликда кесиш мақсадга мувофиқдир.

Тош ДАУ Андижон филиали

Қабул қилинган вақти 10 июн 2019 йил

Адабиётдар

1. Бўриев Х.Ч., РизаевР. Мева узум маҳсулотларни биокимёси ва технологияси. Т., «Мехнат», 2000.
2. Бўриев Х. Ч., ЖўраевР., АлимовО. Мева сабзавотларни саклаш ва дастлабки ишлов бериш. Т., «Мехнат», 2002.
3. Шаумаров Х.Б. Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини саклаш ва бирламчи қайта ишлаш технологияси. Тошкент, 2011.
4. Широков е.П., ПолегаевВ. Технология хранения и переработки продукции и растениеводства с основами стандартизации. М., Агропромиздат, 2000.

Й.Хурматов, Ш.Деконова, Н.Зайнобиддинов, Ф.Турдиева, Н.Юсупов Изучение процесса приготовления лука для сушки и улучшение сушки лука

В статье приведены сведения современных оборудований для первичной обработки фруктов и овощей перед сушкой как сортировка, отборка, калибровка, мойка, очистка, резка и результаты научных экспериментов по повышению скорости сушки образцов.

Y.Xurmatov, Sh.Dehqonova, N.Zaynabitdinov, F.Turdieva, N.Yusupov

Studying the process of preparing onions for drying and improving the drying of onions

The article contains information on modern equipment of a manufacturing enterprise for the initial processing of fruits and vegetables before drying assorting, selection, salibration, washing, cleaning, cutting and drying.

АНЖИР ПАРВОНАСИ (*LEPIDOPTERA CHOREUTIDAE*) НИНГ БИОЛОГИЯСИ

Мақолада Фарғона водийсида анжир парвонаси (*Choreutis nemorana Hb.*) нинг биологиясига оид маълумотлар келтирилган. Анжир парвонаси кенг тарқалган тур бўлиб, масумда 5 авлод бериб ривожланади, об-ҳаво қулай келган йилларда эса қисман 6- авлоди ҳам ривожланади. 2-4 авлод куртлари жиддий зарар келтиради. Анжир парвонаси куртлари монофаг зараркунанда бўлиб, факат анжир бутаси барглари ва мевалари билан озикланади. Куртлар ҳар бир пўст ташлашдан сўнг кейинги ёшга ўтади ва 5 ёшни ўтайди. Куртларнинг ривожланиши муддатлари ҳароратга боғлик ҳолда, баҳордан ёзга томон қисқариб, кузга томон эса узайиб боради.

Калит сўзлар: *монофаг, гумбак, тухум, қурт, анжир, парвона, авлод, озуқа ўсимлиги, ривожланиши, зарарланиши*.

КИРИШ

Хозирги кунда давлатимизда аҳолини экологик соғ озиқ овқат маҳсулотлари билан таъминлаш асосий вазифалардан биридир. Давлатимизда етиширилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ва мева-сабзавотчиликдан сифатли ҳосил олишда, худудлар иқлими, тупроқ шароитларидан келиб чиқкан ҳолда ўсимликларни тўғри жойлаштириш ва уларни индувидуал зараркунандалари биологиясини ўрганиш, зараркунандаларга қарши курашда биологик усуслардан фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш, қишлоқ хўжалиги ва боғдорчиликда юқори ҳосил олиш ва шу билан бирга экологик тоза маҳсулот олишда зарур вазифалардандир.

Шу ва бошқа масалаларга юртбошимиз Шавкат Мирмонович Мирзиёев томонларидан апалоҳида эътибор қаратилмоқда ва “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” нинг учинчи йўналишида дехқончилик ва мева сабзавотчиликда бажарилиши керак бўлган вазифалар аниқ белгилаб берилган. Фарғона вилояти республикамиз иқтисодиётида, шу жумладан боғдорчиликда энг муҳим ўрин тутувчи худудлардан биридир.

Анжир парвонаси – *Choreutis nemorana Hb.* ни ўрганишга оид тадқиқотлар 2013 йилдан эътиборан биз томонимиздан ўрганиб келинмоқда. Тадқиқотлар давомида Фарғона (Бағдод, Бувайда, Риштон, Фарғона туманлари), Наманган (Мингбулоқ, Тўракўғон туманлари) вилоятларидаги анжир боғлар ва алоҳида ўсган анжир ўсимликлари кузатилиб, материаллар йиғилди. Кузатиш ишлари давомида ўсимликларнинг тупроқ-иқлим шароитларига алоҳида эътибор қаратилди. Мавсумий ривожланиши мунтазам кузатиб борилди. Мақолада тадқиқотларнинг дастлабки натижаларидан маълумотлар келтирилган.

Choreutis nemorana Ўзбекистоннинг барча худудларида учраб, анжирга жиддий зарар етказади. Ўзбекистонда айникса, анжир нисбатан кўп

етишириладиган Фарғона водийси, Сурхондарё ва Тошкент вилоятларида кенг тарқалган [1; 2].

Анжир парвонасининг тарқалиши, озуқа ўсимлигининг оз ёки кўплиги, уни парвариша ҳолати, шунингдек, худуднинг иқлим шароити каби омилларга боғлик бўлади. Жумладан, анжир етиширишга ихтисослашган боғдорчилик хўжаликлари ва хонадонларда зараркунандаларга карши кимёвий ҳамда агротехник тадбирларни ўз вактида кўлланилиши натижасида, зарарланиш кўрсаткичи сезиларли бўлмайди. Лекин, йирик анжир буталари анжир парвонасининг доимий тарқалиш ўчоги хисобланади.

Анжир парвонасининг танаси юқоридан тўқ жигар ранг, остики томонидан оқиши тусга эга. Олдинги жуфт қанотлари қўнғир-жигар ранг бўлиб, хира доғлари бор. Орка жуфт қанотлари эса корамтири-қўнғир тусда бўлиб, иккита нуктачалари кўзга ташланиб туради. Қанотларининг четларида оқиши тукчали ҳошиялари бор. Қанотини ёзганда кенглиги 16-18 мм, баъзан 20 мм гача етиши мумкин. Мўйловлари узун - ипсизон, кўндаланг кора чизиклари мавжуд. Тухумлари 0,5 мм атрофида бўлиб, овал-ясси шаклда, оқиши-сариқ рангда. Куртларининг танаси сарғиш-яшил тусда, б қатор кора доғ кўринишидаги нукталар билан копланган, юқори қисми бўйлаб узун оқ ҳошияси бор. Бош қисми сариқ рангда ажралиб туради. Куртлари серҳаракат, айникса, катта ёшли куртларга таъсир кўрсатилса, тезда ипак толасига осилиб, пастга ўзини ташлайди. Катта ёшдаги куртларининг узунлиги 12-13 мм. Гумбаклари кизғиши-қўнғир тусда, узунлиги 11-12 мм, қорин қисмининг охирги икки бўғими бўйлаб бир жуфт чипор доғи бор.

Фарғона водийси шароитида анжир парвонасининг бир йилда 5 авлоди, об-ҳаво қулай келган йилларда эса қисман 6- авлоди ҳам ривожланади.

Анжир парвонаси капалаклари апрель ойининг биринчи ўн кунлиги охирида кунлик ҳаво ҳарорати ўртacha +13-14°C ни ташкил этиб, анжир бутаси

куртаклари бўртиб, барглар ёзила бошлаган вақтда ғумбаклардан учеб чиқа бошлайди (Фарғона, 07.04.2013 й.). Капалаклар асосан кечалари учеб атрофга тарқалади ва уларнинг учеб чиқиши 15-20 кун давом этади. Капалаклар тухумларини кечалари, анжир новдасининг куёш нури яхши тушадиган қисмидаги баргларининг остики томонига дона-дона ёки 10-15 тадан тўп қилиб қўяди. Парвона тухумлари ёзда куртаклар ораси ва барглар остида, ёз мавсуми иссиқ келган йилларда эса зич жойлашган барглар ости ҳамда новданинг танага яқин қисмидаги баргларда кўпроқ учрайди.

Анжир парвонаси ёзги авлодларининг тухумлари ранги дастлабки кунда оч-яшил, кейинчалик оқ ёки оқ-сариқ рангда кўрина

бошлайди. Баҳорги ва кузги авлод капалакларнинг тухумлари ривожланиши давомида асосан оқ-яшил рангда бўлиб, личинка чикишига яқинлашган сари уларнинг ранги оқариб боради. Куртлар баҳорда тухумларнинг жойлашган ўрни ва ҳароратга боғлик ҳолда 4-6 кун давомида ривожланади. Ёзги авлод тухумларининг ривожланиши 2-4 кунга, баҳорги ва кузги авлодларда 5-7 кунга тўғри келади.

Анжир парвонаси куртлари монофаг зааркунанда бўлиб, факат анжир бутаси барглари ва мевалари билан озиқланади. Куртлар хар бир пўст ташлашдан сўнг кейинги ёшга ўтади ва 5 ёшни ўтайди. Куртларнинг ривожланиш муддатлари ҳароратга боғлик ҳолда, баҳордан ёзга томон кисқариб, кузга томон эса узайиб боради (1-жадвал).

1-жадвал

Анжир парвонаси турли ёш қуртларининг мавсумий ривожланиш муддатлари

Ёши Мав- сум- лар	Ривожланиш муддати (кун)										Тўлиқ ривож- ланиш муддати	
	1	2	3	4	5	Муддати	Ўртча	Муддати	Ўртча	Муддати	Ўртча	
Баҳор	2-3	2,5	2-2,5	2,25	2,5-3	2,75	3-4	3,5	3-4	3,5	12,5- 16,5	14,5
Ёз	1-2	1,5	1-2	1,5	1,5- 2	1,75	1,5- 2,5	2	2-3	2,5	7- 11,5	9,2
Куз	2,5- 3,5	3	2-3	2,5	2,5- 3,5	3	3-4	3,5	3-4,5	3,75	13- 18,5	15,7

Масалан, баҳор мавсумида парвона куртлари 12,5-16,5 кунда, ёз мавсумида 7-11,5 кунда, кузда эса 13-18,5 кунда тўлиқ ривожланади.

Анжир парвонасининг биринчи ёшдаги куртлари тухумдан чиқсан пайтда оқ сариқ рангда бўлади, танасидаги доғлар ва туклар ёмон фарқланади. Тана бўғимлари ҳам кўзга ташланмайди. Улар барг томирларининг кўшилган сатҳида 2-3 тадан, баъзан 4-8 тагача бўлиб озиқланади. Ёз мавсумида ҳаво ҳарорати юқори даражага кўтарилиган кунларда новданинг танага яқин қисмидаги баргларда озиқланиши мумкин. Куртлар харакатининг сустлиги ҳамда барг эти тукчалари орасида харакатланиши қийинлиги боис кейинги ёшгача барг пластинкасининг маълум бир қисмидагина ҳаёт кечиради. Иккинчи ёш куртларнинг ранги дастлаб оч сариқ, учинчи ёшга ўтишдан олдин оч яшил рангга киради. Танасининг юқори томонидаги доғлар ва тукчалари кўзга ташланниб туради. Иккинчи ёш куртлар баргларда алоҳида ёки биринчи ёш куртлар билан бирга очик ҳолда озиқланади. Куртлар биринчига ёшдагига нисбатан бир оз харакатчан бўлиб, барг пластинкасининг турли қисмларида тарқалиб озиқланиши мумкин. Учинчи ёш куртлар

харакатчан бўлиб, бошқа баргларга ўтиб озиқлана олади. Уларга таъсир ўтказилганда танасини кескин қисқартириш, танасининг олдинги ва кейинги қисмларини атрофга тез тебратиш каби харакатларни содир этади. Учинчи ёшдан бошлаб куртларнинг озуқа жойи учун кураш олиб бориши кузатилади. Жумладан, уларга бошқа куртлар яқинлашса, танасини кескин тебратиш орқали таъсир кўрсатади. Парвона куртлари учинчи ёшдан бошлаб анжир мевасини тешиб кириб, мева эти билан ҳам озиқланади. Тўртинчи ёш куртларнинг кўкрак ва қорин оёқлари, бош капсуласи ҳамда танасининг юқори қисмидаги узун хошиясини оддий кўз билан кўриш мумкин. Бу ёшдаги куртлар фаол харакатланиб, атрофдаги баргларга ўтиб озиқланади. Тўртинчи ёшдан бошлаб куртлар ипак толаси ёрдамида анжир баргларининг четки қисмларини ўраб олиб ёки яқин жойлашган баргларни бир-бирига ёпишириб, орасида озиқланади. Бешинчи ёшга ўтган куртлар 3-4 кундан сўнг озиқланишдан тўхтайди ва ёпиширилган барглар орасида, барг томирлари кўлтиғига ҳамда мева ичида бўлса, унинг юзасига чиқиб ипак толасидан тўқилган оқ пилласи ичида ғумбакка айланиши бошлайди.

Анжир парвонаси авлодларининг ривожланиш муддатлари

Авлодлар	Ривожланиш муддати (кун)			
	Бошланиши	Тугалланиши	Тўлиқ ривожланиш муддати	Ўртacha \bar{x}
I	7.04 - 12.04	12.05 - 18.05	36 - 42	39
II	12.05 - 18.05	14.06 - 18.06	34 - 38	36
III	14.06 - 18.06	12.07 - 16.07	28 - 32	30
IV	12.07 - 16.07	11.08 - 15.08	30 - 34	32
V	11.08 - 15.08	13.09 - 17.09	34 - 38	36
VI	13.09 - 17.09	18.10 - 22.10	36 - 40	38

Анжир парвонасининг ривожланиш муддатлари мавсумга боғлик ҳолда баҳордан ёзга томон қисқариб, кузга томон узайиб боради (2-жадвал).

Зааркунанданинг биринчи авлоди 36-42 кунда тўлиқ ривожланади. Иккинчи авлодда бу кўрсаткич 34-38 кун, учинчи авлодда 28-32 кун, тўртинчи авлодда 30-34 кун, бешинчи авлодда 34-38, олтинчи авлодда 36-40 кунни ташкил этади.

Юкорида қайд этилган тадқиқот натижаларидан келиб чиқсан ҳолда, куйидаги хуласалар олинди:

- анжир парвонасининг популяция кенглиги ва зичлиги тупроқ-иқлим шароитига боғлик;
- қарши курашнинг асосий усули агротехник тадбирларни ўз вақтида ва тўғри ташкиллашни талаб қиласди;
- анжир парвонаси монофаг ҳашарот бўлиб, факатгина анжир ўсимлиги яшаш жойи ва озукаси хисбланади;
- ушбу ҳашаротлар ривожланишининг энг кулай шароити ёз ойларига тўғри келади.

Фарғона давлат университети

*Қабул қилинган вақти
10 май 2019 йил*

Адабиётлар

1. Акбутаев А.Н. Анжир заркунандаларига қарши кураш чоралари учун тавсиянома. – Тошкент, 1998. 12-б.
2. Мирзаева С.А. Разработка интегрированных систем защиты граната и инжира от вредителей //Автореф. дис. канд. биол. наук. – Ташкент, 2010. – С 22.
3. Моисеев В.А. Туркистоннинг ёввойи табиати. – Тошкет: Шарқ, 1996., – 21-б.
4. Оқбўтаев А.Н., Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 5-6-сон. 1998. 48-49-б.
5. Мирзаева Г.С. Экология бракона паразита вредных чешукрылых.: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. – Ташкент, 2008. – С 20.
6. Айрапетов А.Г. Вредители инжира Восточного Закавказья //Ж.Бюлл. по культурам сухих субтропиков. – 1940. - №6. – С. 76-84.
7. Аракелян А.О. Инжирная моле-листовертка и меры борьбы с ней в Армении //Изв. АН Арм. ССР: Биологические науки. – 1963, Т. 16. - №1. – С.95-102.
8. Яхантов В.В., Ўрта Осиё қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ҳамда маҳсулотларининг зараркунандалари ҳамда уларга қарши курашиш. . – Тошкент: Ўқитувчи, 1962., – 583-584-б.
9. Хўжаев Ш.Т., Холмуродов э.А. Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини химоя қилиш ва агротоксикология асослари. – Тошкент: Фан, 2009. 68-73-б.

М.Р. Шерматов, М.Б. Содикова
Биология *Lepidoptera choreutidae*

Статья посвящена биологическим особенностям инжирной моле-листовертки (*Choreutis nemorana* Hb.) в Ферганской долине. Установлено, что инжирная моле-листовертка широко распространенный вид, за сезон развивается в 5 поколениях, особенно в шестом поколении погода удобная. Наиболее вредоносным являются гусеницы 2-4 поколения. Гнезда грецкого ореха являются однофазным вредителем, но только едят листья и плоды смоковницы. Черви идут к следующему возрасту после каждого ядра и последние 5 лет. В зависимости от температуры червей продолжительность бородавок уменьшается с весны на лето и длится до осени.

M.R. Shermatov, M.B. Sodikova
Biology *Lepidoptera choreutidae* S

The article is devoted to the dissemination and biological peculiarities mole fig leaf (*Choreutis nemorana* Hb.) in the Fergana valley. It is established that the mole-leaf-roller fig widespread species for the season develops 5 generation, particularly in the sixth generation, the weather is comfortable. most malware is caterpillars 2-4 generations. The walnut worms are monophagus pest, but only eaten with leaves and fruits of the fig tree. The worms go to the next age after each kernel and last 5 years. Depending on the temperature of the worms, the duration of warts decreases from spring to summer and prolonged to autumn.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯ

УЎТ 631.6

Ч.В.ТОШПЎЛАТОВ М.А.ТЎХТАМИШЕВ

МАККАЖЎХОРИНИ СУГОРИШДА ПАРРАНДАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ ЧИҚИНДИ СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Маколада ўтлоқи ва бўз тупроқлар шароитларида паррандачилик корхоналари чиқинди сувларидан силос ва дон учун етиштирилаётган маккажўхорини суғоришда фойдаланиш бўйича амалга оширилган маҳсус тадқиқотлар натижалари, чиқинди сувларнинг ўсимлик хосилдорлигига, тупроқнинг санитария-гигиена ҳолатига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган. Ишлаб чиқаришга паррандачилик корхонлари чиқинди сувларидан маккажўхорини суғоришда самарали фойдаланишга оид тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: *паррандачилик чиқинди сувлари, чиқинди сувларининг маркиби ва сугории учун яроқлилиги, экинларни сугоришида чиқинди сувларидан фойдаланиши*

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси худудида шаклланаётган сув ресурслари атиги 11,53 км³/йил бўлиб, халқ хўжалигининг сувга бўлган умумий эҳтиёжи (56–60 км³/йил) нинг 20% ни ташкил этади. Республиkanинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда суғориладиган дехкончилик (4,3 млн. га) асосий ўринни эгаллади: ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 97% ушбу ерларда етиштирилмоқда [3].

Сўнги вактларда бутун жаҳон бўйича чучук сув ресурсларининг етишмаслиги инсоният учун энг муҳим муаммолардан бири бўлиб қолди. 2025–2030 йилларга бориб куррамиз аҳолисининг деярли ярмининг чучук сув етишмаслигидан мушкул аҳволга тушиши кутилмоқда [4]. А. Куртов таъкидлайдики, Ўзбекистон, айниқса Қорақалпоғистон Республикасида чучук сув етишмаслиги ижтимоий ва иқтисодий инқирозга сабаб бўлмоқда. Сув ресурслари бу ерларда нафақат қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун, балки майший-хўжалик эҳтиёжлари учун етишмаяпти [4].

Республикада ҳар бир жон ҳисобига тўғри келувчи суғориладиган ерлар майдони йилдан-йилга камайиб бормоқда, суғориш мақсадларида ишлатилаётган сув ресурслари эса ортиб бормоқда. Ўрта Осиёда минтақасида 2000 йилларга кадар кам сувли йиллар ҳар 6–8 йилда кузатилиб турган бўлса, ҳозирги вактда ҳар 3–4 йилда такрорланмоқда. Жуда қурғоқчил келган 2014 йилда республика халқ хўжалигининг сувга бўлган умумий эҳтиёжи 51 км³ даражасида таъминланди, қишлоқ хўжалигига

солиштирма сув сарфи эса 10,5 минг м³/га. ни ташкил этди [3]. Айниқса, 2018 йилда сув тақчиллигининг кескин кучайиши соҳада жуда мураккаб муаммоларни келтириб чиқарди.

Юқорида қайд этилганларни ҳисобга олган холда республикамизда мавжуд сув ресурсларидан юқори тежам ва самарада фойдаланиш, суғориладиган гектар маҳсулдор-лигини ошириш, сув ресурслари ва тупроқни ифлосланишдан муҳофаза қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27- ноябрдаги “2018–2019 йилларда ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича Давлат дастури тўғрисида”ги қарорида жорий йилда кенг кўламда ирригация-мелиорация тадбирлари, сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш ишларини амалга ошириш белгилаб қўйилган. Ушбу қарорда жорий йилда 63,4 минг га майдонда сув тежовчи технологиялар, шундан 15,0 минг га майдонда томчилатиб, 36,4 минг га майдонда кўчма эгилувчан қувурлар ва 12 минг га майдонда эса эгатга тўшалган пленкалар орқали суғориш технологияларини жорий қилиш режалаштирилган [1, 2].

Хозирги кунда сув ресурсларини ифлосланиш ва камайиб кетишидан муҳофаза қилиш масаласининг долзарблиги тобора ортиб бормоқда. Сув ресурсларини ифлосла-нишга олиб келувчи манбалардан бири бўлиб паррандачилик корхоналари хисобланади. Паррандачилик корхоналарида кўлланилиб келаётган чиқинди

сувларни механик ва биологик тозалаш иншоотлари улардан кониқарсиз фойдаланиш ва тозалаш бўйича технологик жараёнларнинг такомиллаштирилмаганилиги, уларнинг ортиқча юкламада ишлаши туфайли чиқинди сувлар таркибидаги ифлослантирувчи моддаларнинг атиги 50–60 % нигина тутиб колмоқда холос.

Республикани иқтисодий ва ижтимоий ривожлантишнинг хозирги босқичида долзарб муаммалардан бири бўлиб атроф мухитни, шу жумладан очик сув ҳавзаларини мухофаза килиш, уларга кундан-кунга хажми ортиб бораётган чиқинди сувларнинг заарли таъсирини олдини олиш мухим ҳисобланади. Паррандачилик корхоналарида шакланаётган чиқинди сувлари билан 10–12 минг га экинзорни суғориш имконияти мавжуд. Лекин, чиқинди сувлардан экинларни суғориша фойдаланиш масаласи хар бир жойнинг тупроқ ва гидрогеологик шароитларини ҳисобга олган ҳолда маҳсус ўрганиб чиқиши талаб этади [3].

УСЛУБЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Иzlаниш обьектлари бўлиб паррандачилик корхона-лари чиқинди сувлари ва улар билан турли тупроқ-гидрогеологик шароитларда суғори-лаётган силос ва дон учун етиштирилаётган маккажўхори ҳисобланди. Тадқиқот дастурида кўзда тутилган вазифалар маҳсус дала тажрибалари кўйиш, лабораториявий тадқиқотлар олиб бориш йўли билан ҳал этилди. Чиқинди сувларнинг суғориш учун яроқлилиги Буданов, Можейко и Воротник, АҚШ қишлоқ хўжалиги департаменти (SAR), Келли и Стеблер методлари бўйича аниқланди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Паррандачилик корхоналари чиқинди сувлари ўзига хос ҳидга (аксарият ҳолларда аммиакли) эга бўлиб, лойка рангли, кучсиз ишқорий ($pH=7,1-7,6$), мухитга эга. Ю.П. Лебедов классификацияси бўйича паррандачилик корхоналари чиқинди сувлари карбонатли-сульфатли, кальцийли-магнийли, айrim ҳолларда магнийли-кальцийли таркибга эга ҳамда 430–720 мг/л миқдорида йирик ва майда дисперс моддаларни ўзида тутади. Кимёвий сингдирилган кислороднинг нисбатан катталиги (480–850 мг O_2/l) чиқинди сувлар таркибida катта миқдорда органик моддалар мавжудлигини билдиради (сув ҳавзаларига ташлаш учун йўл кўйиладиган миқдори 30 мг O_2/l). Кислородга бўлган биокимёвий эҳтиёж 5- куни (BPK_5) 390–740 мг O_2/l атрофида қайд этилди (сув ҳавзаларига ташлаш учун йўл кўйиладиган миқдори 3 мг O_2/l), чиқинди сувларни катта миқдорда шаклланиш даврида эса 1,5–1,6 г O_2/l . ни ташкил этди. Азот тутишига кўра чиқинди сувлар юқори ўғитлаш қўйматига эга – 51 дан 87 мг/л, калий миқдори эса 10–32 мг/л атрофида қайд

етилди. Чиқинди сувларни умумий туз миқдори, хлоридлар, гидрокарбонатлар, биоген элементлар, заарли тузлар, мухит реакцияси (pH), анион-катион таркиби ва натрийнинг адсорбция коэффициентини (SAR) таҳлили кўрсатдик, бундай сувлар ўтлоқи ва бўз тупроқларда силос ва дон учун етиштирилаётган маккажўхорини дарё суви билан 1:1 ва 1:2 нисбатларда аралаштириб суғориш учун мутлақо яроқлидир.

Ўтказилган санитария-бактериологик тадқиқотлар кўрсатдик, чиқинди сувлар таркибida ичак таёқчаси титри 10^{-6} , 1 мл сув таркибida микробларнинг умумий сони $48,5 \times 10^6$ дан $61,6 \times 10^6$ гача донани ташкил этди. Чиқинди сувларни сунъий тозалаш иншоот-ларида тозаланганда ичак таёқчаси титри 10^{-4} ва 1 мл сувдаги микробларнинг умумий сони эса $40,9 \times 10^6$ донадан $52,0 \times 10$ донагача, колититр эса 0,0004 гача камайади.

Ўтлоқи ва бўз тупроқлар шароитларида суғориша чиқинди сувлардан ва уларни дарё сувлари билан аралаштириб ҳамда минерал ўғитлардан фойдаланиш маккажўхори-нинг силос, қуруқ барг-поя массаси ва дон ҳосилдорлигига ижобий таъсир этиши аниқ-ланди. Маккажўхорининг силос массаси дарё суви билан суғорилган вариантдаги 508,4–564,3 ц/га ўрнига 530,6–608,3 ва 564,2–641,1 ц/га. ни, дон ҳосили 68,6–74,6 ц/га ўрнига тегишлича 77,8–82,9 ва 80,6–86,4 ц/га. ни, қуруқ барг-поя массаси эса тегишлича 182,3–198,4 ц/га, 191,4–208,8 ва 204,1–225,3 ц/га. ни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикаси шароитида чиқинди сувлар билан суғорилган тупроқ-ларнинг шартли тоза ҳолатига 10–15- кунлари ўтиши кузатилди. Ўсимлик органларининг фавқулодда ифлосланиши ҳолатларида улар суғорищдан 10–15 кундан кейин шартли тоза ҳолатига ўтиши аниқланди.

ХУЛОСА, ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР

Кам харажат қилиш ва юқори самарага эришиш максадида очик сув ҳавзаларини ифлосланишдан мухофаза қилиш максадида парранда-чилик корхоналари чиқинди сувларини амалда кўлланилаётган тозалаш тизими ўрнига куйидаги тозалаш тизимидан фойдаланиш максадга мувофиқ ҳисобланади: канализация – механик тозалаш иншооти – сув саклаш ҳовузлари – суғориладиган далалар. Маккажўхорини суғорища паррандачилик корхоналари чиқинди сувлари ва дарё сувларини 1:1 нисбатда аралаштириб суғорища фойдаланиш ва минерал ўғитлар кўллаш ($N - 180$, $P_2O_5 - 100$, $K_2O - 90$ кг/га) энг макбул тадбир бўлиб ҳисобланади, қайсики бунда тупроқнинг ўз-ўзидан тўлиқ тозаланиши суғоришлардан кейин 15- куни амалга ошади.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти
18 май 2019 йиид

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7- февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947- сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2017 й., 6- сон, 70- модда.

2. «2018–2019 йилларда ирригацияни ривожлантириш ва сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича давлат Дастури тўғрисида». Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27- ноябрдаги қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2017 й.

3. Кимсанбаев Х.Х., Артукметов З.А. Некоторые вопросы рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве Республики Узбекистан / Х.Х. Кимсанбаев, // «Мировой опыт и передовые технологии эффективного использования водных ресурсов». Тезисы докладов Международной конференции (Ашхабад, 2–4 апреля 2010 г.). Ашхабад: Туркменское государственное издательство, 2010. – с. 237–241.

4. Куртов А. Водные ресурсы как причина конфликтов в Центральной Азии. Ж. Свободная мысль. М., 2013. №3 (1639) – стр. 63–73.

М.А.Тўхтамишев , Ч.В.Тошибулатов

Вопросы использования сточных вод от птице фабрик на орошение кукурузы

В статье приведены результаты специальных исследований по использованию сточных вод птицефабрик на орошение кукурузы, возделываемой на силос и зерна, проведенных на луговых и сероземных почвах Ташкентской области; освещены материалы по влиянию сточных вод на урожайность кукурузы, на санитарно-бактерио-логическое состояния почвы. Даны рекомендации по эффективному использованию сточных вод на орошение кукурузы.

M.A Tukhtamishev, CH.V.Toshpo`latov

Tasks of utilization of waste water of poultry industries for growing corn

In the article the data of special research results were highlighted on fulfilled to utilize watering of corn in order to grow for grain and silo by the poultry industries' waste water in the condition of virgin and pasture soil also impacts of sewage water on the productiveness of plants as well as sanitarness state of soil. Highly recommendations have been suggested to efficiently watering of corn by waste and sewage water of poultry industries as well as to production.

УДК: 631.6+631.4

Г.Н.АБДАЛОВА, С.Э.ГАНИЕВ, Ж.Э.ЭШОНҚУЛОВ

ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА “БУХОРО-102” ҒЎЗА НАВИДА СУҒОРИШ ВА ОЗИҚЛАНТИРИШ ТАРТИБЛАРИНИНГ ТУПРОҚНИНГ АГРО-ФИЗИК ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ

Бухоро-102 ғўза навидан юқори ҳосил олиш учун сувни ушлаб туриш ҳажми (ЧДНС) га нисбатан 60-60-65 % бўлганида ҳамда ўғитлаш нормаси 180:130:90 кг/гаектар берилганда юқори ва мўл ҳосил олишга эришилди. ўсув даври бошида кузатув соатлари (1-6) давомида сув ўтказувчанилиги тегишлича 264; 234; 114; 84; 48 ва 24 м³/га ни ташкил қилган ҳолда, 6 соатда эса 768 м³/га ни ташкил қилди.

Таянч сўзлар. С-6524. Бухоро-102 ўрта толали ғўза навлари ЧДНС га нисбатан 65-65-65%, 70-70-65% ва 75-75-65% сугорори режимлари

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Мамлакатимизда истиқболли-янги ғўза навларини етиштириш, жаҳон бозорида унинг рақобатбордошлигини ошириш-сифатли тола ишлаб чиқариш орқали ўзбек пахтасининг худудий ва жаҳон бозордаги ҳаридоргирлигини ошириш

устивор вазифалардан бири бўлиб, олиб борилаётган Вазирлар Маҳкамаси, Ҳукумат испоҳотларининг асосий йўналишлари соҳага истиқболли янги ўрта толали I, II, III, IV, V-тирга мансуб ўрта-ингичка толали навларини яратиш, уларни минтақалар, вилоятлар, туманлар қолаверса фермер-дехкон

хўжаликлари мисолида парваришилаш агротадбирлар тизими мажмуаларни ишлаб чиқиши, янгиларни олиб кириш-жойлаштириш жорий этиши орқали пахта толаси ишлаб чиқариш сифатини ошириш, таннархини камайтириш: энг асосийси ишлаб чиқарилаётган пахта толаси истиқболдаги вазифа этиб белгилангалиги шу куннинг муҳим вазифалигини кўрсатади.

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ

Ишнинг асосий мақсадидан келиб чиқиб қуйидаги изланишлар типик бўз тупроқлар шароитида гўзанинг районлаштирилган “С-6524” (андоза), “Бухоро-102” ўрта тола IV-V-типга мансуб гўза навларини терим олди кўчат қалинлиги сув-үғит (NPK) меъёр-нисбатлари ва суғориш тартиблари тизимларини ўрганишда тезпишарлиги турлича гўза навларини ўсиши ва ривожланиши, ҳосилдорлиги, пахта толаси, чигит майдорлиги кўрсатичларига юкорида тилга олинган омилларнинг таъсирини навлар бўйича ўрганиши ҳамда типик бўз тупроқлар шароитида ўрта толали навлар етиштирувчи ер эгалари-фермер хўжалиги раҳбар-ва мутахассисларига агротавсиялар тайёрлаш ва чоп этилган ҳолда етказишни таъминлашдан иборатдир.

Шундан келиб чиқиб суғориладиган тупроқларнинг агрофизиковий хоссаларини ўрганиш, ерларни агрономик баҳолаш ва зироатларни етиштиришнинг энг самарали усулларини ҳар бир тип-тур тупроқларда ишлаб

чикиш зарурияти шундаки, бу билан суғорма дехкончилигимизнинг маданиятини кўтариш ҳамда етиштирилаётган зироатлар ҳосилдорлигини оширишга катта имконият яратилади. Тажриба даласи тупроғининг агрофизиковий кўрсатичларидан ҳажм массаси ва солиширма оғирлиги, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги ва ЧДНС хусусиятлари йиллар бўйича олимлар томонидан ўрганилиб келинмоқда.

Шу билан биргаликда, ушбу унумдорликни белгиловчи тупроқ зичлиги ва донадорлиги, унинг сув-ҳаво, иссиқлик, озиқа режими тартиблари ва микробиологик фаолиятига ҳамда илдиз тизими ривожланишига таъсири кузатилди.

Бўз тупроқлар минтақаси, сахро-чўл минтақаси ҳамда янги ўзлаштирилган ерлар учун 1,1-1,3 г/см³ бўлишини ва учала минтақа учун зичликнинг критик бирлиги ўртача 1,53 г/см³ га tengligini aniklashgan.

Суғориш тартибларидан қатъий назар тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-65%, 70-70-65% ва 75-75-65% гача ортиб бориши билан тупроқни сув ўтказувчанлиги бирмунча пасайиши кузатилди. Амал-ўсув даври бошига нисбатан мавсум охирида барча варианtlарда тупроқ сув ўтказувчанлиги пасайиши кузатилди. Бу ҳажм массасини ортиши ҳайдов механизмларининг қатор ораларидан кўп марта ўтиши ҳамда мавсум давомида кўлланилган суғориш тартиблари ва меъёрлари билан изоҳланади.

1- жадвал

Тажриба даласи тупроғининг сув ўтказувчанлиги (амал ўсув даври бошида)

Кўрсаткич		Кузатув вақти, соат, м ³ /га						Жами 6 соатда м ³ /га	Ўртача 1 соатда м ³ /га
		1	2	3	4	5	6		
Тупроқнинг сув ўтказувчан лиги	2007 й	264	234	114	84	48	24	768	128,0
	2008 й	258	231	115	80	51	32	767	127,8
	2009 й	440	130	97	86	80	71	904	150,7
Амал ўсув даври охирида									
65-65-65	2007 й	198	150	96	72	36	18	570	95,0
	2008 й	189	148	89	62	37	21	546	91,0
	2009 й	401	128	86	75	60	52	802	133,7
70-70-65	2007 й	186	138	84	60	30	15	513	85,5
	2008 й	183	139	82	60	29	17	510	85,0
	2009 й	395	127	83	72	57	52	786	131,0
75-75-65	2007 й	174	132	78	54	24	12	474	79,0
	2008 й	170	132	77	52	23	11	465	77,5
	2009 й	382	122	76	66	54	47	747	124,5

Биз ўз тадқиқларимизда суғориш тартибларини тупроқнинг сув ўтказувчанлиги таъсирини аникладик (1-жадвал). 2007 йил шароитида амал ўсув даври бошида кузатув соатлари (1-6) давомида сув ўтказувчанлиги тегишлича 264; 234; 114; 84; 48 ва 24 м³/га ни ташкил қилган ҳолда, 6 соатда эса 768 м³/га ни ташкил қилди.

Амал-ўсув даври охирида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС дан 65-65-65% бўлган варианtlарда

юқоридаги кўрсаткичлар тегишлича 198; 150; 96; 72; 36; 18 м³/га ни ташкил этганлиги кузатилди.

Иzlанишларни кейинги 2008 йилда амал ўсув даври бошида кузатув соатлари (1-6) давомида сув ўтказувчанлиги тегишлича 258, 231, 115, 80, 51, 32 м³/га ни ташкил қилган ҳолда, 6 соатда эса 767 м³/га ни ташкил қилди

Амал-ўсув даври охирида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС дан 65-65-65% бўлган варианtlарда юқоридаги кўрсаткичлар тегишлича 189; 148; 89; 62;

37; 21 м³/гача ни, сугориш олди тупрок намлиги ЧДНС дан 70-70-65% бўлган варианtlарда юқоридаги кўрсаткичлар тегишлича 183; 139; 82; 60; 29; 17 м³/гача ни, сугориш олди тупрок намлиги ЧДНС дан 75-75-65% бўлган варианtlарда юқоридаги кўрсаткичлар тегишлича 170; 132; 77; 52; 23; 11 м³/гача ни ташкил этганлиги кузатилди ва энг мақбул сув ўтказувчаник тупрокни сугориш олди намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-65% бўлган

вариантларда, яъни энг кам сугориш ўтказилган варианtlарда кузатилди.

Хулоса қилиб айтганда, Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида пахта ҳосилдорлиги ва сугориш олди тупрок намлиги, сугориш тартиблари ва сув-ўғит (NPK) меъёrlари ҳар бир ўрганилган ғўза навлари учун турлича таъсири этганлиги кўп йиллик дала тажрибаларимизда кузатилди.

Тошкент давлат аграр университети

*Қабул қилинган вақти
25 апрель 2019 йил*

Адабиётлар

1. Авлиёқулов А.Э., Баталов А. Бухоро-6 нави парвариши // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали. Тошкент, 5-сон, 2003. Б. 11-12.
2. Авлиёқулов А.Э., Тожиев М. Ғўза навларини сугориш муддатлари, микдори ва мавсумий сув сарфининг пахта ҳосилига таъсири // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий аослари: Халқаро илмий-амалий конференция маъruzалари асосидаги мақолалар тўплами. 1.Т. –Тошкент, 2007. – Б. 244-248.
3. А.Э.Авлиёқулов, М. Хасанов, Т. Ражабов, М. Икромова. “Ғўзанинг ўрта толали “Бухоро-8” навини парваришлаш агротадбирлари. “Дехкончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий конференция маъruzалари тўплами. Тошкент, 2010. Б. 183-184.
4. Махсудов С.И. “Бухоро-102” ғўза навидан юкори ҳосил етиштириш агротехникаси // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий аослари: Халқаро илмий-амалий конференция маъruzалари асосидагимақолалар тўплами. 1.Т. –Тошкент, 2007. – Б. 359-361.

Г.Н.Абдалова, С.Е.Ганиев, Ж.С.Эшонқулов

Влияние ирригационных и кормовых процедур на изменение агрофизических свойств почвы у саженцев типа Бухара-102 в типичных сероземных почвах

Когда «Бухара-102» была на 60-60-65% выше, чем урожайность (ЧДНС), и скорость внесения удобрений была установлена на уровне 180: 130: 90 кг/га, были получены высокие урожаи. проницаемость воды в течение периода наблюдения (1-6) в начале периода роста, соответственно 264; 234; 114; 84; 48 и 24 м³/га соответственно, а через 6 часов - 768 м³/га.

G.N.Abdalova, S.E.Ganiev, J. E. Eshankulov Effect of irrigation and feeding procedures on change of agro-physical properties of soil in Bukhara-102 type of sapling under typical serozem soil

When Bukhara-102 was 60-60-65% higher than that of the (ChDNS) yield, and the fertilization rate was set at 180: 130: 90 kg / hectare, high yields were obtained. the permeability of the water during the watch period (1-6) at the beginning of the growth period, correspondingly 264; 234; 114; 84; 48 and 24 m³/ ha respectively, and in 6 hours - 768 m³ / ha.

УДК:635.6/637.3

АШИРОВ Ю.Р., ИСАЕВ С.Х.

ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ҒЎЗАНИ СУГОРИШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Ушбу мақолада Сирдарё вилоятининг кам ва ўртача шўрланган оч тусли бўз тупроқ шароитида ғўза навларини сугориш меъёrlарининг ғўзанинг ўсиши, ривожланишига ва пахта ҳосилдорлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: *Тупроқ шўрланниши, сизот сувлари сатҳи, тупроқ намлиги, сугории меъёri,*

мавсумий сугории, ёзга навларининг ўсиши, ривожланниши, пахта ҳосилдорилиги.

Бугунги кунда дунё бўйича 33 млн. гектар майдонда ёзга етиштирилиб, 25 млн. тоннадан зиёд пахта ҳосили олинмоқда. Бу экинларни сугориша кўп сув ва бир қанча агротехник тадбирлар талаб қилади. Мавжуд сувларнинг 2,0 фоизга яқини чучук сув ресурслари бўлиб, чучук сувларнинг 20 фоизи ер ости сувларига, 1 фоизи эса дарё ва кўлларга тўғри келади. Шу боисдан жаҳон миқёсда экинларни сугориша сув тежовчи технологияларни такомиллаштириш долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигидаги чучук сув тақчиллиги шароитида экинларни илмий асосланган ҳолда тупроқ унумдорлигини саклаш ва ошириб бориша 45 мамлакатда йилига 12 млн.тонна ноанъанавий агрорудалар қазиб олиниб, улардан халқ хўжалигининг тури соҳаларида, қишлоқ хўжалиги соҳасида кенг миқёсда фойдаланиб келинмоқда.

Жаҳон бўйича сугориладиган қишлоқ хўжалик ерларида тупроқлар шўрланишига қарши курашиш учун тезкор мониторинг олиб бориш технологияларни ишлаб чиқиши муҳим масалалардан ҳисобланади. Бугунги кунда дунё бўйича жами 1,5 миллиард гектар экин ерларида етиштириладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг 40%и жами экин майдонларининг фақат 20%ини ташкил қилган 300 миллион гектар сугориладиган ерларда етиштирилиб, унинг 30%-га яқин майдони табиий-антропоген омиллар сабабли тури даражада шўрланишга учраганлиги бутунжаҳон озиқ-овқат ташкилоти ФАО томонидан алоҳида таъкидланган [1].

Жаҳонда сугориладиган ерларнинг аксарият қисми қуруқ ва ярим қуруқ иқлим минтақаларида жойлашган бўлиб, Африка, Осиё, Австралия, Европа ва Лотин Америкасида тупроқлар шўрланишининг салбий таъсири сабабли унумдорлик ва экинлар ҳосилдорлигининг пасайиши 397 миллион гектар ерларда кузатилган. Тупроқлар шўрланишидан Австралияда 20% сугориладиган ерлар зарарланган бўлса, бу кўрсаткич Мисрда 30%, Эронда 50%, Хиндистан ва Покистонда 55%ни ташкил қилади. Шу жумладан, Орол ҳавзасига кирувчи Марказий Осиёда мавжуд сугориладиган ерларнинг ярмидан ортиги тури даражада шўрланганлиги минтақада кенг кўламли тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини кўрсатиб, Бутунжаҳон банки томонидан алоҳида ётироф этилган [2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 ноябрдаги ПҚ-3405-сон “2018-2019 йиллар даврида ирригацияни ривожлантириш ва сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш давлат дастури тўғрисида”ги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 2 февралдаги 74-сон “2018 йилда экин майдонларини

кафолатли сув билан таъминлаш ва сув танқислигини салбий оқибатларини олдини олишга қаратилган кечикириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги карорлари ва 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да хамда бошқа меъёрий ҳукуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда шўрланишга майил бўлган ерларда янги, истиқболли ва районлашган ёзга навларидан сифатли ва юқори ҳосил етиштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади [3].

Сугориладиган ерларда қишлоқ хўжалик экинларидан мўл ҳосил етиштирища шудгорлашнинг аҳамияти катта бўлиб, вактида сифатли даражада ўтказилган шудгор келгуси йил ҳосили учун пухта замин яратади. Сифатли шудгорланган майдонларда бегона ўтларни, зааркунанда ҳашаротлар, касалликларнинг камайиши кузатилиб, намлик яхши сақланади хамда эрта баҳорда тупроқни экишга тайёрлаш, экиш каби агротехника тадбирларни ўз вақтида ва самарали ўтказишида муҳим аҳамият қасб этади. Натижада ўрӯзликлар тўлиқ ундириб олиниди хамда ниҳоллар яхши ўсиб ривожланиб, мўл ҳосил тўплайди ва барвақт пишиб етилади, шунинг билан бирга тупроқ ҳажм масса 0,01–0,03 г/см³ камайиб, тупроқнинг ғоваклиги эса 0,4–1,2 фоизгача, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги эса 5,8–24,6 м³/га гача ортган [5,6,7,8].

Дала тажрибалари Пахта селекцияси, уруғчилигини етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтида қабул қилинган “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах” (ПСУЕАИТИ, 1963 й.), “Методика полевых опытов с хлопчатником” (ПСУЕАИТИ, 1981 й. ва Дала тажрибаларини ўтказиш, (Тошкент, 2007 й.) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди [4].

Сирдарё вилояти геоморфологик нуқтаи назардан тури даражада шўрланган, рельефдаги нотекислик тупроқнинг ҳар хил даражадаги шўрланишни келтириб чиқаради. Тупроқ грунтлари қатлами кўл-пролювиал ва кўл-лёссимон ётқизиклардан ташкил топган. Грунтлар кучсиз даражада дренажлашган. Худудда таркалган тупроқлар ўрта ва кучли даражада шўрланган. Сирдарёнинг I-II қайир усти террасаси баландлик ва пастликлар алмашинишидан иборат бўлган кенг тўлқинсимон рельефдан иборат. III- қайир усти террасаси тури қатлами кум, шағал, чағиртош, кумоқ ва лойлар билан тўшалган, қалинлиги 20-30 м. бўлган лёссимон кумоқлардан ташкил топган.

Тупроқ грунтлари зичлашмаган, сув ўтказувчанлиги яхши ва ҳар хил даражада шўрланган. Тупроқ грунтларининг дренажлашганлиги кониқарли, гидрогеологик шароитлари ўта мураккаб, бу мураккаблик худуднинг геоморфологик литологик тузилиши ва сунъий суғориш билан боғлиқ ерлардан фойдаланишининг сифати ва ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади. Ер ости сувларининг асосий манбалари бўлиб, турли катта-кичиклиқдаги суғориш тармоклари ва суғориладиган далалардан шимилиб кетаётган сувлар, шунингдек, Туркистон тоғ тизмаларидан оқиб тушаётган ер ости сувлари ҳисобланади, улар сизот сувлари балансида асосий ўринни эгалайди.

Тажриба Сирдарё вилояти Гулистон туманининг ПСУЕАИТИнинг Сирдарё тажриба станциясининг участкасида ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлар шароитида кучсиз ва ўртacha шўрланган далаларда экилган ғўза навларини парваришилаш эскидан суғорилиб, дехқончилик қилиб келинаётган минтақалардаги қўлланилаётган агротехник жараёнлар асосида амалга оширилди. Тупроқнинг ҳажм оғирлигини ўрганиш мақсадида 1 метргача ҳар 10 см қатламларда ўрганилди. 2012 йил амал даври бошида тахлиллар натижаларига кўра кучсиз шўрланган далада 0-30 см қатламда 1,25 г/см³, 0-50 см да-1,30 г/см³ ва 0-100 см да -1,37 г/см³ ни ташкил этган бўлса, амал даври охирига келиб, юқоридагиларга мос ҳолда 1,30; 1,33 ва 1,38 г/см³ ни ташкил этди ёки амал даври бошига нисбатан 0,01-0,05 г/см³ гача, ўртacha шўрланган далада 0-30 см қатламда 1,26 г/см³, 0-50 см да-1,31 г/см³ ва 0-100 см да-1,38 г/см³ ни ташкил этган бўлса, амал даври охирига келиб, юқоридагиларга мос ҳолда 1,31; 1,34 ва 1,39 г/см³ ни ташкил этди ёки амал даври бошига нисбатан 0,02-0,06 г/см³ гача, зичланганлиги кузатилди.

Кучсиз шўрланган далада тупроқнинг сув ўтказувчанлиги биринчи соатда 424 м³/га бўлган бўлса, кейинги соатларда 268; 205; 115; 81 ва 42 м³/га ни ташкил қилди ва 6 соатда 1135 м³/га ни, амал даври охирига келиб, бу кўрсаткич сезиларли даражада камайиб борди ва 935 м³/га ни, ўртacha шўрланган далада биринчи соатда 384 м³/га бўлган бўлса, кейинги соатларда 252; 192; 102; 72 ва 36 м³/га ни ташкил қилди ва 6 соатда 1038 м³/га ни, амал даври охирида 935 м³/га ни ташкил қилган бўлса, 2014 йил кучсиз шўрланган далада биринчи соатда 516 м³/га бўлган бўлса, кейинги соатларда 305; 224; 120; 90 ва 53 м³/га ни ташкил қилди ва 6 соатда 1308 м³/га ни, амал даври охирига келиб, бу кўрсаткич сезиларли даражада камайиб борди ва 1113 м³/га ни, ўртacha шўрланган далада биринчи соатда 501 м³/га бўлган бўлса, кейинги соатларда 297; 220; 116; 88 ва 51 м³/га ни ташкил қилди ва 6 соатда 1273 м³/га ни, амал даври охирида 1061 м³/га

ни ташкил қилганлиги аниқланди. Шундай қилиб, кузатув давомида мавсум охирига келиб, кучсиз шўрланган далада 1113 м³/га, ўртacha шўрланган далада 1061 м³/га ташкил қилди. С.В.Нестерев бўйича кузатилган майдонлардаги тупроқнинг сув ўтказувчанлиги кучсиз сув ўтказувчанлик хусусиятига эга бўлган тупроқлар синфига кириши қайд этилади. Умуман олганда, тажриба даласи тупроқларининг асосий илдиз кўп жойлашган қавати (0-50 см) ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига кулагай шароит бўлганлиги кузатилди.

Кучсиз шўрланган далада кузга келиб, хлор-иони миқдори 0,023 % ни ташкил этади ва тупроқни кучсиз шўрланган, умумий ишқор 0,015 фоизга, сульфат 0,557 фоиз, кальций 0,120 фоизни, магний 0,046 фоизни ва қуруқ қолдик 0,848 фоизни, ўртacha шўрланган далада юқоридагиларга мос ҳолда 0,031 фоизни ўртacha шўрланган, 0,016; 0,712; 0,166; 0,047 ва 1,077 фоизни ташкил этганлиги кузатилди ёки кузга келиб, кучсиз ва ўртacha шўрланган далаларда хлор-иони 0,01-0,02 фоизга, умумий ишқор 0,01-0,02 фоизга, сульфат 0,01-0,02 фоизга, кальций 0,01-0,02 фоизга, магний 0,01-0,02 фоизга ва қуруқ қолдик 0,01-0,02 фоизга ошганлиги аниқланди.

Шунингдек баҳор ойида кучсиз шўрланган далада сизот сувлари таркибидаги тузлар миқдори хлор-иони-1,48 г/л, умумий ишқор-0,32 г/л, сульфат-5,33 г/л, кальций-0,542 г/л, магний-0,489, натрий+калий 1,681 г/л ва қуруқ қолдик миқдори 11,75 г/л ни ташкил этган бўлса, ўртacha шўрланганда юқоридагиларга мос ҳолда 2,24; 0,51; 5,81; 0,684; 0,489; 2,243 ва 12,87 г/л ёки кучсиз шўрланган далага нисбатан ўртacha шўрланганда хлор-иони-0,76 г/л; умумий ишқор-0,19 г/л, сульфат-0,48 г/л, кальций-0,142 г/л, магний-0,045, натрий+калий 0,562 г/л ва қуруқ қолдик миқдори 1,12 г/л юқорилиги кузатилган бўлса, 2014 йилда кучсиз шўрланган далада сизот сувлари таркибидаги тузлар миқдори хлор-иони-1,49 г/л, умумий ишқор-0,33 г/л, сульфат-5,30 г/л, кальций-0,538 г/л, магний-0,449, натрий+калий 1,678 г/л ва қуруқ қолдик миқдори 11,71 г/л ни ташкил этган бўлса, ўртacha шўрланганда юқоридагиларга мос ҳолда 1,55; 0,38; 5,37; 0,556; 0,461; 1,694 ва 11,89 г/л ёки кучсиз шўрланган далага нисбатан ўртacha шўрланганда хлор-иони-0,05 г/л; умумий ишқор-0,06 г/л, сульфат-0,07 г/л, кальций-0,018 г/л, магний-0,012, натрий+калий 0,016 г/л ва қуруқ қолдик миқдори 0,18 г/л юқорилиги кузатилди.

Кучсиз шўрланган далада энг юқори кўрсаткич Бухоро-102 навида кўсаклар сони 11,7 дона, шундан очилгани 1,4 донани ташкил этди, Андижон-37 навида юқоридагиларга мос ҳолда 10,5 ва 3,8 дона, Наврӯз навида 9,7 ва 2,5 донани, энг паст кўрсаткич Парвоз навида 6,0 дона, шундан очилгани 2,0 донани ёки, Бухоро-102, Андижон-37 ва Наврӯз

навлариға нисбтан 4,5-5,7 донага кўсаклар ва 1,4-1,8 донага кам очилгани кузатилди.

Тупрок таркибидаги озиқа элементлари микдорини аниқлаш учун 0-30 см ва 30-50 см қатламларида намуналар олиниб аниқланди. Тупрок таркибидаги озиқа элементлари микдори амал даври бошида яъни баҳор пайтида олинган намуналарда 2012 йил гумус микдори 0-30 см қатламда 1,350 фоиз, 30-50 см да 0,635 фоизни, азот-0,105; 0,084 фоизни, фосфор-0,265; 0,243 фоизни ташкил этган бўлса, нитратли азот 12,4; 3,7 мг/кг, харакатчан фосфор-38,8; 20,9 мг/кг ташкил этган. 2013 йил гумус микдори 0-30 см қатламда 0,761 фоиз, 30-50 см да 0,686 фоизни, азот-0,070; 0,061 фоизни, фосфор-0,117; 0,098 фоизни ташкил этган бўлса, нитратли азот 2,69; 1,77 мг/кг, харакатчан фосфор-10,3; 7,4 мг/кг ташкил этганлиги кузатилди.

2012 йил кучсиз шўрланган далада сугориши олдидан тупроқ намлигини дала нам сигимига нисбатан 70-70-60 фоиз тартибида саклаб туриш учун ғўзани амал даврида 2 маротаба сугориши талаб этилди. Ҳар сугоришида гектарига 967-1094 кубометр сув сарф этилди. Мавсумий сугориши меъёри эса 2061 м³/га ни ташкил этган бўлса ўртача шўрланган тупроқ намлигини ЧДНСга нисбатан 70-70-60 фоиз тартибида ғўзани амал даврида 2 маротаба сугоришида 1128-1024 м³/га, мавсум давомида эса 2152 м³/га сув сарфланди.

2013 йилда кучсиз шўрланган далада ғўза навлари ўртача бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича энг юқори кўрсаткич районлашган Бухоро-8 навида 7,4 граммни, Бухоро-102, Бархаёт, Парвоз, Андижон-37 ва Султон навлари 6,1-7,2 граммни ташкил этган, энг паст кўрсаткични янги ЎзПИТИ-201 навида 5,0 граммни ёки Бухоро-8 навига нисбатан 2,4 грамм паст бўлганлиги кузатилди. Ўртача шўрланган далада ғўза навлари ўртача бир

дона кўсакдаги пахта вазни бўйича энг юқори кўрсаткич районлашган Бухоро-102 навида 5,6 граммни, ЎзПИТИ-2601, Парвоз ва С-6524 навлари 4,7 граммни ташкил этган, энг паст кўрсаткични янги ЎзПИТИ-201 навида 3,8 граммни ёки Бухоро-102 навига нисбатан 1,8 грамм пастлиги аниқланди.

Ғўза навларини шўрланишга, сувсизликка чидамлилигини аниқлашда ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлар шароитида кучсиз шўрланган далада тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60% сугориши тартибида қўл рефрактометр орқали аниқлаб, 2 маротаба сугоришида 1012-1125 м³/га, мавсум давомида 2137 м³/га сув сарф этилганда энг юқори пахта ҳосилдорлиги Бухоро-102 навида 32,6 ц/га, Бухоро-8 навида-31,4 ц/га, Парвоз навида-30,3 ц/га ни ташкил этиб, андоза (Ан-боёвут-2) навига нисбатан Бухоро-102 навидан 6,5 ц/га, Бухоро-8 навидан 5,3 ц/га ва Парвоз навидан 4,2 ц/га, ўртача шўрланган далада тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60% сугориши тартибида 2 маротаба сугоришида 1125-1215 м³/га, мавсум давомида 22340 м³/га сув сарф этилганда Бухоро-102 навида 12,1 ц/га, Бухоро-8 навида-10,3 ц/га, С-6524 навида-10,6 ц/га пахта ҳосили териб олинди ёки андоза (Ан-боёвут-2) навига нисбатан Бухоро-102 навидан 2,8 ц/га, Бухоро-8 навидан 1,0 ц/га ва С-6524 навидан 1,3 ц/га кўшимча пахта ҳосил олишга эришилди.

ХУЛОСА

Сирдарё вилоятининг сугориладиган оч тусли бўз гидроморф тупроқларининг шўрланишга мойил бўлган ерларда ғўза навларини ЧДНСга нисбатан тупроқ намлиги 70-70-70 % сақланган холда гектарига N-200; P-140; K-100 кг/га маъдан ўғитлар билан 1210-2340 м³/га мавсумий сугориши меъёрлари билан сугориши тавсия этилади.

Қабул қилинган вақти
18 май 2019 йил

Адабиётлар

1. FAO of the United Nations and Earthscan, Rome, 2012. Water and Cereals in Drylands.
2. The World Bank, February 2003. Irrigation in Central Asia Social, Economic and Environmental Considerations.
- 3.“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида”- //Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2017 й. 6-сон, Ўзбекистон овози газетаси.
4. Методы агрофизических исследований. Ташкент. 1973, 237-б.
5. Ҳайдаров А., Маҳмудов О., Ҳасанова Ф., Қирғизбоев К. -//“Ғўза агротехникасида тупроққа ишлов беришнинг янги усули.”Агро илм журнали. 2009 й. №3 10-11 б.
6. Исаев С.Х., Ҳайдаров Б.А. Андижон-36 ғўза навини сугориши тартибларининг пахта ҳосилдорлигига таъсири. //Ирригация ва мелиорация журнали. Тошкент, 2018 йил №1(11). – Б.9-13.
7. Isaev S.Kh, Khaydarov B.A. Economic efficacy of irrigation technology for cultivation of cotton-planet varieties with mineralized water in condition of water deficiency // International journal of science and research (IJSR), India. 2018, -Vol. 7, Issue 11, November. -P 1870-1871. (№23, SJIF, IF=7,296).
8. Sommer R, Glazirina M., Yuldashev T., Otarov A., Ibraeva M., Martynova L., Bekenov M., Kholov B., Ibragimov N., Kobilov R., Karaev S., Sultonov M., Khasanova F., Esanbekov M., Mavlyanov D., Isaev S.,

Abdurahimov S., Ikramov R., Shezdyukova L., Pauw de E.-Impact of climate change on wheat productivity in Central Asia, //Agronomy Journal. The USA American Society of Agronomy., America. 2013-year. p. 78-99.

Аширов Ю.Р., Исаев С.Х.

Влияние орошения на урожайность хлопчатника в условиях светлых сероземных почв

В статье приведены результаты полевых исследований, проведенных на слабых и малозаселенных почвах Сырдарьинской области по поливу культивируемых разных сортов хлопчатника фиксированными поливными нормами и влияние их на рост, развитие и урожайность.

Ashirov Yu.R., Isaev S.H.

Cotton influence of the drink in the mountain color effectiveness

To the article the results of the field researches, conducted on weak and in littlesalt soils of the Syr-darya area on watering of the cultivated different sorts of cotton plant by the fixed watering norms and influence of them on a height, development and productivity, are driven.

УЎТ: 631.4:633.51:631.51

С.ГАНИЕВ, Д.БОҚИЕВ

**ТУРЛИ ДАРАЖАДА ШЎРЛАНГАН БЎЗ-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАРДА ФЎЗАНИ
ОЗИҚЛАНТИРИШ ШАРОИТЛАРИНИ ПАХТА ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ**

Мақолада турли даражада шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлар унумдорлигини ошириш ва шўрланишни салбий оқибатларини камайтиришда минерал ўғитлар ҳамда уларни гўнг, сидератлар фонидаги таъсири тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Аникланнишича, кучсиз ва ўртача шўрланган ерларда пахтадан юқори ва сифатли ҳосил етиширишда гектарига ўғитларни тегишлича $N_{200}P_{140}K_{120}$ ва $N_{240}P_{168}K_{120}$ кг/га ҳисобида 10 ва 20 т/га гўнг ва сидератлар фонида кўллаш, юқори иқтисодий самара бериши ҳамда шўрланишни камайтириб, тупроқни экологик ҳолатини ёмонлашишига йўл кўймаслиги тадқиқот натижалари асосида аникланган.

Калит сўзлар: *шўрланган, бўз-ўтлоқи тупроқ, гўза, АН-Боёвим-2, ўсиш, ривожланиш, ўғитлар гўнг, пахта ҳосили.*

КИРИШ

Бирлашган миллатлар ташкилотининг (БМТ) Халқаро озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) маълумотларига кўра, бугунги кунда дунё бўйича шўрланган экин майдонлари ер шари қуруклигининг 25 фоизини ташкил этади. Дунё мамлакатлари орасида энг кўп шўрланган тупроқлар Аргентинада-30,5 минг, АҚШда-5,9, Мирда-7,7, Болгарияда-3,0, Венгрияда-1,2 минг гектар ва бошقا қурғоқчил арид минтақаси давлатларида кенг тарқалган [8,9]. Ўзбекистон Республикасида хозирги пайтдаги умумий сугориладиган майдони 4 млн. 300 минг гектарни ташкил этса, шундан йиллар бўйича 45-48 % турли даражада, шундан 1.080 млн/га ўртача ва кучли даражада шўрланган ва 244 минг гектар сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати қониқарсиз ахволда эканлиги аникланган [1,4]

Шўрланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида ўтказиладиган шўр ювишлар таъсирида тупроқ таркибидаги заарарли тузлар билан биргаликда кўплаб озиқа элементлари ҳам ювилиб кетиши аникланган. Турли тупроқ-иклим

шароитларида тупроқларни шўрини ювиш натижасида тупроқ таркибидаги нитратли азотнинг 50-70 %, харакатчан фосфорнинг 10-20 ва алмашинувчан калийнинг 20-30 % гача камайиши аникланган. Шунингдек, тупроқ таркибидаги фойдали микроорганизмлар сони ҳам кескин камайган. Шу боис, ювилган озиқа моддаларни тиклаш учун шўри ювилган ерларга азотли ўғитлар мөъёрини 30 %, фосфорли ўғитлар мөъёрини 10-15, калийли ўғитлар мөъёрини 15-20 %га ошириш ва ҳар йили 15-20 т/га гўнг кўллаш тавсия қилинган [5].

Жиззах вилоятининг Мирзачўл туманидаги сугориладиган ерларини 97,5 %дан кўпроғи турли даражада шўрланган. Ўзбекистон Республикаси ер кадастри маълумотларига кўра, вилоятда кучсиз шўрланган майдонлар 84829.31га ёки 40,2 % ўртача шўрланган 68436,53 ёки 32,4 % кучли шўрланган ва жуда кучли шўрланган ерлар 7900, гектарни ёки 3,7 %ни ташкил қиласди. Тупроқнинг шўрланиши унинг шўрланиш даражаси, тузлар химизми, тузли горизонтнинг жойлашиш чуқурлиги ва ер ости

сувининг чуқурлиги билан фарқланади. Маълумотларга қараганда, ушбу майдонларнинг 50 %дан кўп қисмида сизот сувлари 1,5-2 метрдан юқорини ташкил этади ва улар турли даражада минераллашган. Бундай ерларда пахта ҳосили 15-20, ўртача шўрланганда 30-40, кучли шўрланган ерларда 60-80 фоизга яқин камайса, кузги буғдой ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари ҳосили эса 30-40 фоизга камайиб кетмоқда [7].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Жиззах вилоятининг шўрланган ерларини мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, сизот сувларини кўтарилишига йўл қўймаслик ҳамда манба тежовчи технологияларни ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш, республикамизда пахтачиликни янада ривожлантиришда долзарб масала ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Кўрсатиб ўтилган муаммоларнинг очимини топиши мақсадида бизлар, 2016-2018 йилларда Жиззах вилояти Мирзачўл туманининг, “Бахмал АГРО” фермер хўжалигининг кўчсиз ва ўртача шўрланган далаларида минерал ва маҳаллий ўғитларнинг ғўза ҳосилига ва тупроқларнинг шўрланишига таъсирини ўрганиш мақсадида дала тажрибалари ўтказилди.

Тажриба даласи тупроқлари бўз-ўтлоқи тупроқлар бўлиб, бу тупроқлар дарё ёйилмаларининг Марказий Мирзачўл тоғ олди текисликларига туташган худудларида тарқалган. Тупроқ ҳосил қилувчи она жинслар делювиал-пролювиал генезисдаги лёссимон кумоқлар ва лёсслардан иборат. Механик таркибига кўра, тупроқлар оғир ва ўрта кумоқли, агроирригацион қатламдан пастда енгил кумоқ қатламлар мавжуд.

Турли даражада минераллашган ғрунт сувларининг ер юзасига (1,5-2,0 м) яқин жойлашиши шўрланиш жараёнларини тезлаштиради, оқибатда тупроқ ғрунтларини шўрланишига олиб келади. Шўрланиш даражасига кўра, тупроқлар кучсиз, ўртача ва кучли шўрланган бўлиб, шўрланиш типи хлорид-сульфатли ва сульфат-хлоридли. Тупроқларнинг ҳайдалма (0-30 см) қатламида гумус миқдори 0,96-1,18 %, ялпи азот 0,092-0,121, фосфор 0,186-0,214 ва калий 1,98-2,35 %, уларнинг харакатчан шакллари тегишлича, нитратли азот 11,5-16,3, харакатчан фосфор 18,7-21,5 ва алмашинувчан калий 276-318 мг/кг тупроқда мавжудлиги аниқланган. Зараарли тузлар миқдори тупроқни 0-100 см қатламида куруқ қолдиқ миқдори 0,229, хлор иони 0,015, сульфат 0,118 %ни, ўртача шўрланган тупроқларда юқоридагилар мувофиқ ҳолда 0,257; 0,017; 0,191 %ни ташкил этди.

Дала тажрибаларида азотни 160, 200, 240; фосфорни 112, 140, 168 ва калийни 80, 100, 120 кг/га, гўнгни 10,20 т/га ва оралиқ экинлардан (сидерат учун) рапс, перко ўрганилди. Тажриба

даласига ғўзанинг “АН-Боёвиг” нави экилди. Тажриба 4 қайтарида ўтказилиб, ҳар бир пайкалчанинг умумий майдони 480 м², шундан ҳисобга олингани 240 м² бўлиб, вариантлар схематик равиша бир яруса жойлаштирилди. Тажриба даласидаги ғўзада ўтказилган барча фенологик кузатувлар ва биометрик ўлчашлар ҳамда агротехнологик тадбирлар ПСУЕА ИТИ (собиқ УЗ ПИТИ) услубий кўрсатмаси асосида ўтказилиб [2,6], олинган натижалар Б.А.Доспеховнинг [3] кўлланмаси асосида вариацион-статистик тахлил килинди.

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Бугунги кунда, республикамиз пахтачилигининг энг долзарб масалаларидан бири, бу-сугорилиб дехқончилик қилинадиган экин майдонларининг 45,6-47,2 %ни шўрланганлигидир. Фақатгина шўрланиш ҳисобига териб олинмайдиган пахта салмоғи 250-300 минг тоннани ташкил этади. Собиқ УЗПИТИ (хозирда ПСУЕА ИТИ) олимлари маълумотларига қараганда, шўрланмаган ерларда етиштирилган пахта ҳосилига нисбатан, кучсиз шўрланган ерларда ҳосилдорлик 15-20, ўртача шўрланган ерларда 30-35, кучли шўрланганда эса 70-80 %га камаяр экан [5].

Шунинг учун ҳам, тадқиқотлармиз мақсади қилиб, Мирзачўлнинг турли даражада шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитидаги ушбу тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сизот сувлари сатхини кўтарилишига йўл қўймаслик, шўрланишни олдини олиш, шўрланган тупроқлар унумдорлигини ошириш, пахта етиштириш самарадорлигини юксалтирища минерал ва маҳаллий ўғитлар (гўнг, сидератлар) нинг таъсирини аниқлаш олинди.

Мирзачўл туманининг турли даражада шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида олиб борган тадқиқотларимиз натижаларини кўрсатишича, тажриба даласи тупроқлари таркибидаги зарарли тузлар ва қаттиқ қолдиқ миқдорининг дастлабки кўрсаткичлари бўйича, минерал ўғитлар кўлланилган вариантлар ўртасида сезиларли фарқ кузатилмаган бўлса, минерал ўғитлар, 10,20 т/га гўнг ва сидератлар (рапс+перко) фонида қўлланилган вариантларда бу фарқ кўрсаткичлари аникроқ намоён бўлди. Тажрибалар ўтказилган йиллар бўйича бўз-ўтлоқи тупроқларни қаттиқ қолдиқ ва хлор билан мавсумий шўрланиш коэффициенти ўзгариб турди. Ушбу ҳолатни, тадқиқот ўтказилган йилларда иқлим шароитини турлича бўлганлиги, сугориш тармоқларининг хилма-хиллиги ва бошқа омиллар таъсирида деб изохлаш мумкин.

Аммо, дала тажрибалари ўтказилган йиллар бўйича бўз-ўтлоқи тупроқларнинг мавсумий шўрланиш коэффициенти ўғитлар N200 P140 R100;

N240 P168 K120 кг/га меъёрлари 10-20 т/га гўнг ва сидератлар (рапс+перко) фонида қўлланилган варианларда кам, яъни тупрокларда заарли тузлар миқдорини камайганлиги ҳисобга олинди.

Сизот сувлари юза жойлашган, турли даражада шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида ғўза ниҳолларининг қулай ўсиши, ривожланиши ҳамда юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириша, минерал (NPK) ва маҳаллий (гўнг, сидерат) ўғитларнинг мақбул меъёрларини аниқлаш, уларни ерга солишнинг миқдори ва муддатларини тўғри белгилаш ҳамда бошқариш, шўрланган ерларда пахта етиштириш агротехникасининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Тажрибаларимизда, ғўза майдонларининг кучсиз ва ўртача шўрланган далаларида минерал ўғитларни алоҳида ёки уларни гўнг, сидератлар фонида қўллаш натижасида, ғўза томонидан озиқ элементларини ўзлаштирилиши ҳам турлича бўлди. Масалан, кучсиз шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида ўстирилган ғўза томонидан, унинг барча ривожланиш даврларida NPK ни қўплаб ўзлаштирганлиги аниқланган бўлса, ўртача шўрланган тупрокларда бунинг акси кузатилди. Шунинг учун, ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида ғўзани озиқлантириша, уларнинг меъёрини оширилиши ёки уларни 10,20 т/га гўнг ва сидератлар фонида қўллаш, ўсимлик таркибида NPK миқдорини кўп бўлишини таъминланди. Дала тажрибаларимизда кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида етиштирилган ғўза томонидан озиқ моддаларни мақбул кўрсаткичларида ўзлаштириш, минерал ўғитлар N200 P140 K100, N240 P168 K120 кг/га меъёрида 10-20 т/га гўнг ва сидератлар фонида қўлланилган варианларда ҳисобга олинди.

Тажриба даласининг тупроғи кучсиз ва ўртача шўрланган майдонларининг ўғит қўлланилмаган-назорат пайкарчаларида энг кам, гектарига мос равишида 15,3 ва 13,6 ц/га пахта ҳосили олинди. Шунинг ўзи, шўрланган тупрокларнинг унумдорлиги жуда паст эканлигини кўрсатади. Кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида ўғитлар N160 P112 K80 кг/га меъёрида қўлланилганда, ҳар бир гектар ҳисобига тегишлича 23,5 ва 19,2 центнер пахта ҳосили етиштириши таъминланди. Қўлланилган азот меъёрининг ортиши билан, етиштирилган пахта салмоғи ҳам ортди.

Аммо, пахта ҳосилининг янада ортиши минерал ўғитлар, айниқса, азот меъёрининг ортишига ва уларни гўнг, сидератлар фонида биргалиқда ишлатишига кўпроқ боғлиқ бўлди. Кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупрокларда ўғитлар N200 P140 K100 кг/га меъёрида қўлланилганда ҳосилдорлик тегишлича 26,7 ва 23,4 центнерни ташкил этган бўлса, кўрсатиб ўтилган минерал ўғитлар 10-20 т/га гўнг ва сидератлар фонида қўлланилганда эса, пахта ҳосилдорлиги мутоносиб равишида 29,6 ва 24,3 центнерга тўғри келди. Минерал ўғитлар месёри ошириб борилганда, айниқса, улар гўнг ёки сидератлар фонида қўлланилганда пахта ҳосили салмоғини ортишига ижобий таъсир кўрсатиши айникланди. Бунда, кучсиз шўрланган бўз-ўтлоқи тупрокларда N200 P140 K100 кг/га, ўртача шўрланган майдонларда N240 P168 K120 кг/га меъёрида 10-20 т/га гўнг ёки сидератлар (рапс, перко) фонида қўллаганда, ғўзанинг қулай ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосил тўплашида энг мақбул шароит яратилиб N200 P140 K100 кг/га қўлланилган майдонларга нисбатан, гектарига ўртача 5,7-6,3 центнер қўшимча пахта ҳосили етиштириши таъминланганлиги аниқланди.

ХУЛОСАЛАР

1. Сизот сувлари юза жойлашган, кучсиз ва ўртача даражада шўрланган бўз-ўтлоқи тупрокларнинг ноқуладай сув-физик ва агрокимёвий ҳоссаларига қарамасдан, минерал ўғитларни (NPK) айниқса, уларни гўнг ёки сидератлар фонида қўллаш, бундай шароитда етиштирилаётган ғўза ҳосилдорлигини ва тола сифатини юқори бўлишини таъминлаб, кучсиз ва ўртача шўрланган ерларда ҳам, шўрланмаган ерлардаги каби мўл ва сифатли пахта ҳосили етиштириш имкониятлари мавжудлигини кўрсади.

2. Кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупроклар шароитида ғўздан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштирида, минерал ўғитларни тегишлича N₂₀₀ P₁₄₀ K₁₀₀; N₂₄₀ P₁₆₈ K₁₂₀ кг/га меъёrlарида 10,20 т/га гўнг ва сидератлар фонида қўллаш, ушбу шароитда юқори иктисодий самара бериш ҳамда сизот сувлари сатҳини ва шўрланиши пасайтириб, сув ҳавзаларини ва тупрокни экологик ҳолатини ифлосланишига йўл қўймаслиги тадқиқот натижалари асосида аниқланди.

Қабул қилинган вақти
10 май 2019 йил

Адабиётлар

1. Ахмедов И., Мирҳосилова З., Ер шўрланиши ва унумдорлигини пасайиш омиллари // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 2013.-№10. Б. 31.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-Т., ЎзПТИ, 2007. 145 б.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М., Агропромиздат, 1985.-350 с.
4. Норкулов У. Сирдарё вилояти шўрланган ерларида сизот сувлари кимёвий таркибининг ўзгариши // Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини.-Тошкент, 2018.-№4 (8). -Б. 34-35.

5. Мирзажанов К., Исаев С. Ерларнинг мелиоратив ҳолати нималарга боғлиқ ? // Агро илм.-Тошкент, 2014.-№4 (32),-Б. 60-62.
6. Методы агрофизических агрохимических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах.-Тошкент, УзНИИХ, 1963.-460с.
7. Сатторов Ж., Атаев Б. Туздан ювилган тупроқларнинг ҳолатини ўрганиш, уларнинг унумдорлигини тиклаш ва ошириш агротехнологиясини яратиш // Халқаро илмий тех. конф. тўп.-Тошкент, 2018.-Б. 73.
8. Шакиров Н. Суфориладиган ерлар ва яйловларнинг таназзулга учрашини олдини чоралари // Респуб. илмий амалий семинар маъruz.тўп.-Тошкент,2016.-Б. 23-25.
9. <http://www.worldfoods situation.ru>.

С.Ганиев, Д.Бокиев

Влияние условия питания на урожайность хлопчатника на различной степени засолённых сероземно-луговых почвах

В статье приведены данные о влияние минеральных удобрениях на фоне навоза и сидератов на улучшение плодородия сероземно луговых почв, уменьшение негативного воздействия засоленных почв.

Результатами исследования установлено, что при выращивание высококачественного урожая хлопка-сырца в условиях слабо- и среднезасоленных почвах использование удобрений в норме $N_{200}P_{140}K_{100}$ и $N_{240}P_{168}K_{120}$ кг/га на фоне навоза и сидератов даёт высокую экономическую эффективность, препятствует ухудшению экологического состояния почв.

S.Ganiev, D.Bokiyev

The effect of nutritional conditions on cotton yields on varying degrees of saline serozem-meadow soils

The article presents data on the effect of mineral fertilizers on the background of manure and green manure crops on the increase in fertility of serozem-meadow soils, as well as on the negative impact of saline soils.

The results of the study showed that in the cultivation of high-quality raw cotton on low saline and medium saline soils, the use of fertilizers according to the standard $N_{200}P_{140}K_{100}$ and $N_{240}P_{168}K_{120}$ kg/ha background of manure and green manure crops gives high economic efficiency, prevents the deterioration of quality, ecological condition of the soil.

УДК. 631.412/631

Б.С.НАСИРОВ

ГЕРБИЦИД ЗАЛОГ УРОЖАЯ

При изучении влияния гербицидов на культурное растение визуально наблюдали за состоянием растений – ожоги, пожелтение листьев, болезни. Эффективность Эссек Супер 104 г/л к.э. - оценивали по снижению количества сорняков к исходным показателям до обработки. Гербицид Эссек Супер 104 г/л к.э. обладает хорошей биологической эффективностью на посевах хлопчатника против однолетних и многолетние злаковых сорняков в норме 1,0 л/га.

Ключевые слова: *хлопок, гербицид, меры борьбы, агротехника, сорняки, куриное просо, мышьей сизый, мышьей зеленый, свинорой, камыш, эссеク супер.*

В Республике Узбекистан хлопководство является основной сельскохозяйственной культурой. Потребность народного хозяйства в хлопковом сырье постоянно растет. Дальнейшее увеличение производства хлопка-сырца должно осуществляться за счет повышения урожайности.

Одним из факторов, сдерживающих получение высоких урожаев хлопка- сырца, являются сорные растения [1, с. 54].

В условиях Узбекистана сорняки снижают урожайность хлопчатника и других культур на 15-20%. Они чрезвычайно осложняют проведение

ухода за культурными растениями, резко снижают производительность хлопкоуборочных комбайнов и сельскохозяйственных машин [2, с. 34].

Агротехнические меры, включая севообороты, не решают полностью задачу уничтожения их, возникает необходимость применения химических средств борьбы-гербицидов.

Однако, как показала практика, регулярное применение одних и тех же гербицидов приводит к постепенному вытеснению из травостоя чувствительных к ним видов сорняков, место которых начинают занимать устойчивые виды.

Поэтому возникает необходимость в разработке правильных приёмов и изыскание путей стабильного использования гербицидов в целях повышения их эффективности.

При изучении влияния гербицидов на культурное растение визуально наблюдали за состоянием растений – ожоги, пожелтение листьев, болезни. Эффективность Эссек Супер 104 г/л к.э. [3, с. 247] - оценивали по снижению количества сорняков к исходным показателям до обработки.

Краткая характеристика сорняков имеющихся в опыте.

Куриное просо - курмак - *Echinochloa cruss-galli*. Однолетнее однодольное растение. Широко распространено в Узбекистане на поливных землях. Плодоносность высокая — одно растение в зависимости от кустистости и места прорастания может давать от 5 до 13 тысяч семян. Наибольший вред этот сорняк причиняет хлопчатнику в ранние фазы развития. На 1 кв.м приходится 15-20 растений.

Мышей сизый - *Setaria glauca*. Стебель одиночный или пуками, гладкий, высота до 80 см, листья линейно-ланцетные. Плоды овально яйцевидные, появляются в апреле, июне и в августе.

Распространен мышней сизый на всех поливных землях. Цветет и плодоносит во второй половине лета. Вначале быстро развивает мощную корневую систему, которая углубляется до 1,5 м.

Мышей зеленый - *Setaria viridis*. Однолетний злаковый сорняк, высота стебля 20-100 см. Корень мочковатый, проникающий в почву на 75-170 см. Колоски яйцевидно овальные, плод овально яйцевидный, цветет в июле-сентябре. Плодоносит в июле-октябре.

Плодовитость одного растения 2300 зерен. Семен сохраняют жизнеспособность более 4-х лет.

Растет на всех поливных землях, распространен в южный районах.

Свинорой (*Cynodon dactylon L. Pars.*) - многолетний сорняк из семейства мятлевые (злаковые) корневищный многолетник. Корневая

система в виде подземных стеблей с вегетативными почками, углубляется на 1,5 м. Стебель приподнимающийся ветвистый высотой 10-40-50 см. Листья линейно-ланцетные волосистые, язычок в виде коротких ресничек.

Соцветие из пальчатособранных веточек. Плод - безостая желтовато-зеленовато-фиолетовая пленчатая зерновка, длиной 2,25-2,75 мм.

Камыш - *Scirpus juncoides L.* Стебель одиночный или пучками, гладкий, высота до 80 см, листья линейно-ланцетные. Плоды овально яйцевидные, появляются в апреле, июне и в августе.

Сроки применения гербицида сплошным способом по растущим однолетним и многолетним злаковым сорнякам - куриное просо, мышней сизый, мышней зеленый, гумай, камыш и выонок полевой проводили рано утром при температуре воздуха +20 градусов.

С этой целью в отчетном 2017 году нами был испытан гербицид Эссек Супер 104 г/л к.э. фирмы «Nanjing Essence Fine -Chemical Co.» КНР, против однолетние и многолетние злаковые сорняков на хлопчатнике целью установления его биологической эффективности.

Эссек Супер 104 г/л к.э.- на посевах хлопчатнике против однолетних и многолетние злаковых сорняков. На поле где проводились наблюдения на хлопке был проведен учет сорной растительности на наличие однолетних злаковых сорных растений, среди которых находились мышней сизый, мышней зеленый и росичка кровавая.

Визуальное наблюдение за внешней реакцией на применение гербицида Эссек Супер 104 г/л к.э. в первоначальный период показало.

На 4-5 день после применения его у сорных растений заметно стало искривление стебля, далее произошло усыхание листьев и изменение их окраски на грязно зеленую вместо обычной, темно-зеленой. Что указывает на нарушение синтеза хлорофилла. При дальнейшем наблюдении точка роста отмерла и постепенно гибло всё сорное растение (табл. 1).

Таблица 1

Биологическая эффективность гербицида Эссек Супер 104 г/л к.э. - против однолетних злаковых сорняков на посевах хлопчатнике

(Учебно-опытное хозяйство ТашГАУ, Уртачирчикского района Ташкентской области)

Варианты		Контроль (без гербицида)				Эталон Зеллек супер 104 г/л, 1,0 л/га				Эссек Супер 104 г/л к.э. 1,0 л/га			
Видовой состав сорняков		01.06	15.06	30.06	15.07	01.06	15.06	30.06	15.07	01.06	15.06	30.06	15.07
Куриное просо	шт	24,3	28,1	30,3	34,9	26,0	4,6	3,8	2,7	24,8	3,3	2,8	2,2
	%						83,6	87,4	92,2		88,2	90,7	93,6
Мышей сизый	шт	12,6	18,3	21,9	22,8	11,9	5,3	4,4	3,1	10,7	3,9	2,1	1,7
	%						71,0	79,9	86,4		78,6	90,4	92,5
Мышей зеленый	шт	7,3	8,7	14,3	17,7	8,1	2,4	2,2	1,9	7,8	2,1	1,8	1,6
	%						68,9	84,6	89,2		75,8	87,4	90,9
Росичка кровавая	шт	6,3	11,4	16,2	19,4	6,5	2,0	1,8	1,4	6,8	1,9	1,4	1,0
	%						82,4	88,8	92,7		83,3	91,3	94,8
Всего сорняков	шт	50,5	66,5	82,7	94,2	52,5	14,3	12,2	9,1	50,1	11,2	8,1	6,5
	%						78,4	85,2	90,3		83,1	90,2	93,0

Куриное просо имело, свойство стабильно уменьшаться однолетних злаковых растений от применения гербицида. Уже на 15 сутки была получена биологическая эффективность 83,1 %, а к

60 сутками она равнялась 93,0 %, против многолетние сорняков биологический эффективность составила на 15 сутки 81,9 %, на 60 сутки была 92,0 %.

Таблица 2

Биологическая эффективность гербицида Эсек Супер 104 г/л к.э. - против многолетние сорняков на хлопчатнике

(Учебно-опытное хозяйство ТашГАУ, Уртачирчикского туман Ташкентской вилоят)

Варианты		Контроль (без гербицида)				Эталон Зеллек супер 104 г/л.1,0 л/га				Эсек супер 104 г/л к.э. 1.0 л/га			
Видовой состав сорняков		01.06	15.06	30.06	15.07	01.06	15.06	30.06	15.07	01.06	15.06	30.06	15.07
Свинорой	шт	19,6	24,8	29,3	32,1	20,6	3,6	3,3	2,7	22,7	3,3	2,8	2,1
	%						85,4	88,7	91,5		86,6	90,4	93,4
Гумай	шт	7,7	14,2	19,3	22,8	8,1	3,4	3,0	2,8	8,4	3,1	2,8	2,0
	%						76,0	84,4	87,7		78,1	85,4	91,2
Камыш	шт	8,2	9,7	12,3	16,4	7,8	2,8	2,3	1,9	8,8	2,4	2,0	1,6
	%						71,1	81,3	88,4		75,2	83,7	90,2
Всего сорняков	шт	35,5	48,7	60,9	71,3	36,5	9,8	8,6	7,4	39,9	8,8	7,6	5,7
	%						78,8	85,8	89,6		81,9	87,5	92,0

В контроле увеличилось количество сорной растительности. В эталонном варианте, где Зеллек супер 104 г/л к.э. 1,0 л/га против однолетних сорняков биологическая эффективность на 15 день 78,4 на 30 день 85,2 % и на 60 день 90,3 %, а против многолетних эффективность составила 78,8 %, 85,8 % и 89,6 % на 60 день.

В заключение, гербицид Эсек Супер 104 г/л к.э. обладает хорошей биологической эффективностью на посевах хлопчатнике против однолетних и многолетние злаковых сорняков в норме 1,0 л/га.

Ташкентский государственный аграрный университет

Поступила 12 марта 2019 года

Литература

1. Бондаренко О.Н. Определитель высших растений Каракалпакии. Ташкент, 1964. -С.54.
2. Шералиев А, Бухаров К, Рузиев А. Сорные растения накопители инфекции фузариозного вилта. Ж. Защита и карантин растений. 2001. №5. -С. 34.
3. Список разрешенных химических препаратов в Республике Узбекистан Госхимкомиссия Ташкент 2007. -С. 247.

Насиров Б.С.

Гербицид ҳосил беришнинг гаровидир

Маданий ўсимликларга гербицидларнинг таъсирини ўрганишда ўсимликларнинг ҳолатини кутиши, баргларнинг сарғайиши ва касалланишини кузатдик. Эсек Супер 104 г/л э.к. гербицидининг самарадорлиги препарат сепишгача бўлган бегона ўтлар сонига таккослаб баҳоланди. Эсек Супер 104 г/л э.к. гербициди 1,0 л/га мөъёрда ғўза далаларидаги бир йиллик ва қўп йиллик бегона ўтларга қарши юкори биологик самарадорликка эга бўлади.

Nasirov B.S.

Herbicides are the guarantee of yield

When studying the effect of herbicides on a cultivated plant, they visually observed the state of the plants - burns, yellowing of leaves, and diseases. The effectiveness of Essek Super 104 g/l. - evaluated by reducing the number of weeds to the original indicators before treatment.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК

УДК:631.43:631.41.

А.С.МУРАТКАСИМОВ, Л.А.ГАФУРОВА

ЛАЛМИ ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ МЕХАНИК ТАРКИБИ ВА АГРОКИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ (ФАЛЛАОРОЛ ТУМАНИ МИСОЛИДА)

Лалми ерлардан самарали фойдаланиш, унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юкори ва сифатли ҳосил олиш, турли агротехнологияларни қўллашда тупроқнинг механик таркиби ва агрокимёвий хоссаларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада лалми типик бўз тупроқларнинг механик таркиби ва агрокимёвий хоссалари бўйича тадқиқот натижалари баён этилган.

Калит сўзлар: *типик бўз тупроқ, механик таркиб, гумус, эрозия, лалми, тупроқча ишлов берииш, алмашлаб экши, тоза шудгор, агротехнология*

КИРИШ

Фаллаорол тумани худуди жиҳатдан Жиззах вилоятининг ғарбий қисмида жойлашган. Худудда асосан лалми типик, айrim жойларда тўқ тусли ва сугориладиган типик бўз тупроқлар тарқалган.

Марказий Осиёнинг лалмикор минтақаларида тарқалган тупроқларни ўрганиш тўғрисидаги маълумотлар XIX асрнинг 50-60 йилларида бошланган. Бўз тупроқларнинг келиб чиқишига доир тадқиқотлар В.В.Докучаев, Н.М.Сибирцев, П.С.Коссович, К.Д.Глинка, Н.А.Димо, С.С.Неуструев, Н.А.Розанов, В.А.Ковда, М.У.Умаров, А.М.Расулов, М.Б.Баходиров ва бошқаларнинг илмий изланишлари билан боғлиқ [6].

С.С.Неуструев, К.Д.Глинка [5], Р.К.Кўзиев [3], Л.А.Гафурова [2], М.М.Тошқўзиев [7], Ўзбекистондаги тоғ олди типик ва тўқ тусли бўз тупроқларни органик моддаларга, азотли бирикмалар ҳамда намлик билан нисбатан лалмикор тупроқларни гумусга, азотга камбағал, микробиологик фаоллиги паст деб таърифлашган.

Бугунги кунда республикадаги лалмикор майдонлардан самарали фойдаланишга тўсқинлик қилиб келаётган омилларидан бири тупроқ унумдорлиги пастлигидир. Узоқ йиллар давомида бу майдонларда ғалла экинларининг якка ҳукмронлиги, бир йиллик ва кўп йиллик дуққакли ўсимликлар ҳамда тоза шудгор майдонларининг кескин камайиб кетиши, тупроқка узлуксиз равишда плуглар билан 20-22 см чукурликда ағдариб хайдаш, органик ва маъданли ўғитлардан, ўсимликларни бегона ўтлар,

турли касаллик ва зааркунандалардан ҳимоя қилиш воситаларидан деярли фойдаланмаслик, эрозия даражасининг ортиши билан бу тупроқлarda механик таркиби, органик моддалар (гумус), умумий фосфор ва ялпи калий миқдорининг сезиларли даражада камайганлиги аниқланди.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ

Тадқиқотлар Фаллаорол тумани лалми типик бўз тупроқлар шароитида танлаб олинган калит майдонлари тупроқларида олиб борилди.

Тупроқнинг механик таркиби - Качинский буйича пипетка усулида; кимёвий ва агрокимёвий таҳлиллар Е.В.Аринушкина [1] ҳамда ЎзПИТИ қўлланмаларида баён этилган усулларда амалга оширилди [4].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Тупроқнинг механик таркиби уларнинг она жинс таркиби билан боғлиқ бўлиб, тупроқка сифатли ишлов бериш натижасида унинг хоссалари яхшиланиб боради.

Лалми типик бўз тупроқларда механик таркиби ийрик ва майда чанг фракциялари кўп бўлиб, қияликнинг жанубий экспозициясида тарқалган тупроқларда физик лой миқдори кескин камайиши кузатилса, шимолий экспозицияда эса аксинча ортган. Буларни ўртacha эрозияга учраган лалми типик бўз тупроқларнинг механик таркиби келтирилган маълумотларда аниқ кўриш мумкин.

Тоза шудгордан сўнг 1 ва 2-йил буғдои экилган тупроқларда ҳайдалма қатламида физик лой миқдори 33,4-34,7% бўлиб, тасниф бўйича ўрта

кумоқли. Кўриқ ерларнинг чимли қатламида физик лой миқдори 43,2% ни, чим ости қатламида эса 42,7% ни ташкил этиб, тасниф бўйича ўрта кумоқли.

Ил заррачалари (<0,001) миқдори тоза шудгордан сўнг 1 ва 2-йил юмшоқ бўғдой экилган тупроқларда хайдалма қатламида 7,0-13,7 эканлиги аниқланган.

Лёсс ва лёссиomon ётқизикларда шаклланган тўқ тусли бўз тупроқларнинг механик таркибида физик лой миқдори эрозия таъсирида камайган.

Эрозияланмаган тупроқларда ҳайдалма қатламда физик лой миқдори 35,4%, ўртача эрозияланган тупроқларда 32,4%, ювилиб тўпланган тупроқларда 38,5% ни ташкил этган (1-жадвал).

Шундай қилиб, олинган маълумотларга кўра лалми типик бўз тупроқлар механик таркибининг енгиллашиши, ил ва майда чанг фракцияларининг камбағаллашиши, йирик фракциялар билан бойиши кузатилди.

1-жадвал

Лалми типик бўз тупроқларнинг механик таркиби

Кесма рақами ва номи	Чуқурлиги, см	Механик таркиби (фракциялар оғирлиги), %								Механик таркибига кўра номланиши
		>0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Физик лой	
K-4 Эрозияланмаган, сув айирғич	0-18	1,6	0,4	18,3	44,3	9,1	18,0	8,3	35,4	ўрта кумоқ
	18-37	2,0	0,5	18,9	43,7	9,8	17,4	7,7	34,9	ўрта кумоқ
	37-85	1,6	0,4	16,7	47,1	9,5	17,5	7,2	34,2	ўрта кумоқ
	85-125	1,2	0,3	12,7	53,4	9,0	16,0	7,4	32,4	ўрта кумоқ
	125-151	0,8	0,2	23,0	49,6	6,8	14,4	5,2	26,4	енгил кумоқ
K-2 Ўртача эрозияланган, шимолий қиялик	0-22	1,2	0,3	17,1	47,8	8,4	18,6	6,6	33,6	ўрта кумоқ
	22-40	0,8	0,2	17,4	46,0	10,2	18,5	6,9	35,6	ўрта кумоқ
	40-75	0,8	0,2	14,2	44,8	12,6	20,9	6,5	40,0	ўрта кумоқ
	75-140	0,4	0,1	16,4	51,1	11,5	17,1	3,4	32,0	ўрта кумоқ
	140-200	0,4	0,1	12,3	53,0	13,1	15,4	5,7	31,2	ўрта кумоқ
K-1 Ўртача эрозияланган, жанубий қиялик	0-18	2,4	0,6	26,6	38,0	8,6	17,3	6,5	32,4	ўрта кумоқ
	18-47	1,6	0,4	21,6	43,3	11,3	17,0	4,8	33,1	ўрта кумоқ
	47-80	1,2	0,3	19,8	45,9	8,6	17,6	6,6	32,8	ўрта кумоқ
	80-140	1,2	0,3	19,2	50,6	2,8	19,0	6,9	28,7	енгил кумоқ
	140-200	1,6	0,4	19,3	43,1	7,1	27,3	1,2	35,6	ўрта кумоқ
K-3 Ювилиб тўпланган	0-30	1,6	0,4	13,6	47,9	9,8	20,5	6,2	38,5	ўрта кумоқ
	30-61	0,8	0,2	15,4	45,8	8,7	23,4	5,7	37,8	ўрта кумоқ
	61-90	0,8	0,2	20,1	42,8	8,8	19,3	8,0	36,1	ўрта кумоқ
	90-122	1,2	0,3	14,9	43,9	11,2	19,0	9,5	33,7	ўрта кумоқ
	122-150	0,8	0,2	10,9	46,8	14,1	19,2	8,0	41,3	ўрта кумоқ
K-6 Тоза шудгордан сўнг 1-йил буғдой	150-170	0,8	0,2	15,7	42,2	10,5	20,2	10,4	41,1	ўрта кумоқ
	0-20	1,0	0,1	25,8	38,9	12,5	15,2	7,0	34,7	ўрта кумоқ
	20-48	0,5	0,1	29,0	36,4	10,7	17,8	5,5	34,0	ўрта кумоқ
	48-80	0,2	0,1	22,8	44,7	8,5	16,1	7,6	32,2	ўрта кумоқ
	80-120	0,5	0,1	43,3	23,1	8,5	10,3	14,2	33,0	ўрта кумоқ
K-7 Тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой.	120-180	0,5	0,1	39,9	31,4	8,9	11,5	7,7	28,1	енгил кумоқ
	0-22	0,80	5,1	17,5	43,1	10,3	9,33	13,7	33,4	ўрта кумоқ
	22-48	0,71	3,7	22,9	39,2	6,41	14,2	12,6	33,3	ўрта кумоқ
	48-65	0,85	2,7	15,2	43,4	13,8	10,7	13,1	37,7	ўрта кумоқ
	65-110	0,63	1,2	17,4	46,7	11,3	10,1	12,3	33,9	ўрта кумоқ
K-5 Кўриқ ер	110-200	0,37	2,6	24,9	40,8	12,0	8,47	10,6	31,1	ўрта кумоқ
	0-6	1,2	0,3	23,6	31,7	18,8	15,1	9,3	43,2	ўрта кумоқ
	6-30	0,8	0,2	17,0	39,3	16,9	17,1	8,7	42,7	ўрта кумоқ
	30-54	0,8	0,2	18,9	38,8	16,8	14,8	9,7	41,3	ўрта кумоқ
	54-93	0,4	0,1	19,6	46,5	16,6	15,4	10,4	42,4	ўрта кумоқ
	93-157	0,5	0,1	16,2	46,9	14,7	12,8	8,8	36,3	ўрта кумоқ
	157-180	0,5	0,3	16,8	45,1	13,6	14,6	9,1	37,3	ўрта кумоқ

Ёғин-сочин билан ярим таъминланган қирадирлик минтақасининг типик бўз тупроқлар тарқалган кўриқ ерларнинг кимёвий кўрсаткичларига кўра, чимли ва чим ости қатламида гумус ва азот миқдори 1,438-1,612% ва 0,101-0,120% ни ташкил этган ҳолда куйи қатламлар томон сезиларли камайиб боради ва она жиснга яқин кескин камаяди.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Фаллаорол илмий-тажриба станциясининг Марказий тажриба хўжалигининг беш далали фаллашудгор алмашлаёт экиш схемасининг ўртача ювилган ва тоза шудгордан сўнг 1-йил буғдой экилган лалми типик бўз тупроқлар юқори қатламларида гумус ва азот миқдори 0,885-0,704% ва 0,073-0,046% бўлиб, эрозияланмаган тупроқларга

нисбатан бироз камлиги аниқланди. Гумус ва азот миқдори пастки қатламлар томон секинлик билан камайиши кузатилган. Ҳайдалма қатламда умумий фосфор 0,128-0,255% ва калий миқдори 0,964-1,420% бўлиб, эрозияланмаган ювилиб тўпланган тупроқларга нисбатан барча қатламларда камлиги аниқланди.

Галлаорол туманининг “Кўкбулок” фермерлар уюшмасининг эрозияланмаган сув айирғич қисмидан олинган кесма натижаларига кўра, гумус миқдори ҳайдов қатламида 1,280% ни, пастки қатламларида 0,802-0,925% ташкил этди. Агар бу кўрсаткични кўриқ ерларнинг чимли қатламларидаги гумус миқдори билан таққослайдиган бўлса, унинг миқдорининг 0,332% га камайганлигини кузатамиз. Эрозияланмаган тупроқлардаги ялпи азот миқдори гумус миқдорига қараб ўзгариши кузатилади. Бу тупроқ кесмасидаги азот миқдори ҳайдаладиган қатламида 0,100% ни ташкил этган бўлса, ҳайдов ости қатламларида унинг миқдори бироз камайганлиги 0,080-0,070% эканлиги аниқланди.

Кўриқ ердан олинган тупроқ кесмасида гумуснинг миқдори пастки қатламлар томон кескин камайиши, буғдой экилган майдондан олинган кесмада секинлик билан камайиши кузатилди. Жадвалдан кўриниб турибдики, кўриқ ва кузги ғалла экиладиган ерларда олинган тупроқ кесмаларида ялпи фосфор миқдорининг юқори қатламда фарқи кам ўзгарганлиги, пастки қатламларида эса кескин фарқ қилиши кузатилди. Кўриқ ерларнинг чимли қатламларидаги умумий фосфор миқдори 0,260% ни ташкил этган бўлса, кузги буғдой экиб келинган тупроқларнинг ҳайдов қатламида унинг миқдори бироз камлиги 0,105-0,128 % камлиги кузатамиз. Кўриқ ерларнинг пастки қатламларидаги фосфор миқдорининг секин-асталик билан камайиши, ғалла экиладиган ерларда эса кескин камайиб бориши кузатилди.

Юқорида қайд этилганидек, умумий калий миқдорининг барча тупроқ кесмаларида кўплиги кузатилди. Кўриқ ер ва кузги буғдой экиб келинган ерлардаги калийнинг умумий миқдори 0,692-1,044% ни ташкил этди ва бироз устунлик кўриқ ерлар томонида эканлиги кузатилди.

Турли тупроқ кесмаларидан олинган намуналардаги ҳаракатчан шаклдаги озиқа моддаларнинг (нитратли азот, ҳаракатчан фосфор ва

алмашинувчи калий) миқдори ердан фойдаланиш характерига қараб ўзгариши кузатилди. Кўриқ ердан олинган тупроқ намуналаридаги нитрат миқдорини пастки қатламларга томон камайиб бориши кузатилган бўлса (6,0- 3,2 мг/кг), ҳайдаладиган майдондан олинган кесмада унинг миқдори 4,2-3,0 мг/кг ни ташкил этиши аниқланди. Бунинг сабаби ўсимликлар томонидан нитратларнинг ўзлаштирилиши ва ёғин-сочин таъсирида ювилиб кетганлиги билан изоҳлаш мумкин. Эрозияланмаган сув айирғич қисмидан олинган кесмада нитрат миқдорининг анча юқорилиги кузатилди 10,8-5,0 мг/кг.

Тупроқдаги ҳаракатчан шаклдаги фосфор миқдори ҳам унинг ялпи миқдорига мутаносиб равишда кўриқ ерларда камлиги кузатилди. Ҳаракатчан шаклдаги фосфорнинг нисбатан энг кўп миқдори эрозияланмаган сув айирғич, ювилиб тўпланган ва кўриқ ерлардан олинган кесмаларнинг юқори қатламларида аниқланди 54,0-58,0 мг/кг, энг паст кўрсаткичлар эса ўртача ювилган жанубий қиялик ва тоза шудгордан сўнг 1 ва 2-йил буғдой экилган майдонда аниқланди 15,8-18,5 мг/кг.

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, тупроқ кесмаларида гумуснинг тарқалиши бир хил эмас. Эрозияланмаган тупроқларда гумус миқдори пастки қатламларга бир текис камайиб боради, ўртача эрозияланган тупроқларда деярли кескин, эрозия натижасида йиғилиб тўпланган тупроқларда эса анча чукур қатламларгача бир текис камайиб боради. Эрозияланган тупроқларда гумусдан ташқари барча озиқа элементлари ҳаракатчан шакллари камлигини кузатишимиш мумкин.

ХУЛОСА

Эрозияланиш даражаси ортгани сайин тупроқларда гумус ва озиқа элементлари миқдори камайган. Эрозияланмаган тупроқлардан ўртача эрозияланган тупроқлар томон гумус миқдори 1,28% дан 1,13% гача камайиб боради. Биринчи йил кузги буғдой экилган майдонда 0,88% дан иккинчи йил буғдой экилган майдонда 0,65% гача камайиши аниқланди.

Бу минтақанинг тупроқларининг механик таркиби асосан ўрта кумоқли бўлиб физик лой миқдори 31,1-43,2% ни баъзи холларда пастки қатламлари 28,1-28,7% бўлиб, енгил кумоқли эканлиги аниқланди.

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

Галлаорол илмий тажриба станцияси

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети.

Қабул қилинган вақти

14 апрел 2019 йил

Адабиётлар

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв //М. МГУ. 1970. - 197 с.
2. Гафурова Л.А. Почвы, сформированные на третичных красноцветных отложениях, их экологическое состояние и плодородие // Дисс. ... д.б.н. – Ташкент, 1995. – С.331–351.

3. Қўзиев Р.К., Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана.-Ташкент, Exrtemum press, 2009. -С. 351-352.
4. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии // ЎзПТИ. -1977. -214 с.
5. Неуструев С.С. Опыт классификации почвообразовательных процессов в связи с генезисом почв «Известия географического института». Вып. 6. Л. 1919. – С. 32-34.
6. Панков М.А. Почвоведение. Изд-во Укитувчи. –Ташкент, 1970. – С. 154-155.
7. Тошқўзиев М.М., Шадиева Н.И. Влияние природных и антропогенных факторов на свойства эродированных почв предгорий бассейна р. Санзар // Ўзбекистон тупроқлари ва ер ресурслари: улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш: илмий-амалий анжуман материаллари. 14-16 май 2008. – Ташкент, 2008. – Б. 85-86.

Мурадкасимов А.С., Гафурова Л.А.

**Механический состав и агрохимические свойства типичных сероземов (на примере
Галляаралского района)**

Изучение эффективного использование, типичных сероземов богарных земель, их сохранение повышение плодородия, получение высокого и качественного урожая при различных агротехнологических приёмов, их влияние на механического состава и агрохимических свойств имеют важную значение. В данной статье описаны результаты исследований механический состав и агрохимические свойства типичных сероземов.

Muratkasimov A.S., Gafurova L.A.

**Mechanical composition and agrochemical features of typical gray soils in dry land (in the example of
Gallaorol district)**

Keeping and improving the efficient use of dry land is the study of the mechanical composition of the soil and its agrochemical aspects, while maintaining high-quality and high yields of crops. This article describes the results of research on the mechanical composition and agrochemical aspects of typical gray soils in dry land.

УДК:631.4.84.461

ҚЎЗИЕВ Ж. М.

**ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ АГРОКИМЁВИЙ
ХОССАЛАРИНИ ДАВРИЙ ЎЗГАРИШ САБАБИ**

Мақолада унумдорлик даражаси паст, ўрта, юқори бўлган худудлардан танланган пилот участкалари тупроқларининг агрокимёвий ҳолати, етиширилган ғўза қисмлари таркибидаги азот, фосфор ва калий миқдорлари билан тупроқларга бир мавсумда келиб тушган озиқ элементлар киёсий таққосланиб, уларининг даврий ўзгариш сабаби келтирилган.

Калит сўзлар: *Типик бўз, агрокимёвий хосса, даврий, натижса, кирим-чиқим, баланс, тушган, қиёсий, сабаблар.*

КИРИШ

Сўнги йилларда бутун дунёда, шу жумладан Республикаизда ер ресурсларидан жадал суръатда фойдаланиш натижасида тупроқларда гумус ва озиқ элементлар миқдорининг камайиши кузатилиб, айрим элементларни тупроқда етишмаслиги содир бўлмоқда. Бунинг асосий сабаби тупроқлардан ҳар йили ўсимликларни ҳосил ва баъзи қисмлари билан озиқ элементларининг қайтмас тарзда чиқиб, етарлича қайтмаётганлиги, яъни кирим ва чиқим балансларининг бузилишидир. Мазкур ҳолат бир қатор салбий қўринишларга олиб келмоқда, жумладан тупроқларнинг антропоген таъсиirlарга

каршилиги камайиб, эрозия жараёнлари кучаймоқда, физик-кимёвий хусусиятлари ёмонлашмоқда, агрономик қиймати хисобланган агрегатлик ҳолати (таркиби) бузилмоқда. Бир сўз билан айтганда тупроқлар деградацияга учраётганлиги яққол намоён бўлмоқда. Шунинг учун ҳам тупроқлар унумдорлигини ошириш, уларни органик модда ва озиқ элементлари билан бойитиш ва қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олиш учун интенсив дехкончиликда замонавий ўғит кўллаш, алмашлаб ва навбатлаб экиш ҳамда бошқа бир қатор агротехник тадбирларни кенг жорий этиш лозим [8, 9].

Минерал ўғитлар кўллаш тизими ривожланган давлатларда макро ва микроэлементларнинг маҳалий ўғитлар билан бирга кўллашнинг замонавий усул ва муддатлари ҳамда илғор техника ва технологиялар (агрегатлар) асосида жорий қилиш тизимлари ишлаб чиқилмоқда. Ушбу тизимлар ўзининг иш самараси жуда юқорилиги билан алоҳида тавсифланади. Масалан, Бирлашган миллатлар ташкилотининг ФАО бўлими томонидан дунёнинг 40 дан ортиқ мамлакатларида тарқалган тупроклар шароитида турли экинларнинг минерал ўғитларга бўлган талаби ўрганилиб жамоатчиликка тақдим этилган. Бунда минерал ўғитлар экинлар ҳосилдорлигини асосини, яъни 50-60% гача салмоғини ташкил қилишини эътироф этади [9].

Бугунги кунда минерал ўғитларнинг аҳамиятини тушунган ҳолда уни ер куррасининг турли минтақаларида тупроқ-иклим шароитидан келиб чиқиб кўлланилмоқда. Дунёда катта микдорда азотли, фосфорли ва калийли минерал ўғитлар ишлаб чиқарилади. Чунки ўсимликлар худди шу элементларни кўп микдорда талаб қиласи ва улар бир-бирини ўрнини босмайди, балки тўлдиради.

Азот – ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишини яхшилади, пировардида уларнинг сифати ва салмоғи ортади. Оқсил ва бошқа азотли моддаларнинг асосий элементи сифатида азот ўсимликдаги барча жараёнлар ва ҳосил шакллантиришда иштирок этади.

Фосфор – ўсимликларда энергияни узатишида, фотосинтез ва бошқа кимё-физиологик жараёнларда асосий ролни уйнайди. Хужайраларни дифференциялашда, ўсиш нуктасини шакллантиришда фосфор ўрнини ҳеч қандай элемент боса олмайди.

Калий – ўсимликларни, айниқса илдиз тизимини, ўсишини тезлаштиради, ҳар хил касалликлар билан курашишга чидамлилигини оширади, ҳосил сифатини яхшилади. Ўсимликларда намликни ушлаб туришга, совуқка чидамили бўлишида ёрдам беради. Калий ўсимлик организмида 60 та ферментни фаоллаштиради [7].

Шунинг учун ҳам озиқа элементлар ичida азотли, фосфорли ва калийли минерал ўғитлар дунёда энг кўп микдорда ишлаб чиқарилади. Тупроқлар унумдорлиги ва озиқа элементлар мувознатини (озиқа элементларнинг қайтарилиш қонунияти) ижобий бўлиши учун доимий (тизимли) тупроқларни назорат қилиш ва керакли хуроса ва тавсиялар асосида ўғитлаш тизимини жорий этиш лозим. Шундагина тупроқларимизни соғлом ва унумдор бўлишига замин яратилади.

ИЗЛАНИШ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЁТИ

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, Тошкент вилояти Бўка тумани “Ачамайли” массивида тарқалган эскидан суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик даражаси паст, ўрта ва юқори бўлган ҳудудларидан пилот участкалари

танланди. Мазкур пилот участкаларида тарқалган суғориладиган тупроқларнинг агрокимёвий ва бошқа хоссаларини аниқлаш мақсадида дастлаб ҳар бир пилот участкасидан асосий ва ёрдамчи тупроқ кесмалари жойлаштирилди ва генетик катламларидан тупроқ намуналари олинди. Шунингдек, пилот участкаларида етиштирилган фўздан вегетация якунида ўсимлик намуналари олинниб уларнинг барча қисмлари таркибидаги озиқа элементлар миқдори аниқланди.

Ўтказилган дала ва лаборатория тахлил ишлари – “Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения” [10], Методы агрохимических анализов почв и растений [11], Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах [12], Е.В.Аринушкинани “Руководство по химическому анализу почв” [1], “Агрохимические методы исследования почв” [2], Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель [5] кўлланмаларида келтирилган услублар ва бошқа маҳсус “Пахтачилиқда маъдан ва маҳаллий ўғитларни кўллаш” [13], “Суғориладиган тупроқларда минерал ва органик ўғитларни табақалаштириб кўллаш” [3], “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [4], “Пахтачилиқда юқори ҳосил олиш технологияси” [14] номли тавсиялар асосида олиб борилди.

НАТИЖАЛАР

Барча ҳолларда, биринчи навбатда, тупроқларнинг даврий ва минтақавий шаклланиши, географик жойлашиш ўрни, тупроқ-иклим шароити ва бошқа бир қатор омилларни ўрганган ҳолда минерал, маҳаллий ёки ноанъанавий ўғитларнинг йиллик, вегетация даврида табақалаштириб кўллаш меъёрлари аниқланса мақсадга мувоғик бўлади. Шунинг учун ҳам бутун дунёда минтақавий тупроқ-иклим шароити ҳисобга олинган ҳолда йиллик ёки даврий (вегетация даврида) ўғит меъёрлари ва агротехнологик тадбирлари ишлаб чиқилади ва у амалиётга жорий қилинади.

Дала тадқиқотлари олиб борилган “Ачамайли” массивида эскидан суғориладиган типик бўз, бўз-ўтлоқи, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлари мавжуд бўлиб, мазкур тупроқ типларидан энг катта майдонда тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида дала тадқиқотлари пилот участкаларида ўтказилди. Бунга кўра, ўрганилган унумдорлик даражаси юқори ва ўрта бўлган пилот участкаларида тарқалган тупроқларнинг механик таркиби генетик катламларда бир хил ўрта кумоқли, унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкасида эса ўрта ва оғир кумоқли механик таркибдан иборат эканлиги қайд этилди. Аммо, уларнинг унумдорлик даражаси бир биридан фарқ киласи. Масалан, унумдорлик даражаси паст бўлган

пилот участкаси танланган худудда тарқалган тупроқлар шўрланиш ва ювилиш ҳисобига балл бонитети 41-50 оралиғида баҳоланган. Унумдорлик даражаси ўрта бўлган пилот участкаси ҳам кам шўрланганд, аммо ювилиш даражаси йўқлиги ҳисобига балл бонитети 61-70 оралиғидаги баҳоланган. Унумдорлик даражаси юқори бўлган пилот участкаси тупроқлари ҳам бир ҳил ўрта кумоқли, шўрланиш ва ювилиш ҳамда бошқа кўрсаткичлари билан фарқланиши ҳисобига балл бонитети 71-80 оралиғидаги баҳоланган.

Пилот участкаларида тарқалган тупроқлар бир ҳил тупроқ типидан ва механик таркибдан иборат бўлишига қарамасдан, уларнинг даврий ўзлаштирилиши, турлича антропоген босим натижасида, яъни йиллар давомида қўлланилган агротехник ва агромелиоратив тадбирлар натижасида, уларнинг унумдорлик даражаси бир биридан фарқ килишига олиб келган.

Унумдорлик даражаси юқори бўлган тупроқларнинг ҳайдов қатламларидаги гумус миқдори 1,264% ни ташкил этган бўлса, энг куйи қатламларда унинг миқдори 0,165% гача, унумдорлик даражаси ўрта бўлган тупроқларда, мос равишда 1,142-0,452%, унумдорлиги паст бўлган тупроқларда эса 0,475-0,967% оралиғида қайд қилинди. Шунга мос равишда унумдорлик даражаси

юқори, ўрта ва паст бўлган сугориладиган тупроқлар таркибида умумий азот ҳам юқори горизонтлардан, яъни ҳайдов қатламидан (0,084%) куйи қатлам томон камайиб (0,027%) бориши кузатилди (1-жадвал).

Ўрганилган тупроқлар таркибида углероднинг азотга бўлган нисбати 3,5-9,8 оралиғида қайд қилинди. Х.Т.Рисқиева [6] келтирган маълумотларга кўра, бўз тупроқлarda углеродни азотга бўлган нисбати 7-9 оралиғида бўлиши, унинг бу миқдорлардан камлиги тупроқлар таркибидаги биологик жараёнларнинг фаоллигини сустекчаётганлигидан далолат беради.

Сугориладиган типик бўз тупроқларнинг механик таркиби бир ҳил ўрта кумоқли бўлганда, пилот участкаларда углероднинг азотга бўлган нисбати юқори қатламлардан қуйи қатламлар томон бир текисда камайиб бориши кузатилди. Аммо, механик таркиби ўрта ва оғир кумоқли бўлганда, бу кўрсаткич нисбати турлича, яъни тупроқ профилида 7,1-9,8 оралиғида қайд қилинди, углероднинг азотга бўлган нисбати тупроқларнинг механик таркибига боғлиқлиги аниқланди. Чунки, бир ҳил механик таркибли профилда бир текисда юқоридан пастка камайиб борса, механик таркиби турлича бўлганда унинг нисбати ҳам турлича бўлиши кузатилди.

1-жадвал

Эскидан сугориладиган типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий кўрсаткичлари ва айрим физик хоссаси

Кесма, №	Қатлам чукурли ги, см	Гумус, %	Умуми й азот, %	C:N	Озиқа моддалар					Механик таркиб	
					ялпи, %		харакатчан, мг/кг			физик лой, %	тупроқ механик таркиби
					фосфор	калий	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O		
Унумдорлик даражаси юқори пилот майдони											
1 Б-А- АО	0-30	1,257	0,084	8,7	0,187	1,11	25,6	25,7	214	41,8	ўрта кумоқли
	30-49	1,005	0,071	8,2	0,174	1,08	19,4	22,1	198	39,3	ўрта кумоқли
	49-82	0,911	0,068	7,8	0,158	0,94	14,1	16,4	167	35,5	ўрта кумоқли
	82-117	0,698	0,059	6,8	0,124	0,84	9,7	11,9	154	38,7	ўрта кумоқли
	117-156	0,354	0,038	5,4	0,101	0,74	6,4	6,7	132	41,0	ўрта кумоқли
	156-210	0,165	0,027	3,5	0,098	0,62	4,9	4,5	92	41,0	ўрта кумоқли
4 Б-А- АО	0-28	1,217	0,082	8,6	0,197	1,07	22,4	19,4	187	39,4	ўрта кумоқли
	28-50	1,023	0,072	8,2	0,178	0,91	18,4	10,6	156	33,7	ўрта кумоқли
	50-91	0,782	0,065	7,0	0,164	0,67	9,4	7,8	135	39,4	ўрта кумоқли
	91-125	0,504	0,044	6,6	0,146	0,53	6,2	6,2	102	40,1	ўрта кумоқли
	125-160	0,345	0,037	5,4	0,137	0,44	5,9	3,9	78	39,4	ўрта кумоқли
5 Б-А- АО	0-32	1,264	0,084	8,7	0,214	1,11	19,7	29,7	234	42,7	ўрта кумоқли
	32-51	1,114	0,075	8,6	0,181	0,98	14,6	20,1	189	36,4	ўрта кумоқли
	51-92	0,892	0,067	7,7	0,170	0,74	9,4	14,2	156	35,9	ўрта кумоқли
	92-129	0,647	0,053	7,1	0,159	0,62	6,8	9,4	124	41,5	ўрта кумоқли
	129-170	0,425	0,036	6,8	0,135	0,46	4,5	6,4	77	40,9	ўрта кумоқли
Унумдорлик даражаси ўрта пилот майдони											
6 Б-А- НП	0-28	1,142	0,078	8,5	0,185	1,07	22,4	22,9	198	39,5	ўрта кумоқли
	28-50	0,897	0,065	8,0	0,180	0,98	18,4	17,4	174	40,2	ўрта кумоқли
	50-83	0,745	0,056	7,7	0,164	0,79	14,2	15,7	168	37,9	ўрта кумоқли
	83-125	0,681	0,052	7,6	0,148	0,62	9,5	10,6	152	37,6	ўрта кумоқли
	125-184	0,561	0,048	6,8	0,132	0,56	5,7	6,1	124	41,1	ўрта кумоқли
	184-230	0,452	0,042	6,2	0,114	0,50	4,2	5,9	112	32,8	ўрта кумоқли
8 Б-А- НП	0-30	1,082	0,071	8,8	0,193	0,93	19,4	19,7	184	42,1	ўрта кумоқли
	30-52	0,901	0,060	8,7	0,180	0,84	16,7	16,5	171	37,9	ўрта кумоқли
	52-87	0,716	0,052	8,0	0,164	0,74	14,2	12,4	169	39,4	ўрта кумоқли
	87-135	0,621	0,048	7,5	0,146	0,63	9,7	8,4	153	42,5	ўрта кумоқли

	135-174	0,519	0,041	7,3	0,135	0,54	6,7	6,3	119	41,4	ўрта қумокли
10 Б-А- НП	0-31	0,987	0,068	8,4	0,175	1,12	26,4	23,1	219	33,9	ўрта қумокли
	31-50	0,859	0,054	9,2	0,167	0,93	19,5	22,4	197	38,4	ўрта қумокли
	50-88	0,672	0,042	9,3	0,165	0,84	9,2	9,5	156	35,2	ўрта қумокли
	88-107	0,587	0,041	8,3	0,123	0,74	7,0	5,2	123	35,7	ўрта қумокли
	107-165	0,469	0,029	9,4	0,104	0,56	5,3	3,9	91	33,5	ўрта қумокли
Унумдорлик даражаси паст пилот майдони											
11 Б-А- КФ	0-30	0,967	0,069	8,1	0,184	0,84	15,4	12,4	156	43,2	ўрта қумокли
	30-51	0,841	0,062	7,9	0,172	0,74	12,4	9,8	140	47,6	огир қумокли
	51-87	0,726	0,045	9,3	0,165	0,63	9,4	6,4	132	46,1	огир қумокли
	87-109	0,632	0,043	8,5	0,147	0,58	6,3	4,5	124	45,4	огир қумокли
	109-168	0,529	0,041	7,5	0,136	0,42	5,2	4,1	94	47,1	огир қумокли
14 Б-А- КФ	168-210	0,475	0,039	7,1	0,097	0,34	4,2	3,2	82	47,8	огир қумокли
	0-30	0,854	0,063	7,8	0,176	0,96	19,4	10,4	124	33,5	ўрта қумокли
	30-51	0,802	0,051	9,1	0,163	0,78	12,4	8,3	113	33,8	ўрта қумокли
	51-86	0,743	0,049	8,8	0,157	0,65	9,4	4,6	92	47,2	огир қумокли
	86-110	0,659	0,039	9,8	0,134	0,54	5,3	3,5	82	47,9	огир қумокли
15 Б-А- КФ	110-170	0,519	0,032	9,4	0,121	0,36	3,1	3,2	74	46,8	огир қумокли
	0-28	0,905	0,066	7,9	0,180	0,82	16,4	11,5	136	36,5	ўрта қумокли
	28-50	0,856	0,052	9,5	0,169	0,74	13,9	8,3	124	46,8	огир қумокли
	50-89	0,746	0,045	9,6	0,147	0,62	6,8	5,3	93	47,2	огир қумокли
	89-115	0,624	0,041	8,8	0,126	0,42	4,2	4,2	82	47,8	огир қумокли
	115-177	0,513	0,031	9,6	0,107	0,36	3,6	3,5	71	47,5	огир қумокли

Унумдорлик даражаси юқори бўлган тупроқларнинг ҳайдов катламларидағи умумий фосфор микдори 0,187-0,214%, унумдорлик даражаси ўрта бўлган тупроқларда 0,173-0,193%, унумдорлик даражаси паст бўлган тупроқларда эса 0,176-0,184% ни ташкил қиласа, мос равишда, энг куйи қатламларда унинг микдори 0,098-0,137%; 0,104-0,135%; 0,097-0,121% гача камайиши кузатилди.

Ўрганилган суғориладиган типик бўз тупроқларнинг ҳайдов катламларидағи умумий калий 0,82-1,12% оралиғида қайд қилинди ва тупроқ профилининг куйи қатламлари томон аста-секин камайиб (0,34-0,62%) борди. Умумий калий микдорини тупроқларнинг механик таркиби билан боғлиқлиги кузатилмади. Аммо, унумдорлик даражаси юқори бўлган тупроқлар билан, унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкаларида тарқалган суғориладиган тупроқлар ўртасида тафовут борлиги қайд қилинди.

Унумдорлик даражаси юқори ва ўрта бўлган тупроқларнинг ҳайдов катламлари ҳаракатчан азот билан жуда кам ва кам, мос равишда, 19,4-26,4 мг/кг (жуда кам <20 мг/кг; кам 20-30 мг/кг) оралиғида, унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкасида тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқнинг ҳайдов катламлари жуда кам таъминланган. Ҳар учала (унумдорлик даражаси паст, ўрта ва юқори) пилот участкаларида тарқалган тупроқларнинг ҳайдов катламлари таркибидаги ҳаракатчан азот, куйи қатламлар томон аста-секин камайиб боради.

Ҳаракатчан фосфор микдори ҳам унумдорлик даражаси юқори ва ўрта бўлган пилот участкаларда жуда кам (0-15 мг/кг) ва кам (16-30 мг/кг), унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкасида эса жуда кам (ҳайдов қатламида 10,4-

12,4 мг/кг, энг куйи катламда 3,2-3,5 мг/кг) таъминланган гурухга мансуб эканлиги қайд қилинди. Шунингдек, ҳаркатчан калий билан ўрганилган пилот участкаларида тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқлар жуда кам (0-100 мг/кг), кам (101-200 мг/кг), ўртacha (201-300 мг/кг) таъминланган гурухларга мансуб эканлиги кузатилди ва барча пилот участкаларида юқори қатламлардан қуйи қатламлар томон камайиб бориши қайд қилинди (1-жадвал).

Пилот участкаларида тарқалган тупроқларнинг генетик қатламларида гумус, умумий ва ҳаракатчан азот, фосфор, калий ҳамда механик таркиби тўғрисидаги маълумотлар таҳлил қилингандан сўнг, мазкур пилот участкаларида парваришланган ғўза таркибидаги озиқа элементларни микдори ўрганилди.

Бунга кўра, унумдорлик даражаси юқори бўлган суғориладиган участкада парваришланган ғўза вегетация якунида азотни қутиладиги тизим асосида ўзлаштирганлиги кузатилди, яъни барг тола ва чигит поя чаноқ ва илдиз, фосфорни эса тола ва чигит барг илдиз поя-чаноқ, ғўза таркибида калий бир бирига яқин микдорда кузатилди: барг-чаноқ поя-илдиз тола ва чигит. Шунга мос равишда бир гектар майдондан ҳам куйидагича озиқа элементларни ўзлаштирган (2-жадвал).

Олинган маълумотлар асосида озиқа элементларнинг хўжалик баланси ишлаб чиқилди. Бунга кўра, пилот участкаларида парваришланган ғўзага бир мавсумда қўлланилган минерал ва маҳаллий ўғитлар ҳамда табиий йўллар билан келиб тушган азот, фосфор ва калий элементларни етиштирилган ғўзанинг ҳосил ва баъзи қисмлари билан чиқиб кетиш микдорлари қиёсий таккосланди ва уларнинг баланси тўғрисидаги маълумотлар 3-жадвалда келтирилди.

Пилот участкаларида етиштирилган тўза таркибидаги азот, фосфор ва калий элементлари ва бир гектар участкадан ўзлаштирган миқдори, % ҳамда кг/га ҳисобида

Тўза						
Кисмлар	Битта тўза қисмлари таркибида, %			Бир гектардан ўзлаштириши, кг/га		
	N	P	K	N	P	K
Тошкент вилояти Бўка тумани, унумдорлик даражаси юқори бўлган пилот участкаи						
Барг	2,2	0,7	1,6	37,4	11,9	27,2
Поя	0,9	0,3	1,5	18,4	6,1	30,6
Чаноқ	0,8	0,3	1,6	13,6	5,1	27,2
Тола ва чигит	1,9	1,2	1,2	72,7	45,9	45,9
Илдиз	0,8	0,6	1,5	6,1	4,6	11,5
Жами:			148,2	73,6	142,4	
Унумдорлик даражаси ўртача бўлган пилот участкаи						
Барг	1,9	0,6	1,5	29,1	9,2	23,0
Поя	0,7	0,2	1,6	12,5	3,6	28,6
Чаноқ	0,6	0,3	1,5	9,7	4,8	24,2
Тола ва чигит	1,7	1,1	1,1	60,7	39,3	39,3
Илдиз	0,7	0,5	1,4	4,8	3,4	9,5
Жами:			116,7	60,3	124,5	
Унумдорлик даражаси наст бўлган пилот участкаи						
Барг	1,8	0,5	1,4	26,0	7,2	20,2
Поя	0,6	0,3	1,5	11,2	5,6	28,1
Чаноқ	0,6	0,2	1,6	9,2	3,1	24,5
Тола ва чигит	1,6	1,2	1,2	51,7	38,8	38,8
Илдиз	0,8	0,6	1,5	4,8	3,6	8,9
Жами:			102,9	58,2	120,4	

Унумдорлик даражаси юқори бўлган пилот участкасида парваришланган тўзага бир мавсумда минерал ўғитлар билан 80,0 кг/га азот, 9,2 кг/га фосфор ва 28,0 кг/га калий келиб тушган. Махаллий ва табиий йўллар билан 103,0 кг/га азот, 36,5 кг/га фосфор ва 79,2 кг/га калий келиб тушган. Олинган хосил (тол ва чигит) ва поя-чаноқ қисмлари билан чиқиб кетаётган азот, фосфор ва калийларнинг баланси аниқланганда, азот ижобий (+78,3 кг/га), фосфор (-11,4 кг/га) ва калий (-4,2 кг/га)ларнинг баланси салбий эканлиги қайд қилинди (4-жадвал).

Унумдорлик даражаси ўрта бўлган пилот участкасида парваришланган тўзага бир мавсумда минерал ўғитлар билан 70,0 кг/га азот, 7,0 кг/га фосфор, 21,0 кг/га калий келиб тушган бўлса, колган 76,2 кг/га азот, 24,7 кг/га фосфор, 58,0 кг/га калийлар махаллий, тўза қисмлари ва табиий йўллар билан келиб тушган. Аммо, кирим-чиқим баланси ҳисобланганда, яъни олинган хосил ва баъзи қисмлари билан чиқиб кетган миқдори киёсий таққосланганда азот +63,3 кг/га ижобий, фосфор -16,1 кг/га, калий -20,2 кг/га салбий эканлиги аниқланди.

4-жадвал

Ўрганилган тупроқлар шароитида парваришланган тўзага қўлланган ва унинг қисмлари билан чиқиб кетган озиқа элементлар баланси, кг/га

Тошкент вилояти Бўка тумани, унумдорлик даражаси юқори бўлган калит участкаи				
Тўза				
Тупроқлар таркибига тушадиган қисми				
Кирим чиқим баланс бандлари	N	P	K	
Тупроқка қўлланган минерал ва махаллий ўғитлар билан	минерал ўғитлар билан	80,0	9,2	28,0
	махаллий ўғитлар билан	5,6	1,8	8,8
Гўза қисмлари билан	барглар билан	37,4	11,9	27,2
	илдизлар билан	6,1	4,6	11,5
Табиий йўл билан	тупроқларнинг 0-30 см катламида	38,0	17,0	31,0
	экилган чигитлар билан	0,8	0,5	0,7
	сугорма сув билан	12,1	0,7	-
	ёғинлар билан	3,0	-	-
	Жами:	183,0	45,7	107,2

Тупроқлар таркибидан чиқиб кетадиган қисми				
Ғўзани ҳосил қисми (тола ва чигит) билан	72,7	45,9	53,6	
Ғўзани поя ва чаноқ қисмлари билан	32,0	11,2	57,8	
Жами:	104,7	57,1	111,4	
ФАРҚИ:	+78,3	-11,4	-4,2	
Унумдорлик даражаси ўртacha бўлган қалит участкаи				
Кирим чиқим баланс бандлари	N	P	K	
Тупроққа кўлланган минерал ва маҳаллий ўғитлар билан	минерал ўғитлар билан маҳаллий ўғитлар билан	70,0 2,4	7,0 0,8	21,0 3,8
Fўза қисмлари билан	барглар билан илдизлар билан	29,1 4,8	9,2 3,4	23,0 9,5
Tабиий йўл билан	тупроқларнинг 0-30 см қатламида экилган чигитлар билан сугорма сув билан ёгинлар билан	24,0 0,8 12,1 3,0	10,0 0,5 0,7 -	21,0 0,7 -
	Жами:	146,2	31,6	79,0
Тупроқлар таркибидан чиқиб кетадиган қисми				
Ғўзани ҳосил қисми (тола ва чигит) билан	60,7	39,3	46,4	
Ғўзани поя ва чаноқ қисмлари билан	22,2	8,4	52,8	
Жами:	82,9	47,7	99,2	
ФАРҚИ:	+63,3	-16,1	-20,2	
Унумдорлик даражаси паст бўлган қалит участкаи				
Кирим чиқим баланс бандлари	N	P	K	
Тупроққа кўлланган минерал ва маҳаллий ўғитлар билан	минерал ўғитлар билан маҳаллий ўғитлар билан	60,0 1,6	4,6 0,5	14,0 2,5
Fўза қисмлари билан	барглар билан илдизлар билан	26,0 4,8	7,2 3,6	20,2 8,9
Tабиий йўл билан	тупроқларнинг 0-30 см қатламида экилган чигитлар билан сугорма сув билан ёгинлар билан	22,0 0,8 12,1 3,0	8,0 0,5 0,7 -	18,0 0,7 -
	Жами:	130,3	25,1	64,3
Тупроқлар таркибидан чиқиб кетадиган қисми				
Ғўзани ҳосил қисми (тола ва чигит) билан	51,7	38,8	45,2	
Ғўзани поя ва чаноқ қисмлари билан	20,4	8,7	52,6	
Жами:	72,1	47,5	97,8	
ФАРҚИ:	+58,2	-22,4	-33,5	

Изоҳ: Минерал ва маҳаллий ўғитлар ўзлаштириш коэффициенти азот 40%, фосфор 18%, калий 50% олинган.

Шунингдек, унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкасида парваришланган ғўзанинг балансида ҳам азот ижобий +58,2 кг/га, фосфор -22,4 кг/га, калий -33,5 кг/га салбий эканлиги аниқланди.

ХУЛОСАЛАР

“Ачамайли” массивидан танланган пилот участкаларида парваришланган ғўзанинг якуний маълумотига кўра, унумдорлик даражаси юқори бўлган пилот участкасида ҳаддан зиёд азотли элементлар тупроқда кўп қолаётганилиги тупроқларнинг ифлосланишига олиб келса, унумдорлик даражаси паст бўлган пилот участкасидан юқори миқдорда фосфорли ва калийли элементларнинг чиқиб кетиши тупроқларнинг озиқа элементлари билан таъминланганлик даражасини угурухдан бу гурухга, яъни кам таъминлангандан жуда кам таъминланган гурухга ўтиб кетишига олиб келмоқда. Пировардида тупроқлар унумдорлиги, озиқа элементлар мувозанати, тупроқларнинг бошқа хосса-хусусиятларини ҳам ўзгаришига имкон яратмоқда.

Олинган натижалар асосида шундай хулоса

килиш мумкин. Қишлоқ хўжалигини олтин фонди бўлган сугориладиган қишлоқ хўжалик ер майдонларининг турли даражада деградацияга учрашининг асосий сабабларидан бири, алмашлаб ёки навбатлаб экиш тизимига риоя этилмаслиги, озиқа элементлари нисбатлари ва меъёрларининг бузилганлиги, аммо, ёкинлар тупроқлардан имкон борича озиқа элементларини ўзлаштириши оқибатида тупроқларнинг озиқа элементлари билан таъминланганлик даражаси бир гурухдан иккинчи гурухга ўтиб кетишига имкон яратилмоқда.

Юкорида келтирилган маълумотлардан ҳам мазкур ҳолатнинг сабабини кўриш мумкин, яъни бир мавсумда тупроқларга келиб тушган озиқа элементларнинг миқдоридан етиширилган ёкинларнинг ҳосил ва баъзи қисмлари билан чиқиб кетиши миқдорларининг юқорилиги шундай ҳолатга олиб келмоқда. Шунинг учун, ҳар бир гектар майдоннинг озиқа элементлари билан таъминланганлик даражаси асосида автоматик равишда минерал ўғитларни кўллашга ихтисослашган замонавий техника воситалари

(агрегатлар) ишлаб чиқиши лозим. Шундагина мувозанатини саклаш орқали экинлардан юкори ва тупроклар унумдорлигини ва озиқа элементлар салмоқли ҳосил олиш имкони яратилади.

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти

*Қабул қилинган вақти
20 марта 2019 йил*

Адабиётлар

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Московский университет, - Москва. 1970. – 490 с.
2. Агрохимические методы исследования почв. М. Изд-во «Наука», 1975. – 656 с.
3. Боиров А.Ж. Сугориладиган тупрокларда минерал ва органик ўғитларни табақалаштириб қўллаш бўйича тавсиялар. – Тошкент: ТАИТДИ, 2005. – 35 б.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари / Услубий қўлланма. – Тошкент. ЎзПИТИ, 2007. – 147 б.
5. «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель» (ТАИТИ, 2004).
6. Рискиевак Х.Т. Своеобразие азотного состояния орошаемых почв Узбекистана // Тупроқшунослар ва агрокимёгарлар III қурултойи маъзуза ва тезислар тўплами. Тошкент 2000. – Б. 38-43.
7. Ибрагимов Н.М. Пути повышения эффективности азотных удобрений на хлопчатнике в условиях орошаемых почв серозёмного пояса. Дис. д.с.х.н. – Ташкент. 2007. – 436 с.
8. Халиков Б.М. Ўзбекистоннинг сугориладиган худудларида ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни қисқа ротацияда алмашлаб экишда тупроқ унумдорлигини саклаш ва оширишнинг илмий-амалий асослари. Дисс. ... к.х.ф.д. Тошкент. ЎзПИТИ, 2007. 452 б.
9. Кўзиев Ж.М. Қашқадарё ҳавзаси бўз тупроқлар минтақаси сугориладиган тупроқларининг агрокимёвий ҳолатини яхшилаш. Дисс. ... к.х.ф.д. Тошкент. ТАИТИ, 2017. 154 б.
10. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения. – Ташкент. СоюзНИХИ, 1981. – 233 с.
11. Методы агрохимических анализов почв и растений. – Ташкент. СоюзНИХИ, 1977. – 187 с.
12. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент. СоюзНИХИ, ЦСУА, 1963. 439 с.
13. ЎзРҚВСХВ, ЎзҚҲИИЧМ ва ЎзПИТИ. Пахтачиликда маъдан ва маҳаллий ўғитларни қўллаш бўйича тавсиялар. Тошкент. «ALBIT», 2003. – 24 б.
14. Шокиров Б., Мираков М., Муродов Б. Пахтачиликда юкори ҳосил олиш технологияси. Қарши. «Насаф», 2010. –72 б.

Кузиев Ж. М.

Агрехимическое состояние типичных ледяных почв причина периодического изменения свойств

В статье приведен материал по установлению причин изменения во времени агрехимических свойств почв выбранных пилотных участков с низким, средним и высоким плодородием, а также дана сравнительная характеристика содержания элементов питания - азота, фосфора и калия в органах возделываемого хлопчатника и поступления их в почвы за период его вегетации.

Kuziev J.M. Agrochemical state typical ice soils cause periodic changes in properties

In the article, materials on agrochemical properties of soils of pilot areas selected from regions with low, medium and high fertility are given, nitrogen, phosphorus and potassium contents in cultivated cotton parts compared with the nutritional elements transferred to soils in a season, reasons for periodic change of nutrients are given.

ЛАЗЕРЛИ ТЕКИСЛАШ ТАЪСИРИДА ТУПРОҚДА ГУМУС ВА ОЗИҚА МОДДАЛАР МИҚДОРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Мақолада сұғориладиган ўтлоқи тупроқларда ўтказилған лазерли текислаш натижасда гумус ва озиқа модаларининг (N,P,K) ўзгаришига оид маълумотлар берилган. Тупроқлардаги гумус миқдори шўрланиш даражасига билан боғлиқ бўлиши, тупроқда туз миқдорининг ортиб бориши билан, ўсимликлар сонининг камайиши ҳисобига тупрокка тушадиган ўсимлик қолдиқлари кам тўпланиб бориши билан гумуснинг ва озиқа моддалар миқдорига салбий таъсири кузатилган. Текисланмаган ерга нисбатан лазерли текисланганда тупроқ катламлари ва майдон юзаси бўйича гумус, озиқа моддалар (N,P,K) бир текисда тақсимланади. Ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида лазерли текисланган майдонларда гумуснинг миқдори назоратга нисбатан 0,053-0,080%, нитрат миқдори 7,7-3,7 мг/кг кўп бўлиши аниқланган. Лазерли текисланган майдонларда ҳаракатчан фосфорнинг миқдори назоратга нисбатан кўп бўлиб, фасллар бўйича унинг устунлиги сакланиб қолади. Тупроқлар таркибидаги умумий калий ва алмашинувчи калий миқдорларига лазерли текислашнинг таъсири сезиларли даражада бўлмай, баҳордан кузга томон уларнинг миқдорини ошиб бориши, айниқса ерларни лазерли текислашда кузатилади.

Таянч сўзлар: *гумус, умумий азот, фосфор, калий, лазерли текислаш, ўтлоқи тупроқ, нитрат, тупроқ қатлами, тузлар миқдори, ўсимлик.*

КИРИШ

Мирзачўл воҳасида тарқалган тупроқларнинг карийиб 98 фоизи турли даражада шўрланган. Шу сабабли ушбу худудда тарқалган тупроқларни шўрсизлантириш ва қишлоқ хўжалик экинларидан юкори ҳосил олишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, шўрсизлантириш ва озиқа моддаларни тупроқ юзаси бўйича бир текисда тақсимланиш усулларини ишлаб чиқиши энг долзарб масалалардан ҳисобланади. Шўрсизлантириш усулларидан бири бу тупроқ юзасини лазерли текислашдир. Ҳозирги кунда бир қатор чет давлатлар Япония, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон, Миср ва бошқа давлатларда қишлоқ хўжалигида фойдаланадиган ерларда лазерли текислаш орқали тупроқка ишлов бериш усулларини кўллаш одатдаги агротехнологик тадбир ҳисобланаб, унинг тупроқ хоссаларига ижобий таъсири тадқиқотлар асосида исботланган [1- 4,7]. Кўлланиладиган озиқа моддаларнинг самардорлигини ошириш ерларни лазерли текислашда аниқ натижалар олинади, чунки сұғориладиган шароитда сувни бир хил ишлатиш озиқа моддаларни бир хил тақсимлаш имконини беради. Озиқа моддаларнинг бир хил тақсимлагандан экинларни ўсиши яхшиланади [8].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ

Тажрибалар 2010-2013 йилларда Япония қишлоқ хўжалиги фанлари ҳалқаро тадқиқот маркази (JIRCAS) олимлари билан биргаликда Сирдарё вилоятининг Мирзаобод туманидаги Янгиобод СИУ худудида тарқалган ўтлоқи тупроқларда олиб борилган. Тажриба майдони қўйидаги 2 та вариантдан иборат:

1.Вариант ер шудгор қилинади + шўри ювилади + фермер хўжалигида қабул қилинган агротехника

асосида тупроқ юзаси текисланниб қишлоқ хўжалик экинлари (ғўза ва буғдой) экилди;

2.Вариант ер шудгор қилинади + шўри ювилади + ер майдони лазерли нивелир ёрдамида текисланади + қишлоқ хўжалик экинлари (ғўза ва буғдой) етиштирилди.

Тажриба майдони тупроқларидан 52 нуктада қуидаги: 0-10(30); 30-50; 50-70; 70-100 см чукурликдаги катламлардан турли даврларда тупроқ намуналари олинниб, лаборатория шароитида чиринди Тюрин усули бўйича, ялпи азот, фосфор ва калий битта тупроқ намунасида Мешеряков, нитрат миқдори Гранвальд-Ляжу, ҳаракатчан фосфор Мачигин, алангали фотометр усулида аниқланди.

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Тупроқ унумдорлигини саклаб қолиш ва оширишда майдон юзасининг текислигига эришиш лозим. Бунда лазер нивелиридан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Тупроқ юзасини лазерли текислаш натижасида унинг юзаси бўйлаб озиқа моддалар ва сұғориш сувлари бир текисда тақсимланиши таъминланади, бу эса ўз навбатида тупроқ юзасидан пастки қатламларга озиқа элементларнинг ювилишини олдини олади.

Сұғориладиган ўтлоқи тупроқлардаги гумус миқдори шўрланиш даражасига боғлиқ бўлиб, тупроқда туз миқдорининг ортиб бориши билан, ўсимликлар жамоасининг сийраклашуви, тупроқка тушадиган ўсимлик қолдиқларининг камайиб бориши билан гумуснинг камайиши кузатилади [5].

Мирзаобод туманида жойлашган Янгиобод СИУсига қарашли сұғориладиган ўтлоқи тупроқлар шароитида 2010 йилнинг баҳорида, яъни майдон юзаси лазерли текислангандан сўнг олинган

биринчи намуналарнинг кўрсатишича ўтлоқи тупроқлар шароитида назоратга нисбатан гумус 0-30 ва 30-50 см қатламида 0,01%, ва 0,07 фоизга камайиши кузатилди (1-жадвал). Бу кўрсаткичлар ёз фаслига бориб ҳар иккала вариантда тенглашади

(0,74 ва 0,62%). Вегетация охири, яъни октябр ойида ушбу микдорлар ҳайдов қатламида (0,78-0,77 %) 0,04-0,03 фоизга ортган ва ҳайдовости қатламида (0,62-0,61%) сакланиб қолади.

Жадвал 1

Тупроқ кимёвий хоссаларига лазерли текисланнинг тъсири

Вариант №	Қатлам қалиниги, см	Гумус, %	N, %	C:N	P ₂ O ₅ , %	K ₂ O, %	NO ₃ , мг/кг	P ₂ O ₅ , мг/кг	K ₂ O, мг/кг
17-апрел 2010 йил									
1 Назорат	0-30	0,70	0,068	6,15	0,27	2,08	42,3	12,11	128
	30-50	0,61	0,058	6,10	0,26	1,96	38,7	10,91	79
	50-70	0,53	0,051	6,03	0,26	1,94	28,7	9,98	25
	70-100	0,48	0,055	5,06	0,24	1,95	23,7	9,15	18
2 лазерли текислан	0-30	0,69	0,066	5,89	0,27	2,25	50,0	11,15	92
	30-50	0,54	0,051	6,14	0,26	1,95	42,4	10,88	80
	50-70	0,54	0,054	5,80	0,24	1,95	29,1	8,94	24
	70-100	0,53	0,049	6,27	0,24	1,93	22,4	8,47	27
25-июл 2010 йил									
1 Назорат	0-30	0,74	0,072	6,05	0,22	2,27	46,6	5,11	188
	30-50	0,62	0,060	5,99	0,21	1,96	36,7	3,83	98
	50-70	0,53	0,047	6,54	0,17	1,93	28,3	2,50	46
	70-100	0,49	0,040	7,11	0,19	1,96	22,6	2,11	13
2 лазерли текислан	0-30	0,74	0,073	5,88	0,29	2,12	45,1	8,09	121
	30-50	0,61	0,061	5,80	0,26	1,89	38,2	5,67	54
	50-70	0,52	0,052	5,80	0,24	1,82	31,1	3,28	30
	70-100	0,45	0,042	6,21	0,19	1,93	23,4	2,39	18
14-октябр 2010 йил									
1 Назорат	0-30	0,78	0,074	6,11	0,25	2,67	44,6	4,61	154
	30-50	0,62	0,059	6,10	0,23	2,51	28,5	4,03	107
	50-70	0,58	0,051	6,60	0,23	2,44	23,8	3,64	44
	70-100	0,49	0,039	7,29	0,25	2,37	21,8	2,81	36
2 лазерли текислан	0-30	0,77	0,070	6,38	0,28	2,77	44,3	5,23	74
	30-50	0,61	0,059	6,00	0,24	2,62	34,2	4,58	51
	50-70	0,53	0,051	6,03	0,21	2,58	28,9	3,11	46
	70-100	0,48	0,045	6,19	0,18	2,40	22,1	2,48	32

Тажрибанинг иккинчи йилида (2011) биринчи йилга нисбатан ёз фаслида ҳар иккала вариантда ҳам гумусни ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиши натижасида бироз камайиши кузатилади, назоратнинг 0-10, 10-30 ва 30-50 см қатламларда 0,773; 0,610, 0,444% бўлиб, лазерли текисланган майдонда гумус микдорини бирмунча ошиш қонуниятини кўриш мумкин ва мос равища 0,805; 0,655 ва 0,485 фоизни ташкил этади (2-жадвал). Қишининг биринчи декадасида олинган маълумотларнинг кўрсатишича, ўтган вегетация даврида ўсимликларни лазерли текисланган майдонда яхши ўсиши ва органик моддаларнинг кўп тўпланиши ҳисобига гумуснинг назоратга нисбатан ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 0,053-0,080% ортганлигини кузатилди. Олиб борилган изланишларнинг учинчи йилида (2012) ҳам гумус назоратга нисбатан лазерли текисланган майдонда юқори микдор сакланиб қолган. Лазерли текисланган майдонларда вакт ўтиши билан гумуснинг назоратга нисбатан ортиб бориши шўрланиш даражасининг нисбатан камайганлиги ва қўлланиладиган минерал ўғитларининг тенг

таксимланиши, қолаверса, суғоришда майдон юзаси бир текис намланиши натижасида ўсимлик қоплами жадал ривожланиши ва улардан қолаётган анғиз ва илдиз кисмлари ҳисобига тупроқда колдирадиган органик қолдиқларнинг ортиши билан изохланади.

Нотекис майдон юзасида сувнинг узок вакт туриб қолиши натижасида тупроқ қатламлари сув билан тўйинади ва ғовакликлардан ҳавони сиқиб чиқарди, натижада анаэроб бактериялар фаолияти жадаллашиб, денитрификация жараёни содир бўлади. Бу жараён тупроқда ҳаво танкис, pH ишқорий ва чириб улгурмаган органик моддалар мўл бўлган шароитларда жадал кетади. Агар 1 грамм тупроқда 1млн. дона Bac. stutzeri мавжуд десак, улар 1 кечакундузда 0,5 мг азотни тупроқдан чиқариб юборади [6].

Умумий азотни гумус микдорига боғлиқ ҳолда ўзгариб бориши олинган натижалардан маълум бўлиб, тажрибанинг биринчи йилида назоратга нисбатан лазерли текисланган майдонда камайиши кузатилади. Ёз фаслига келиб азотнинг микдори ҳар иккала вариантда ҳам тенглашиши ва баҳорга нисбатан ортиши кузатилиб, лазерли текисланган

майдоннинг 0-30 см ва 30-50 см да 0,073-0,060 %, мос равища назоратда 0,072-0,061 фоизни ташкил қиласди, кузга келиб эса ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида назоратда 0,074-0,059%, лазерли текисланган майдонда 0,070-0,059 фоизни ташкил қилиб ёзда қайд этилган миқдорлар сақланиб қолганлигини кузатиш мумкин.

Ўсимликларнинг озиқланишида тупроқдаги озиқа элементларнинг харакатчан шакли осон ўзлаштирилишида муҳим ва у мавсумий характерга эга бўлиб, иклим-тупроқ намлиги ва бошқаларга боғлик равища ўзгарилиши. Сугориладиган ер майдонининг юзаси нотекислиги сабабли, суғориш ва шўр ювища сувнинг ҳамда бериладиган ўғитларнинг бир текисда тақсимланмаганлиги, ортиқча сарфланиши оқибатида озиқа элементлари турли даражада ўсимлик ўзлаштира олмайдиган қатламларга ювилиши содир бўлади, айниқса нитратларнинг ювилиши сугориладиган дехқончилик шароитида жадал кетади, осон ювилади. Азотнинг бу йўл билан исроф бўлиши иклим шароитлари, тупроқни ишлаш тизими, майдонинг ўсимлик билан тўлиқ қопланганлигига боғлик. Суформа сувларни сизот сувлари сатҳи билан туташишига йўл кўймаслик нитратлар ювилишининг олдини олишда асосий тадбирлардан ҳисобланади. Суформа сувлар натижасида тупроқнинг куйи қатламларига ювилган нитратлар сизот сувлар билан туташмаганда буғланиш жараёнида тупроқ бўйлаб юқорига кўтарилади ва ўсимликлар томонидан ўзлаштирилади. Нитратларнинг ювилиши шунингдек тупроқнинг механикавий таркиби билан ҳам боғлиқдир. Енгил механик таркибли тупроқлардан нитратлар кўпроқ ювилади. Гумусга бой тупроқлар ўзида сувни яхши тутиб туради, демак бу тупроқларда нитратлар ҳам нисбатан маҳкамроқ тутиб турилади. Тажрибанинг биринчи йили нитрат билан юқори қатламлари ўртача ва пастки қатламларга қараб камайиб боради, яъни кам таъминланган бўлиб, баҳорда ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида назоратта нисбатан (42,3-38,7 мг/кг) лазерли текисланган майдонларда (50,0-42,4 мг/кг) яъни 7,7-3,7 мг/кг кўп бўлиши кузатилди. Бунда асосан, суғоришда сув сарфининг камайиши ва экиш билан бирга озиқлантаришида минерал ўғитларнинг бир текис тақсимланиши ва кам ювилиши ҳисобига унинг миқдори ошган. Кузга бориб барча қатламлар бўйича нитратнинг камайиш қонунияти сақланиб қолганлигини кўриш мумкин. Иккинчи йил олиб борилган тажриба натижаларини таҳлили бўйича нитрат билан кам таъминланган бўлиб, ёз фаслида назоратда ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 21,4-23,9 мг/кг бўлса, лазерли текисланган майдонда 25,4-25,6 мг/кг бўлиб, кишига келиб лазерли текисланган майдонларда 21,3-21,4 мг/кг, назоратда 19,7-21,3 мг/кгни ташкил этди.

Лазерли текислангандан кейинги учинчи, яъни 2012 йилда баҳор ва ёз фаслларида ҳам назоратга нисбатан лазерли текисланган майдондаги нитратнинг кўплиги кузатилади. Баҳорга нисбатан ёз фаслида нитратнинг ортиши сугориладиган шароитда сувни ва берилган минерал ўғитларни бир хил тақсимлаш билан биргаликда тупроқда хосил бўлган аэроб шароитларга боғлиқдир.

Тупроқ юзасини лазерли текислаш таъсирида умумий фосфорнинг ўзгариши бўйича олинган натижалар кўрсатишича, тажриба ўтказилган далада умумий фосфорнинг миқдори ҳар иккали вариантда бир-бирига якин ҳамда кам, ўтказилган лазерли текаслаш унинг миқдорига кўп таъсир килмаганлигини кўрсатади.

Тажриба майдонларидан олинган биринчи йилги яъни лазерли текислаш ўтказилгандан кейинги маълумотларнинг кўрсатишича харакатчан фосфор билан жуда кам таъминланган ҳолда фасллар бўйича камайиб бориши кузатилади. Баҳор фаслида назорат вариантининг ҳайдов ва ҳайдовостки қатламларида 12,11-10,91 мг/кг, лазерли текисланган майдонда эса мос равища 11,15-10,88 мг/кг ни ташкил этган бўлса, ёзги келиб ҳар иккала майдонларда ўсимликлар томонидан фосфорни ўзлаштирилиши ҳисобига кескин камайиб назоратда 5,11-3,83 мг/кг ни, лазерли текисланган майдонда 8,09-5,67 мг/кг ташкил қилган, кузга бориб назоратда 4,61-4,03 мг/кг бўлиб, лазерли текисланган майдонда бирмунча юқори 5,23-4,58 мг/кг. Ушбу қонуният 2011 йилда ҳам сақланиб лазерли текислашда харакатчан фосфорнинг миқдори лазерли текисланганда бирмунча кўплигини кўрсатади, аммо ҳар иккала варианда харакатчан фосфор билан таъминланмаган. 2012 йил натижаларга кўра кузда солинган фосфорли ўғит ҳисобига харакатчан фосфорнинг миқдори ҳар иккала вариантда таъминланмаганлик даржасидан кам таъминланганлик даражасигача ошган. Лазерли текисланган майдонларда харакатчан фосфорнинг миқдори назоратга нисбатан кўп, март ойида 0-10 ва 10-30 см қатламда 15,2 -13,6 мг/кг, май ойида эса 17,2-14,7 мг/кг бўлиб, назоратда унинг миқдори бирмунча кам мос равища 14,3-12,3 ва 12,6-10,9 мг/кгни ташкил киласди.

Тупроқлар таркибидаги умумий калий ва алмашинувчи калий миқдорларига лазерли текислашнинг таъсири сезиларли даражада бўлмай баҳордан кузга томон уларнинг миқдорини ошиб бориши, айниқса лазерли текислашда кузатиш мумкин. Калий миқдорини ошиб боришини асосий сабабларидан берилган ўғит мъёри ва тупроқда кечеётган гидроморфизм жараёнлари билан боғлик бўлиб сизот сувларида эриган тузлар тепа қатламларида тўпланиши ушбу ҳолатни тасдиқлайди.

Лазерли текислаш таъсирида тупроқдаги харакатчан озиқа моддалар микдорини ўзгариши

Вариант №	Катлам қалин лиги, см	Гумус, %	NO ₃ , мг/кг	P ₂ O ₅ , мг/кг	K ₂ O, мг/кг	Вариант №	Катлам қалин лиги, см	Гумус, %	NO ₃ , мг/кг	P ₂ O ₅ , мг/кг	K ₂ O, мг/кг	
21-июл 2011 йил												
1 назорат	0-10	0,773	21,8	4,67	65	2 лазерли текисланган	0-10	0,805	23,9	5,71	86	
	10-30	0,610	21,2	3,86	88		10-30	0,655	26,2	6,71	100	
	30-50	0,444	23,9	3,19	100		30-50	0,485	25,6	4,89	94	
	50-70	0,383	23,2	2,82	76		50-70	0,417	22,5	2,73	70	
	70-100	0,339	22,6	2,79	48		70-100	0,363	22,6	2,02	38	
	11-декабр 2011 йил											
	0-10	0,738	20,6	4,63	142		0-10	0,785	20,9	5,25	131	
	10-30	0,575	19,2	4,51	112		10-30	0,631	21,5	6,94	106	
	30-50	0,451	21,3	4,19	121		30-50	0,531	21,4	5,28	105	
	50-70	0,347	19,6	2,94	92		50-70	0,411	22,0	3,26	117	
	70-100	0,248	21,8	2,58	80		70-100	0,263	21,5	2,33	106	
22-март 2012 йил												
1 назорат	0-10	0,806	19,9	14,3	118	2 лазерли текисланган	0-10	0,850	24,9	15,2	92	
	10-30	0,668	18,7	12,3	106		10-30	0,679	22,9	13,6	89	
	30-50	0,404	18,5	10,8	97		30-50	0,520	20,2	13,7	86	
	50-70	0,278	16,8	9,8	88		50-70	0,340	19,0	12,9	77	
	70-100	0,183	15,3	9,0	82		70-100	0,227	16,5	12,1	77	
	25-май 2012 йил											
	0-10	0,750	27,4	12,6	154		0-10	0,776	28,7	17,2	163	
	10-30	0,623	24,1	10,9	143		10-30	0,620	27,7	14,7	151	
	30-50	0,449	23,0	7,3	128		30-50	0,499	23,0	10,9	138	
	50-70	0,322	21,6	8,2	118		50-70	0,379	21,6	9,2	119	
	70-100	0,217	20,2	7,2	105		70-100	0,231	20,7	7,2	105	

ХУЛОСА

Юқоридаги маълумотлардан қўйидаги хулосаларга келиш мумкин. Лазерли текилаш усули қўлланилганда, сувдан ва озиқа моддаларидан фойдаланиш самарадорлиги ортади. Озиқа моддалар майдон ва тупроқ кесмаси бўйлаб текис таҳсимланади. Тупроқ копламидаги доғли

шўрлар ювилади, озиқа моддалар қўйи катламларга кам ювилиши ва илдиз тизими тарқалган худудда тўпланиши натижасида ўсимликларни ўсиши ва ривожланишини яхшиланиши, улардан коладиган қолдикларни кўп тўпланиши ҳисобига гумус ва озиқа моддалар микдорини ошиш қонунияти содир бўлади.

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти

Қабул қилинган вақти 5 май 2019 йил

Адабиётлар

- Ефремов А.Н. Планировка земель с применением лазерных систем. М.: ООО «Литера - Спринт», 2014.130 с.
- Ефремов А.Н. Новая машина и усовершенствованная технология планировки земель. / М.: Мелиорация и водное хозяйство. 2015, № 2. С.22-25.
- Ефремов А.Н. Импортозамещение мелиоративных машин с лазерным управлением для планировки орошаемых земель. / М.: Мелиорация и водное хозяйство. 2016, № 2. С.32-35.
- Ибрагимов Н., Рўзимов Ж., Эгамбердиев О., Акрамханов А., Руденко И., Нурметов К. Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш бўйича техник йўриқнома. // Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти қишлоқ хўжалигини барқарор ривожланишида ресурстежкамкор технологияларни оммалаштириш. Урганч, 2012. 21 б.
- Уразбаев И.У., Машарипов Н.К. - Мирзачўл воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг хосса ва хусусиятлари.//Аграп соҳани барқарор ривож лантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. «2018 йил - Фаол тадбиркорлик, инновацион форялар ва технологияларни кўллаб-куватлаш йили»га бағишланган профессор-ўқитувчи ва ёш олимларнинг II илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2018. Б.59-60.
- Сатторов Д.С. таҳрири остида Агрокимё дарслиги. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 2011.
- Юкио Окуда, Хироши Икеура, Джуния Ониши, Наото Нитта, Аюми Фукуо, Каори Шигаи. Сизот сувлари сатхи юқори жойлашган шароитда қишлоқ хўжалиги ерларида шўрланишини камайтириш тадбирлари бўйича қўлланма. Тошкент, 2013. 114 б.

8. Abdelraouf R.Eid, Mehana H. Mohamed, Sabreen Kh. Pipars, Bakry A. Bakry Impact Of Laser Land Leveling On Water Productivity Of Wheat Under Deficitirrigation Condations. / Current Research in Agricultural Sciences, 2014 Vol. 1, No. 2, pp. 53-64

Тургунов М.М., Курвантасев Р.

Изменение содержание гумуса и питательных элементов под влиянием лазерной планировки в орошаемых луговых почвах

В статье приводятся данные в результате проведения лазерной планировки орошаемых луговых почвах изменения содержание гумуса и питательных элементов (N,P,K). Содержание гумуса зависит от степени засоления, уменьшение количества растений приводит к меньшей накопление растительных остатков, негативно действует на содержание гумуса и питательных элементов. По сравнению не планированных земель с лазерной планировки по полю и слоям равномерно распределяется гумус и питательных элементов (N,P,K). Определено по сравнению контрольного варианта пахотных и подпахотных слоях наблюдается повышение гумуса 0,053-0,080%, содержание нитратов 7,7-3,7мг/кг. По сравнению контрольного с лазерной планировки содержание подвижных форм фосфора намного больше, это сохраняется во все периоды наблюдений. Влияние лазерной планировки на содержание валовых и подвижных форм калия не так заметно,

Turgunov M.M., Kurvantaev R.

Changes in the content of humus and nutrient elements under the influence of laser leveling in irrigated meadow soils

The article presents data as a result of laser leveling of irrigated meadow soils changes to the content of humus and nutrients (N, P, K). The humus content depends on the degree of salinity, a decrease in the number of plants leads to less accumulation of plant residues, negatively affects the content of humus and nutrients. Compared to unplanned lands with a laser leveling, humus and nutrients (N, P, K) are evenly distributed across the field and layers. Compared to the control version, in arable and subsurface layers, an increase in humus by 0.053-0.080%, nitrate content by 7.7-3.7 mg/kg is observed. Compared to the control variant, with laser planning, the content of mobile forms of phosphorus is much higher; this is preserved during all observation periods. The effect of laser leveling on the content of gross and mobile forms of potassium is not so noticeable; their content rises from spring to autumn, especially observed with laser leveling.

УДК: 631.43:631.459.

МУРАТКАСИМОВ А.С.

**ЭРОЗИЯГА УЧРАГАН ЛАЛМИ ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ
УМУМИЙ ФИЗИК ХОССАЛАРИ**

Лалми ерлардан самарали фойдаланиш, унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, турли агротехнологияларни кўллашда эрозия жараёнларининг тупроқнинг агрофизик хоссаларига таъсирини ўрганиш мухим аҳамият касб этиди. Ушбу мақолада лалми типик бўз тупроқларнинг эрозия жараёнлари таъсирида умумий физик хоссаларининг ўзгариши баён этилган.

Калит сўзлар: *тиpic бўз тупроқ, эрозия, ҳажм оғирлик, солиштирма оғирлик, говаклик, тупроққа ишлов бериш, агротехнология.*

КИРИШ

Тупроқнинг физик хоссалари лалми типик бўз тупроқларда кечачётган энг мухим жараёнларни тавсифини аниқлаш имкони бериб, унинг унумдорлигини аниқлашда мухим аҳамиятга эга. Тупроқнинг эрозия таъсирида физик хоссаларининг ёмонлашиши ўсимликларнинг сув, озиқа моддалари ва хаво билан таъминланишида ҳамда тупроққа ишлов бериш жараёнларини қийинлаштиради.

Лалми тупроқларнинг механик таркиби ва бошқа сув-физик хусусиятлари бўйича С.Н.Рыжов, В.Б.Гуссақ, М.Умаров, Б.В.Горбунов [5], М.А.Панков [3], Ф.Отабоев, В.Коробов [2], С.М.Маманиязов, А.С.Милосердова [1], Х.Юсупов [6] ва бошқалар томонидан ўрганилган.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ

Тадқиқотлар Фаллаорол тумани типик бўз тупроқлар шароитида танлаб олинган калит майдонлари тупроқларида олиб борилди. Тупроқни

ҳажм оғирлиги Н.А.Качинский усулида (цилиндр ёрдамида V-100 см³), тупроқни солиширима оғирлиги пикнометр усулида ҳамда тупрок ғоваклиги ҳисоблаш йўли билан амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Лалми типик бўз тупроқлар физик хоссаларининг эрозияланиш даражаси ортиши билан тупроқнинг зичлиги ортади ва буни гумус миқдорининг камайиши, ўсимликлар биомассасининг пасайиши билан боғлаш мумкин. Ҳажм оғирлик тупроқнинг юқори қатламидан куйи қатлами томон ошиб бориши кузатилди.

Эрозияланмаган типик бўз тупроқларда 1,28-1,42 г/см³, ўртача эрозияланган шимолий экспозиция тупроқларида 1,32-1,44 г/см³, ўртача эрозияланган жанубий экспозиция тупроқларида эса 1,33-1,44 г/см³ ни ташкил этди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, лалми типик бўз тупроқларнинг ҳажм оғирлиги жойлашиш экспозицияси ва нишаблик даражасига қараб ўзгариб туради. Тупроқнинг зичлиги ортиши натижасида ҳаво ва сув ўтказувчалиги ёмонлашади, бу эса ўз навбатида ўсимликларнинг сув ва ҳаво билан таъминланишига тўскенилик қиласди. Тупроқда сув ва ҳавонинг камайиши кимёвий жараёнларни секинлаштиради.

Умумий ғоваклик эрозияланмаган лалми типик бўз тупроқларда 50,4 % бўлса, ўртача эрозияланган тупроқларда 46,3-49,2 % ни ташкил этди. Ўрганилган тупроқларда солиширима оғирлик 2,58-2,67 г/см³ ни ташкил этди.

2015-2017 йилларда алмашлаб экиш даласида типик бўз тупроқларнинг баъзи агрофизик хусусиятларининг агротехнологик тадбирлар таъсирида ўзгариши ўрганилди. Тоза шудгордан сўнг 1-йил буғдой экилган тупроқларнинг зичлиги унинг ҳайдов қатламида (0-20 см) 1,22 г/см³ ни, тупроқ зичлашган ҳайдов ости қатламида эса 1,26-1,36 г/см³ ташкил этди. Тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой экилган тупроқларнинг зичлиги унинг ҳайдов қатламида (0-22 см) 1,27 г/см³ ни, ҳайдов

ости қатламида эса 1,29-1,37 г/см³ ни ташкил этган.

Фалла шудгор алмашлаб экиш схемаларида тупроқнинг солиширима оғирлиги тоза шудгордан сўнг 1-йил буғдой экилган кесмада 2,56-2,60 г/см³ ни ва умумий ғоваклиги ҳайдов қатламида 52,3% ни, пастки қатламида 47,7-51,0% ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар алмашлаб экишнинг тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой экилган тупроқларда солиширима оғирлиги 2,60-2,65 г/см³ ни ва умумий ғоваклиги ҳайдов қатламида 51,2% ни ҳайдов ости қатламида эса 48,3-50,8% ни ташкил этди.

Типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида тупроқнинг агрофизик хусусиятлари дехқончилик юритиш тизимига, яъни алмашлаб экиш схемасида ўтмишдошларга караб ўзгариб борди.

Ўзлаштирилмаган кўриқ тупроқларида тупроқнинг ҳажм оғирлиги чимли қатламда 1,29 г/см³ ни, пастки қатламларда 1,34-1,39 г/см³ ни солиширима оғирлиги тегишлича 2,62 -2,70 г/см³ ни, умумий ғоваклиги эса 48,5-52,7% ни ташкил этди.

ХУЛОСА

1. Тупроқларнинг умумий физик хоссалари эрозия жараёнлари таъсирида ўзгарганлиги кузатилган бўлиб, бу эса тупроқ унумдорлигига ва агрономик хусусиятларига таъсир этади. Қиялик экспозицияси ва нишаблигига мос равища солиширима оғирлик профил бўйлаб 2,56-2,70 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,18-1,44 г/см³ оралиғида ўзгариб туради. Солиширима ва ҳажм оғирлигига мос равища ғоваклик 45,9% дан 54,4% гача ўзгариши кузатилди.

2. Тоза шудгордан сўнг 1-йил буғдой экилган тупроқнинг зичлиги унинг ҳайдов қатламида (0-20 см) 1,22 г/см³, ғоваклиги 52,3% ни, тупроқ зичлашган ҳайдов ости қатламида эса 1,26-1,36 г/см³, ғоваклиги 47,7-51,0% ни ташкил этиб, тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой экилган тупроқларнинг зичлиги унинг ҳайдов қатламида (0-22 см) 1,27 г/см³, ғоваклиги 51,2% ни, ҳайдов ости қатламида эса мос равища 1,29-1,37 г/см³ ва 48,3-50,8% ни ташкил этган.

*Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти
Ғаллаорол илмий тажриба станцияси*

*Қабул қилинган вақти
10 май 2019 йил*

Адабиётлар

8. Маманиязов С.М., Милосердова А.С. Особенности водного режима богарных сероземов Узбекистана // Пути повышения плодородия почв и рациональное использование богарных земель в Узбекистане. Ташкент, 1974. вып. 9. – С. 79-85.
9. Отабоев Ф., Коробов В., Олейник П., Байгулов Д., Лалмикор экинлар агротехникаси. Тошкент, «Ўзбекистон», 1972. 248 б.
10. Панков М.А. Почвоведение. Укитувчи. –Ташкент, 1970. – С. 154-155.
11. Турсунов Л. Тупроқ физикаси. –Тошкент, Мехнат. 1998. 218 б.
12. Узоқов П. Тупроқшунослик. Самарқанд, 2006. 130-133 б.
13. Юсупов Х., Хайдаров Б. Алмашлаб экиш тизимида тупроқка турли усул ва чукурликда ишлов беришнинг типик бўз тупроқлар агрокимёвий таркиби ва баъзи сув-физик хусусиятларига таъсири //

Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлигини оширишда аграр фанлар ютукларининг ўрни. Республика илмий-амалий конференцияси. Самарқанд, 2009. 147-150 б.

Мураткасимов А.С.

Агрофизические свойства эрозионных богарных типичных сероземов

Изучение эффективного использование, типичных сероземов богарных земель, их сохранение повышение плодородия, получение высокого и качественного урожая при различных агротехнологических приёмов, их влияние агрофизических свойств на эрозионные процессы имеют важную значение. В данной статье описывается изменение общих физических свойств типичных сероземов под влиянием эрозионных процессов.

Muratkasimov A.S.

Agro physical features of gray soils in dry land that are exposed to erosion.

It is important to study the effect of erosion processes on the agro physical features of the soil in efficient use of dry land, preserving and enhancing fertility, higher yield and high quality crops, application of different agrotechnologies. This article describes a change of general physical features of typical gray soils in dry land under the influence of erosion processes.

УДК: 631.4

М.Э. САИДОВА, М.И.УСМОНОВА

**АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАСОЛЕННЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ
КАРАКАЛПАКИИ**

В статье представлены результаты исследований проведенных по изучению агрохимических свойств орошаемых лугово-аллювиальных почв Каракалпакии. В ходе исследований изучены изменение содержания питательных элементов под влиянием степени засоления. Неблагоприятные почвенно-климатические условия региона отрицательно влияют на основные свойства исследуемых почв и приводят к ухудшению агрохимических свойств и питательного режима почв, также к снижению их плодородия. В связи с этим выявлено, что исследуемые почвы в основном низко обеспечены по содержанию питательных элементов. В этом отношении наиболее лучшими показателями характеризуются незасоленная староорошаемая и слабозасоленная новоорошаемая лугово-аллювиальная почва. Также, четко выражена зависимость между содержанием питательных элементов и гумуса, механическим составом почвы: в более гумусированных тяжелосуглинистых разностях их больше, чем у низко гумусированных легкосуглинистых и песчаных разностей.

Ключевые слова: *регион Приаралья, степень засоления, почвенно-климатические условия, орошаемые почвы, агрохимические свойства, содержание питательных элементов, плодородие почвы, степень обеспеченности элементами питания.*

ВВЕДЕНИЕ

Экологическая катастрофа Приаралья, вызванная усыханием Аральского моря, привела к изменению и деградации природных ресурсов, в том числе и почвы. В связи с ухудшением мелиоративного состояния почв снижается и качественный признак почвы – её плодородие.

В Стратегии действия по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусмотрены следующие задачи: модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства, углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продо-

вольственной безопасности страны, прежде всего дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, принятие системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения и др. [1].

В этом отношении изучение основных свойств почв является важным условием в разработке системы мероприятий по повышению плодородия почв данного региона.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что высокая и устойчивая продуктивность земледелия возможна лишь при комплексном учете всех агрохимических и

экологических факторов, необходимых для нормального роста и развития растений, формирования урожая и его качества, недопущения деградации земель (засоление, переуплотнение, эрозия, дефляция, истощение запасов органического вещества и доступных для растений питательных элементов, загрязнение вредными веществами и т.д.).

Известно, что по мере повышения степени засоления ухудшаются все качественные признаки почв. Проявлением этой особенности является резко выраженный пустынно-континентальный климат, что во многом способствует испарению почвенной влаги в течение всего года, что приводит к накоплению солей в корнеобитаемом слое почв [4].

Поэтому, учитывая особую ценность орошаемых земель, необходимо совершенствовать уровень знания по улучшению мелиоративного состояния почвы [3].

Известно, что содержание питательных веществ в почве зависит от множества факторов: гидротермических условий, интенсивности микробиологических процессов, свойств почв (содержания органического вещества, реакции среды, влажности, температуры и др.) [2]. Эти зависимости позволяют выявлять закономерностей изменения содержания и миграции подвижных питательных элементов в различных почвенных условиях.

В настоящее время в различных почвах, особенно в условиях пустынного почвообразования, получили развитие различные деградационные процессы: опустынивание, засоление, дефляция, и связанные с ними процессы дегумификации, разрушения структуры, уплотнения почв, ухудшение биологических процессов и др., затрагивающие практически все стороны почвенных систем. Естественно, что влияние таких видов деградации, и связанных с ними изменений не могут отразиться на уровнях обеспеченности почв питательными элементами, также содержаниях подвижных форм их [5].

В этом отношении, необходимо отметить, что в повышении плодородия почв важная роль принадлежит непрерывно протекающим в почвах химическим и биологическим процессам, которые регулируют содержание и миграцию питательных элементов, и тем самым оказывают огромное влияние на доступность их для растений [6].

В этой связи нами были исследованы содержание некоторых показателей агрохимических свойств почвы в целях комплексной исследований современного состояния почв Каракалпакии.

Объектами исследования - являются засоленные орошаемые лугово-аллювиальные почвы, распространенные в Амударьинском и Чимбайском туманах Республики Каракалпакстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя агрохимические свойства изученных почв, следует остановиться о роли показателей, входящих в состав этих свойств. Известно, что содержание макро- и микроэлементов оценивают продуктивность почвы, и это свидетельствует о необходимости изучения стабильности указанных особенностей почвы в связи с ухудшением или улучшением почвенно-климатических условий, в целях установления генетических закономерностей формирования почвенного плодородия в условиях аридного почвообразования.

Известно, что при отсутствии или недостатке какого-либо питательных элементов происходит нарушение процессов обмена веществ, задерживается рост и развитие, что в конечном итоге ведет к снижению урожая и ухудшению его качества. Однако, наличие всех элементов питания еще не определяет полной возможности получения высокого и качественного урожая. Огромную роль играют уровень питания и соотношение между отдельными элементами. Причем это соотношение не должно быть постоянным на протяжении всей жизни растений, а должно меняться на различных этапах его развития.

Полученные результаты показали, что в исследуемых почвах существует определенная зависимость содержания питательных элементов от содержания гумуса, механического состава и степени засоления почвы. Четко выражена зависимость в содержании питательных элементов от механического состава почв: в тяжелосуглинистых разностях их больше, чем у легкосуглинистых и песчаных разностей. Также, с увеличением степени засоления содержание гумуса и элементов питания резко падает до минимальных величин (табл. 1).

Таблица-1

Агрохимические свойства засоленных орошаемых лугово-аллювиальных почв

Глубина горизонта, см	Гумус, %	N, %	P, %	K, %	P ₂ O ₅ , мг/кг	K ₂ O, мг/кг
Разрез-1. Новоорошаемая лугово-аллювиальная почва, слабозасоленная, массив Киличбай						
0-27	1,08	0,091	0,200	1,90	19,60	190
27-49	0,84	0,075	0,185	1,79	13,46	172
49-70	0,68	0,056	0,169	1,64	10,0	150
70-90	0,49	0,041	0,152	1,47	8,67	110

90-112	0,39	0,026	0,132	1,24	5,00	110
112-130	0,38	0,023	0,114	1,20	4,67	100
130-150	0,35	0,020	0,090	1,10	4,10	90
Разрез-10. Новоорошаемая лугово-аллювиальная почва, сильнозасоленная, массив Мангит						
0-29	0,77	0,062	0,136	1,30	14,00	123
29-48	0,88	0,070	0,133	1,15	14,20	130
48-75	0,59	0,044	0,112	1,10	11,00	90
75-90	0,34	0,020	0,050	1,10	4,00	80
90-115	0,18	0,011	0,040	0,70	3,00	60
Разрез-14. Староорошаемая лугово-аллювиальная почва, незасоленная, массив Хорезм						
0-30	1,36	0,118	0,217	2,20	33,16	271
30-50	1,02	0,096	0,188	1,85	25,80	226
50-70	0,79	0,073	0,165	1,60	14,00	180
70-100	0,48	0,034	0,140	1,30	9,40	145
100-128	0,26	0,018	0,115	1,20	4,00	110
Разрез-34. Новоорошаемая лугово-аллювиальная почва, среднезасоленная, массив Чимбай						
0-30	0,87	0,081	0,155	1,63	14,42	140
30-50	0,70	0,063	0,126	1,37	10,20	118
50-70	0,43	0,029	0,093	1,30	7,00	90
70-95	0,22	0,014	0,070	0,90	3,20	70
95-120	0,10	0,012	0,050	0,50	2,67	40

Известно, что азот находится в почвах весьма разнообразных соединениях, главным образом, в виде азота органических веществ и лишь в самых незначительных количествах в минеральной форме. Изменение содержания общего азота почвы в первую очередь связано с содержанием гумуса. В связи с бедностью исследуемых почв гумусом содержание валового азота в них также невысокое. По нашим данным во всех изученных почвах отмечено наибольшее накопление общего азота в самых верхних горизонтах и с глубиной профиля этот показатель снижается постепенно.

Например, в изученных орошаемых почвах содержание общего азота в верхнем слое составляет 0,058-0,118 %, в подпахотном слое его количество уменьшается до 0,042-0,096% в зависимости от содержания гумуса и механического состава. Вниз по профилю меняется в зависимости от содержания гумуса. С глубиной его содержание уменьшается до 0,011-0,029%.

Фосфор по значимости в питании растений является вторым после азота. Характеризуемые почвы обладают высоким содержанием валового фосфора. Как показали наши исследования, валовый фосфор в почвах колеблется в очень широких пределах 0,121-0,217%. Некоторые колебания его по профилю связаны с механическим составом пород и содержанием гумуса. Верхние горизонты чаще содержат больше валового фосфора, это вероятно связано с биологической аккумуляцией. В незасоленных и слабозасоленных орошаемых лугово-аллювиальных почвах содержание валового фосфора в верхнем горизонте колеблется от 0,170 до 0,217, с глубиной этот показатель уменьшается до 0,084-0,115 %. Также, в пахотном горизонте среднезасоленных

почв содержание его составляет 0,141-0,161%, а в нижних горизонтах 0,045-0,065%.

Основным источником питания растений фосфором являются его подвижные формы. Количество их в верхних горизонтах, исследуемых староорошаемых и новоорошаемых лугово-аллювиальных почв колеблется от 12,00 до 33,16 мг/кг, наименьшее количество подвижного фосфора содержат нижние горизонты сильнозасоленных почв. Здесь количество его варьирует от 2,00 до 3,10 мг/кг. В верхних горизонтах изученных почв содержание валового калия колеблется в пределах 1,18 - 2,20%, количество подвижного калия 93-271 мг/кг почвы.

Из полученных данных установлено, что орошаемые лугово-аллювиальные почвы более обогащены подвижным фосфором и калием, чем солончаки. Малое обеспечение питательными элементами этих почв можно объяснить с меньшим запасом корневых остатков, также можно связывать с климатом данного региона, где высокие летние температуры, низкая относительная влажность воздуха и частые ветры способствует интенсивной испаряемости влаги из почвы, в 20 раз превышающей сумму осадков. Это обуславливает интенсивному засолению почв и высокую потребность растений в поливах, и способствует накоплению малого количества запаса гумуса и питательных элементов в пустынных почвах (Почвы Республики Каракалпакстан, Книга-5).

В целом, выше приведенные материалы по агрохимическим свойствам исследуемых почв показывают на различие в количественном содержании гумуса и питательных элементов в основных типах почв Приаралья. Малое содержание гумуса и элементов питания, а также неравномерное распределение их в вертикальном профиле почв и

укороченные гумусовые горизонты являются характерными агрохимическими показателями всех гидроморфных почв пустынной зоны.

ВЫВОДЫ

Неблагоприятные почвенно-климатические особенности Приаралья, особенно наблюдающиеся за последние годы, способствуют быстрому накоплению солевых запасов в почвенной толще, что связано с низким атмосферным увлажнением. Засоление оказывает отрицательное влияние на основные свойства исследуемых почв и приводит к снижению их плодородия, при этом ухудшаются агрохимические свойства и питательный режим почв. Все исследуемые почвенные разности в основном низко обеспечены подвижными формами фосфора и калия. Исключением являются сильнозасоленные почвы и солончаки, по обеспеченности фосфором и калием, эти почвы относятся к очень низко обеспеченным.

Таким образом, с повышением степени

засоления содержание гумуса, питательных элементов и их подвижных форм снижается, что в конечном итоге ухудшается мелиоративное состояние и все свойства которые определяющие их качества. В целом выявлена зависимость содержания питательных элементов от содержания гумуса, механического состава и степени засоления почв, величины их выше в незасоленных, слабозасоленных средне и тяжелосуглинистых староорошаемых и новоорошаемых лугово-аллювиальных почвах, сравнительно низки в средне и сильнозасоленных орошаемых почвах и очень слабы в легкосуглинистых очень сильнозасоленных почвах. Все эти факторы обусловливают уменьшению плодородия исследуемых почв, в таких ситуациях особо следует обратить внимание на применяемые агротехнические мероприятия, которые не должны быть причинами нарушения использования земельных ресурсов.

Ташкентский государственный аграрный университет

Қабул қилинган вақти 10 март 2019 йил

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Бурлакова Л.М., Пивоварова Е.Г. К оценке степени деградации почв по содержанию в них подвижных питательных веществ // Аграрная наука сельскому хозяйству: Сб. статей IV международной научно-практической конференции, книга-1. Барнаул, 2009. – С. 37.
3. Жоллыбеков Б.Б. Влияние различных способов орошения и биоинтенсивных технологий на плодородие орошаемых луговых аллювиальных засоленных почв.: Автореф. дисс.... канд. с/х. наук. – Т.: 2006. – С. 3-23.
4. Кимберг Н.В. Почвы пустынной зоны Узбекистана. – Ташкент: Издательство «ФАН», 1974. – С. 298.
5. Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных регионов мира. – Москва: Наука, 2008. – С. 414.
6. Кононова М.М. Органическое вещество почвы, его природа, свойства и методы изучения. М.: Изд-во АН Р, 1963 – С. 315.
7. Почвы Республики Каракалпакстан (Чимбайский район, Книга-5). АН РУз, Институт Почвоведения и агрохимии. Ташкент, 1997. – С. 121.

**М.Э.Сайдова, М.И.Усмонова
Қорақалпоғистон Республикаси шўрланган
сугориладиган тупроқларининг агрокимёвий кўрсаткичлари**

Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси сугориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг агрокимёвий хоссаларини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Озуқа элементлари миқдорининг шўрланиш жараёнлари таъсирида ўзгариши ўрганилган. Ҳудуднинг ноқулай тупроқ-иқлим шароитлари ўрганилган тупроқларининг асосий хоссаларига салбий таъсир кўрсатади ва оқибатда агрокимёвий хоссаларини ҳамда озука режимини ёмонлашувига, шунингдек, тупроқлар унумдорлигининг пасайишига олиб келади. Бунга боғлиқ равишда барча ўрганилган тупроқлар озука элементлари мөқдори бўйича асосан кам таъминланганлиги маълум бўлди. Шунингдек, озука элементлари миқдорининг гумус миқдори ва тупроқнинг механик таркибига боғлиқ равишда ўзгариши намоён бўлди: гумусга нисбатан бой оғир механик таркибли тупроқларда кам гумусли енгил механик таркибли тупроқларга нисбатан уларнинг миқдорини кўплиги маълум бўлди.

M.E. Saidova, M.I.Usmonova
Agrochemical indicators of salted irrigated soil of the Republic of Karakalpakia

The article presents the results of studies on the study of the agrochemical properties of irrigated meadow-alluvial soils of Karakalpakia. In the course of the research, changes in the content of nutrients under the influence of salinity were studied. Unfavorable soil and climatic conditions of the region adversely affect the basic properties of the studied soils and leads to a deterioration of the agrochemical properties and nutritional regime of the soil, as well as to a decrease in their fertility. In this regard, it was revealed that the studied soils are mostly low provided for the content of nutrients. In this respect, non-saline old-irrigated and lightly saline new-irrigated meadow-alluvial soil are the best indicators. Also, the relationship between the content of nutrients and humus, the mechanical composition of the soil is clearly expressed: in more humified heavy loamy differences there are more of them than in low humified light loamy and sandy differences.

УДК: 631.46

М.Э.САИДОВА

**АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОКСИДОРЕДУКТАЗ
В ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ**

В статье приведены материалы по активности оксидоредуктазных ферментов в орошаемых лугово-аллювиальных почвах Приаралья. Как показывают данные, исследованные почвы в результате малого содержания органического вещества, подверженности к засолению и скудности растений имеют сравнительно низкую ферментативную активность. Активность их выше в слабозасоленных почвах, сравнительно низки в средне и сильнозасоленных и очень слабы в очень сильнозасоленных почвах. Сезонная динамика активности изученных ферментов орошаемых почв характеризуется весенним максимумом, летним минимумом и несколько повышением осенью.

Ключевые слова: оксидоредуктазы, плодородие почвы, окислительно-восстановительные процессы, обеспеченность ферментами, биологическое состояние почвы, орошаемые почвы, сезонная динамика, степень засоления, пустынная зона, гидротермические условия

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все больше расширяется направление исследований по изучению биологического состояния почв. Одним из наиболее информативных показателей биологического состояния почвы является ее ферментативная активность (Щербакова, 1983; Звягинцев, 1987).

Исследованиями многочисленных авторов установлено, что ферментативная активность является более устойчивым и чувствительным показателем биологического состояния почв, она характеризует интенсивность и направленность биохимических процессов и может служить дополнительным диагностическим показателем уровня плодородия почв и его изменения в результате антропогенного воздействия (Вальков, 1999; Казеев и др., 2003; Денисова и др., 2005; Ананьева и др., 2006; Евсеева и др., 2008; Даденко и др., 2013; Мясникова и др., 2015).

В этом отношении, наиболее интересны в почве ферменты класса оксидоредуктаз. Их активность дает представление о биологическом состоянии почвы (Михайловская, Миканова, 2011).

В этой связи, целью наших исследований стало изучение активности каталазы, пероксидазы и

полифенолоксидазы на орошаемых почвах пустынной зоны.

ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Были орошаемые лугово-аллювиальные почвы, распространенные в Амударьинском и Чимбайском туманах Республики Каракалпакстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В зависимости от типа и состояния почвы и географического местоположения, климатических особенностей, времени года динамика ферментативной активности почв может быть различной. Знание особенностей изменения ферментативной активности почвы во времени в конкретных экологических условиях важно для понимания общего хода биодинамических процессов в почве (Хазиев, 1982).

В пустынной зоне, где развито орошаемое земледелие одним из существенных экологических факторов, оказывающих негативное влияние на активность ферментов почв, является засоление почвы.

Как правило, на засоленных почвах биохимические процессы протекают менее интенсивно, чем на незасоленных почвах. Влияние засоления на ферментативную активность почвы

зависит от его характера и степени. Выявлено, что, исследованные орошаляемые лугово-аллювиальные почвы пустынной зоны в результате малого содержания органического вещества, подверженности к засолению и скудности растений имеют сравнительно низкую ферментативную активность (табл.1).

По мнению некоторых авторов, (Jonson, 1964; Кузнецов, 2008), более общее представление может дать определение таких ферментов, как каталазы, которым принадлежит ведущая роль в реакциях дыхательного обмена. Каталаза является одним из наиболее устойчивых и широко распространенных ферментов в природе и поэтому в некоторой степени может характеризовать состояние почвы.

Многие исследователи напрямую связывают активность ферментов, в том числе каталазы, с содержанием в почвах гумуса. Часто наибольшей активностью каталазы обладают верхние горизонты, с глубиной почвенного профиля она снижается. В условиях оптимального сочетания тепла и влаги биологические процессы, протекающие в почве, практически не снижаются в течение всего года (Казеев и др., 2002).

По результатам исследований выявлено, что по активности каталазы наиболее активными были слабозасоленные староорошаляемые и новоорошаляемые лугово-аллювиальные почвы, где содержание сухого остатка составляет 0,130-0,270 % - количество выделившегося кислорода, соответственно, равно – 2,9-4,3 мл летом – 1,8-3,3 мл, и осенью – 2,1-3,7 мл O_2 на 1г почвы за 1 мин. Несколько уступают им среднезасоленные почвы, где содержание сухого остатка колеблется от 0,320 до 0,850 %, здесь количество выделившегося кислорода составляла – 2,2-2,5 мл в весенний период, 1,3-1,7 мл - летний и 1,5-1,9 мл O_2 на 1г почвы за 1 мин осенний период. Низкая каталазная активность выявлена в сильно и очень сильнозасоленных почвах, где содержание сухого остатка достигает до 1,535-2,400%, здесь активность каталазы составляла весной 1,2-2,0, летом 0,6-1,2 и осенью 0,9-1,5 мл O_2 . Динаминость активности каталазы в течение года объясняется неодинаковыми температурными условиями, разной степенью увлажненности, наличием растительного покрова и другими факторами.

Согласно по классификации Зягинцева (1978) по степени обогащенности каталазной активности слабозасоленные староорошаляемые и новоорошаляемые лугово-аллювиальные почвы относятся к «средне обогащенным», средне и сильнозасоленные новоорошаляемые лугово-аллювиальные почвы к «бедным», новоорошаляемые очень сильнозасоленные почвы и солончаки к «оченьбедным» почвам.

Определение активности полифенолоксидазы и

пероксидазы, участвующих в процессах гумусообразования, является дополнительной характеристикой процессов синтеза и распада гумусовых веществ. Отношение активности полифенолоксидазы к пероксидазе является условным коэффициентом гумификации, и в определенной мере может характеризовать направленность этого процесса (Галстян, 1958; Мишустин, Никитин, 1961; Кононова, 1976, Tabatabai et al., 1994).

Результаты изучения пероксидазной и полифенолоксидазной активности почв показали, что активность их коррелирует с содержанием гумуса и наиболее богатыми в этом отношении являются слабозасоленные староорошаляемые и новоорошаляемые лугово-аллювиальные почвы. Здесь величина пероксидазной активности весной составляла – 3,14-4,16 и полифенолоксидазной активности 3,23-4,52 мг, 2,67-3,75 и 2,4-4,02 мг летом, осенью – 2,80-3,86 и 3,0-4,15 мг пурпургальлина/100г почвы за 30 мин. За ними следует новоорошаляемые среднезасоленные почвы, здесь их активность весной равна 2,70-2,86 и 2,73-2,89, летом 2,32-2,58 и 2,30-2,54, и осенью 2,48-2,67 и 2,52-2,70 мг пурпургальлина/100г почвы за 30 мин. Пониженная активность пероксидазы и полифенолоксидазы отмечена в новоорошаемых сильно и очень сильнозасоленных почвах, что связано с малым содержанием гумуса, высоким содержанием легкорастворимых солей. Активность пероксидазы и полифенолоксидазы у них были равны весной - 2,10-2,67 и 2,12-2,70, летом 1,68-2,27 и 1,75-2,25, и осенью 1,86-2,38 и 1,87-2,41 мг пурпургальлина/100г почвы за 30 мин. В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что активность фенолоксидазных ферментов сравнительна высока в слабозасоленных орошаемых почвах, с увеличением степени засоления активность их снижается до минимальных величин.

Несмотря на высокое содержание солей и весьма неблагоприятные условия в засоленных почвах действие оксидоредуктаз полностью не подавлены. Итак, проводимые исследования показали, что в слабо- и среднезасоленных орошаемых почвах активность изученных ферментов была выше по сравнению со сильнозасоленными разностями. Также, во время исследований прослеживалось снижение активности оксидоредуктазных ферментов с глубиной: в верхних слоях активность изученных ферментов была выше по сравнению с нижними слоями.

При изучении активности некоторых оксидоредуктаз (каталаза, пероксидаза и полифенолоксидаза) выявлено, что величины этих показателей коррелируют с содержанием гумуса, элементов питания, механического состава и

засоленности почв. Активность этих ферментов выше в слабозасоленных староорошаемых и новоорошаемых лугово-аллювиальных почвах,

сравнительно низки в среднезасоленных орошаемых почвах и очень слабы в сильнозасоленных орошаемых почвах исследуемой территории.

Таблица-1

Изменение ферментативной активности исследуемых почв по сезонам года

Глубина горизонта, см	Каталаза, мл O ₂ /1г почвы 1 мин			Пероксидаза, мг пурпургальлина/100г почвы 30 мин			Полифенолоксидаза, мг пурпургальлина/100г почвы 30 мин		
	весна	лето	осень	весна	лето	осень	весна	лето	осень
Разрез-2. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, слабозасоленная, массив Киличбай									
0-30	2,9	1,8	2,1	3,14	2,67	2,80	3,23	2,64	3,00
30-50	2,2	1,3	1,6	2,30	2,00	2,14	2,38	1,83	2,25
50-70	1,7	0,7	1,0	1,20	1,03	1,12	1,29	1,00	1,30
Разрез-10. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, сильнозасоленная, массив Мангит									
0-30	2,0	1,2	1,5	2,67	2,27	2,38	2,70	2,25	2,41
30-50	1,7	1,0	1,3	1,71	1,38	1,52	1,74	1,34	1,58
50-70	0,9	0,4	0,6	0,89	0,72	0,80	0,92	0,68	0,84
Разрез-11. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, среднезасоленная, массив Мангит									
0-30	2,5	1,7	1,9	2,86	2,58	2,67	2,89	2,54	2,70
30-50	1,8	1,0	1,3	1,95	1,67	1,78	1,98	1,65	1,80
50-70	1,0	0,4	0,7	1,27	1,04	1,16	1,30	0,96	1,20
Разрез-12. Староорошаемая лугово-аллювиальная, слабозасоленная, массив Мангит									
0-30	4,0	2,8	3,2	4,10	3,53	3,67	4,34	3,84	4,02
30-50	3,2	1,8	2,2	3,54	2,82	2,90	3,85	3,25	3,52
50-70	2,3	1,3	1,5	2,23	1,86	2,10	2,53	1,92	2,15
Разрез-16. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, очень сильнозасолен., массив Хорезм									
0-30	1,2	0,6	0,9	2,10	1,68	1,86	2,12	1,75	1,87
30-50	1,0	0,4	0,7	1,24	1,02	1,12	1,28	1,10	1,21
50-70	0,4	0,1	0,3	0,52	0,32	0,40	0,58	0,30	0,44
Разрез-28. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, слабозасоленная, массив ККНИИЗ									
0-30	4,3	3,3	3,7	4,16	3,75	3,86	4,52	4,02	4,15
30-50	3,7	2,3	2,7	3,54	3,08	3,20	3,64	3,10	3,18
50-70	2,2	1,6	1,9	2,23	1,87	2,14	2,53	1,80	2,02
Разрез-38. Новоорошаемая лугово-аллювиальная, среднезасоленная, массив Кенес									
0-30	2,2	1,3	1,5	2,70	2,32	2,48	2,73	2,30	2,52
30-50	1,6	0,8	1,1	1,81	1,47	1,60	1,84	1,40	1,64
50-70	1,2	0,4	0,6	1,05	0,75	0,90	1,10	0,71	0,95

Как показали, результаты наших исследований активность ферментов пустынных почв зависит от гидротермических условий, и наибольшие показатели их обнаруживаются во всех почвах в основном весенний период.

Возможно, это связано, с тем, что в весенние месяцы, когда в почве имеются неразложившиеся растительные остатки, достаточная влажность и оптимальная температура и бурно развиваются микробиологические процессы. Из этого следует, что активность ферментов в почвах зависит от активизации и развития почвенных микроорганизмов. Летом, в связи с малым количеством атмосферных осадков и резким повышением температуры, в почве создаются неблагоприятные условия для биологических процессов, в том числе и для активности ферментов. В конце вегетационного периода снижается чрезмерно высокая температура, и поступают растительные остатки в почву (после

вегетационного периода), в связи с этим в исследуемых почвах обнаружилась некоторое повышение активности ферментов в этот период. Из результатов исследований следует отметить, что такой характер сезонной динамики активности ферментов, закономерен для почв исследуемого региона.

ВЫВОДЫ

В целом выявлена зависимость активности ферментов оксидоредуктаз от содержания гумуса, элементов питания, механического состава и степени засоления почв, активность их выше в слабозасоленных средне и тяжелосуглинистых новоорошаемых и староорошаемых лугово-аллювиальных почвах, сравнительно низки в средне и сильнозасоленных орошаемых почвах и очень слабы в легкосуглинистых очень сильнозасоленных почвах.

В сезонной динамике ферментативной активности орошаемых почв важную роль играют и

гидротермические условия исследуемой территории, и условия орошения. Таким образом, выявлено, что орошаемые почвы имеют свой пик в весенний период, постепенно снижаются летом и несколько

повышаются осенью. При этом разницы между летним и осенним сезонами активности ферментов незначительны.

Ташкентский государственный аграрный университет

*Поступила
15 марта 2019 года*

Литература

1. Ананьева Ю.С., Воложанина Я.О., Грибов С.И. Завалишин С.И. Ферментативная активность чернозема, выщелоченного в условиях агроценоза Алтайского Приобья // Аграрная наука-сельскому хозяйству: Материалы международной научно-практической конф. Книга-1. - Барнаул, 2006. - С.46-48.
2. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Методология исследования биологической активности почв (на примере Северного Кавказа) // Научная мысль Кавказа: Научный и общественно-теоретический журнал - Ростов н/Д., 1999. - №1. – С. 32–37.
3. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы / Д.Г.Звягинцев. - М.: МГУ, 1987. – 256 с.
4. Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей // Ж: Почвоведение. 1978. - № 6. - С. 48-53.
5. Михайловская Н.А., Миканова О. Взаимосвязь активности оксидаз с содержанием разных фракций органического вещества в дерново-подзолистой супесчаной почве // Вести Национальной Академии Беларуссии, №1, 2011, Серия аграрных наук. – 2011, стр. 37-44.
6. Щербакова Т.А. Ферментативная активность почв и трансформация органических веществ / Т.А.Щербакова. - Минск: Наука и техника, 1983. – 221 с.
7. Казеев К.Ш., Козин В.К., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологические особенности почв влажных субтропиков России // Ж: Почвоведение. – Москва, Наука, 2002. - №12. – С. 1474-1478.
8. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований. Ростов-на-Дону. Издательство РГУ, 2003. 216 с.
9. Даденко Е.В., Денисова Т.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Оценка применимости показателей ферментативной активности в биодиагностике и мониторинге почв // Поволжский экологический журнал. 2013. № 4. С. 385-393.
10. Денисова Т.В., Казеев К.Ш. Восстановление ферментативной активности чернозема после воздействия γ -излучения // Радиационная биология. Радиоэкология. 2005. Т. 45. № 6. С. 1-5.
11. Мясникова М.А., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Влияние возраста залежей на биологические свойства постагрогенных почв Ростовской оласти. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. 130 с.
12. Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. – Москва: Наука, 1982. – 203 с.
13. Jonson J.L., Temple K.L. Some variables affecting the measurement of catalase activity in soil. - Soil Sci. Soc. Am. J. 28: 1964. - P. 207-209.
14. Кузнецов Ю.С. Активность каталазы в почвах аридных территорий Юга России // Материалы V съезда Всероссийского общества почвоведов им В.В.Докучаева, Ростов-на-Дон, 2008. - С. 283.
15. Мишустин Е.Н., Никитин Д.И. Атакуемость гуминовых кислот почвенной микрофлорой. Микробиология, 1961. - т. XXX, в.5, С. 841-848.
16. Кононова М.М. Формирование гумуса в почве и его разложение. Успехи микробиологов. Москва, 1976. - в.2, С. 134-151.
17. Галстян А.Ш. Определение сравнительной активности пероксидазы и полифенолоксидазы в почве. Докл. АН Армении, 1958, т.26, №5. – С. 285-288
18. Tabatabai M.A. [et al.] / Enzymes // Methods of soil analysis. Part 2. Microbiological and biochemical properties // Soil Science Society of America, Madison. – 1994, - N 5. – P. 775-833.

М.Э. Сайдова

Чўл минтақаси сугориладиган тупроқларида оксидаза ферментлари фаоллиги

Мақолада Оролбўйи худуди сугориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларидағи оксидоредуктаза ферментларининг фаоллиги бўйича маълумотлар келтирилган. Маълумотлар шуни кўрсатдики, ўрганилаётган тупроқлар органик модданинг камлиги, шўрланганлиги ва ўсимлик қопламининг сийраклиги боис нисбатан паст ферментатив фаолликка эга. Уларнинг фаоллиги кучсиз шўрланган тупроқларда юқори, ўрта ва кучли шўрланган тупроқларда нисбатан паст ва жуда кучли шўрланган тупроқларда жуда кам бўлди. Сугориладиган тупроқларда ўрганилган ферментларнинг мавсумий динамикаси баҳорда юқори, ёзда кам ва кузда бироз ошганлиги билан характерланади.

M.E. Saidova
Activity of oxidoreductase enzymes in irrigated desert zone soils

The article presents materials on the activity of oxidoreductase enzymes in irrigated meadow-alluvial soils in the Aral Sea region. As the data show, the studied soils as a result of low content of organic matter, susceptibility to salinization and plant scarcity have a relatively low enzymatic activity. Their activity is higher in slightly saline soils, relatively low in moderately and strongly saline, and very weak in very strongly saline soils. The seasonal dynamics of the activity of the studied enzymes of irrigated soils is characterized by a spring maximum, a summer minimum and a slight increase in the autumn.

УДК: 631.417

С.Қ.ОЧИЛОВ, М.М.ТОШҚЎЗИЕВ

**ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИ СУҒОРИЛАДИГАН
ГИДРОМОРФ ВА ЯРИМ ГИДРОМОРФ ТУПРОҚЛАРНИНГ КИМЁВИЙ
ХОССАЛАРИ**

Мақолада Қашқадарё воҳаси гидроморф ва ўтвучи ярим гидроморф шароитдаги сугориладиган ўтлоқи, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупрокларнинг геоморфологияси, механик таркиби, шўрланганлиги, она жинсига боғлиқ ҳолда уларда гумус ва озиқа элементларидан азот, фосфор, калийни миқдори, ҳамда карбонатлар ва гипсни тупрокларни генетик горизонтлари бўйича тақсимланиши қонуниятлари тадқиқ қилинди. Натижаларга кўра, ушбу тупроклар ўрганилган хоссалари кўрсаткичлари бўйича бир-биридан фарқланиши аниқланди.

Калит сўзлар: *гидроморф тупроқлар, гумус ва умумий азот, фосфор, калий, генетик горизант, механик таркиб, гумусли ҳолат.*

КИРИШ

Тупроқ унумдорлигини ва ишлаб чиқариш қобилиятини ошириш кўп жиҳатдан унга тўғри муносабатда бўлиш, турли салбий жараёнларни олдини олиш, тупроқ-иқлим шароитини хисобга олиш, экинларни тўғри жойлаштириш ва натижада уларнинг асосий кимёвий, физик-кимёвий, физик хоссаларини яхшилашга қаратилган бўлмоғи керак. Лекин, кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда органик ўғитларни етарлича қўлламаслик, илғор технологияларга риоя қиласлик, салбий жараёнларни олдини олиш - шўрланиш, гумусизланиш, эрозияга чалиниш ва бошқаларни хисобга олмаслик натижасида тупроқлар унумдорлиги ошмасдан, айrim ҳолларда пасайиши кузатилмоқда. Шуларни эътиборга олган ҳолда, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жадаллаштириш, ерлардан оқилона фойдаланиш, уларни кимёвий ва физикавий хоссаларини тадқиқ қилиш, тупроқ-иқлим шароити, геоморфологиясини хисобга олган ҳолда тупроқ унумдорлигини ошириш билан боғлиқ. Агротехнологик ечимларни ишлаб чиқиш мумкинdir. Биз изланишлар олиб борилаётган ҳудуд тупроқлари ҳолатини билиш шу масалалрга қаратилган бўлиб маълум даражада аҳамиятли хисобланади [1].

Республика тупроклари унумдорлигини белгилашда уларнинг гумусли, фосфорли, калийли ҳолатини билиш муҳимdir. Сўнгги йиллардаги

кузатишлиар натижаларига кўра, саҳро ҳамда бўз тупроқлар минтақаси сугориладиган тупроқларида, айниқса уларни юқори қатламларида, гумусни умумий миқдори, шунга мос ҳолда ялпи азотнинг камайиши кузатилмоқда. Шунинг билан бир вактда гумусни муҳим гуруҳи - гумин кислотаси миқдорини ҳам камайиб бориши аниқланди.[2]

Шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, республикадаги қадимдан сугориладиган ҳамда янгидан сугориладиган тупроқларида юқори агротехника қўлланилганида маданийлашган тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 1,10 - 1,30 % ва айrim ҳолларда 1,60 - 1,70 % ва ундан юқори бўлгани аниқланган.

Тупроқларга кўпроқ органик ўғитлар қўллаш, юқори даражада биомахсулот тўплаш орқали чорва молларини кўпайтириш ва кўп миқдорда органик ўғитлар тўплаб, улардан самарали фойдаланиш тупроқ унумдорлигини саклаш ва ошириш имкониятларини беради.

Тупроқ унумдорлигининг пасайиб бориши сабабларидан яна бири тупроқдан олинган озиқа элементлари ва бошқа моддаларни ўз вактида қайтариб бериш қонунини бузилганлигидир. Ҳар йили сугориладиган тупроқлардан экиладиган ғўза, донли ўсимликлар, мева, сабзавот ва полиз экинлари катта миқдорда озиқа элементларини олиб ўз танасини курди ва хосилини шакллантиради. Ҳосил билан, айrim пайтда, вегетатив қисм билан

тупроқдан олинган озиқа элементларнинг бир қисми тупроқдан олиб чиқиб кетилади [3].

Лекин тупрокнинг унумдорлигини тубдан оширмоқ учун, асосий мақсад бўлган тупрокнинг нисбатан тургун потенциал ва самарали унумдорлигини барпо килиш учун, бизнингча, тупроқда органик модданинг йигилишини асосли равишда анчагина кўпайтириш зарур. Бунинг учун, ҳозирги вактда дехқончилик амалиётида устун турдиган тупроқ - ўсимлик (экин) – биомахсулот тизими формуласини тупроқ - ўсимлик (экин) – чорва моллари – биомахсулот тизими шаклига ўтказиш лозим [3, 4].

Мазкур йўл билан агроландшафтларда тупроқ ҳосил бўлишида биологик омилнинг таъсирини ҳал қилувчи даражада кучайтириш, пировард натижада тупроқда органик модданинг кўпроқ йигилишига эришиш мумкин бўлади ҳамда бир вактда янги, ҳар хил даражада маданийлашган, потенциал унумдорликка эга бўлган тупроқлар ҳосил қилинади.

Кўргина олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, тупроқ гумуси унинг асосий хоссаларига ижобий таъсир кўрсатади.

Қашқадарё вилояти бўз ва саҳро минтақасида тарқалган тупроқлар ҳосил бўлиш жараёни тезлиги, ўзларининг генетик белгилари, келиб чиқишлирага боғлик ҳолда кимёвий, физикавий, мелиоратив жиҳатдан бошқа минтақа тупроқларидан фарқланиб туради [5].

Республика тупроқларида гумус микдори, тарқалган майдонларини таҳлилига доир изланишларимиз натижаларига кўра Қашқадарё вилояти сугориладиган тупроқлари ҳайдалма қатламларида ўтлоқи тупроқлarda гумус микдори ўртача 0,79 % захираси 32 т/га, бўз-ўтлоқи тупроқларда ушбу кўрсаткичлари мос ҳолда ўртача 0,81 % ёки 32,8 т/га ўтлоқи-бўз тупроқлarda 0,69 % ёки 27,9 т/га, ботқоқ-ўтлоқи тупроқлarda 0,95 % ёки 39,9 т/га ва ботқоқ тупроқларда 0,75 % ва 31,5 т/га эканлиги маълумотларга статистик ишлов бериш орқали аниқланди [3].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА ҚЎЛЛАНИЛГАН УСЛУБЛАР

Иzlанишлар Қашқадарё ҳавзасида бўз тупроқлар минтақасида 2 та геоморфологик районни ўз ичига олган 2 та туманда тарқалган асосий тупроқ типлари ва фарқларида 2 та танлаб олинган массивларда олиб борилди ва бунда ушбу тупроқларнинг кимёвий хоссаларини уларнинг генетик қатламлари ҳамда она жинсига боғлик ҳолда ўзгариши аниқланди.

Тадқиқотларда генетик – географик, профл – геокимёвий ва кимёвий – аналитик усусларидан фойдаланилди.[6] Тупроқларнинг кимёвий таркиби, агрокимёвий таҳлилар Е.В. Аринушкина (1970) «Руководство по химическому анализу почв»[7] услугбий қўлланмаси бўйича бажарилди. Тупроқларда гумус микдори катталиклари М.М. Тошқўзиев (2006) бўйича таснифланди [3]. Тупроқда карбонатлар ва гипс микдори Союз НИХИ, 1977 услугбий қўсатмаси бўйича бажарилди [8].

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Сугориладиган ўтлоқи ва бўз ўтлоқи тупроқлар Чирокчи тумани “Соҳибкор” массиви бўз (типик) тупроқлар минтақаси лёссимон ва пролювиал ётқизиклардан ташкил топган тоғ олди ва тоғ ости тексликлиридаги геоморфологик районда, сугориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар Қамаши тумани “Гагарин” массиви бўз типик тупроқлар минтақаси тоғ олди ва тоғ ости қия текслиги пролювиал-делювиал, баъзан алювиал ётқизиклардан ташкил топган геоморфологик районда тарқалган.

Кўйида юқорида келтирилган, турли геоморфологик районларда турли ётқизикларда таркиб топган тупроқларда ва уларнинг генетик қатламларида гумус ва асосий кимёвий элементларни тарқалиш қонуниятларига доир маълумотларга тухталинади (жадвал).

Тадқиқ этилаётган гидроморф ва ўтвичи (ярим гидроморф) тупроқларда гумус тарқалишини тадқиқ қилишга доир маълумотларга кўра, ушбу тупроқ тип, типчаларида гумусни умумий микдори геоморфологик район ва тупроқ типига боғлик ҳолда ҳайдалма қатламда кам (0,5-1 %) ва ўртача 1,0-1,5 % кўрсаткичда эканлиги ва остки қатламлар томон бир текис камайиб бориши аниқланди.

Жадвал

Қашқадарё вилояти бўз тупроқлар минтақаси гидроморф ва ярим гидроморф тупроқларининг гумумий кимёвий таснифи, %

Тупроқ номи	Кесма №	Чукурлик, см	Гумус,	Азот,	C:N	Фосфор	Калий	CO ₂	Гипс
Чирокчи тумани “Соҳибкор” массиви. Янгидан сугориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлар									
Кучсиз шўрланган оғир қумоқли	79	0-23 23-44 44-93	0,809 0,691 0,592	0,088 0,064 0,060	5,3 6,3 5,7	0,138 0,094 0,090	1,79 1,48 1,38		
Кучсиз шўрланган, ўрта қумоқли	82	0-31 31-62 62-90	1,059 1,019 0,846	0,116 0,110 0,084	5,2 5,4 5,8	0,126 0,082 0,080	1,22 1,89 1,46	8,18 6,34 8,03	

		90-120 120-150	0,689 0,466	0,075 0,050	5,3 5,4	0,078 0,075	1,40 1,40	7,39 7,39	
Янгидан сугориладиган ўтлеки тупроқлар									
Кучсиз шўрланган ўрта кумоқли	83	0-27 27-54 54-80 80-105	1,129 1,119 0,666 0,413	0,102 0,096 0,089 0,046	4,8 6,8 4,3 5,2	0,096 0,072 0,074 0,070	1,63 1,48 1,33 1,18		1,053 0,699 0,846 0,502
Қамаши тумани “Гагарин” массиви. Янгидан сугориладиган бўз-ўтлеки тупроқлар									
Кучсиз шўрланган ўрта кумоқли	84	0-29 29-50 50-73 73-85 85-114 114-160	1,117 0,902 0,828 0,612 0,558 0,257	0,102 0,062 0,060 0,046 0,040 0,030	6,4 8,4 7,9 7,7 8,1 5,0	0,092 0,090 0,087 0,078 0,075 0,075	1,98 1,77 1,24 1,20 1,15 1,10	6,59 5,44 6,12 6,71 5,55 5,40	
Кучли шўрланган енгил кумоқли	88	0-27 27-44 44-90 90-120	0,797 0,730 0,464 0,205	0,080 0,075 0,040 0,025	5,8 5,6 6,7 4,8	0,202 0,138 0,102 0,100	1,00 0,91 0,87 0,85	8,66 9,13 7,50 7,00	2,246 3,192 2,082 0,189
Кучсиз шўрланган ўрта кумоқли	97	0-40 40-64 64-89 89-123 123-170	0,720 0,440 0,335 0,360 0,334	0,100 0,055 0,045 0,040 0,035	4,2 4,6 4,3 5,2 5,5	0,188 0,152 0,134 0,156 0,85	0,86 0,87 0,95 0,85 0,95	9,19 9,65 10,46 9,06 0,082	0,095 0,025 0,074 0,115
Кучсиз шўрланган ўрта кумоқли	95	0-41 41-77 77-102 102-140	0,593 0,334 0,206 0,163	0,046 0,034 0,030 0,020	7,5 5,7 4,0 4,7	0,184 0,166 0,168 0,136	0,87 1,00 0,85 0,96	8,24 9,13 6,60 8,08	4,299 0,346 0,132 0,230

Чироқчи тумани “Соҳибкор” массивида тарқалган сугориладиган ўтлеки тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида гумус миқдори 1,129 ва 1,119 % ни, ўрта қисмида 0,666 % - ни ва она жинсида 0,413 % - ни ташкил этади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори мос ҳолда 0,162-0,096 %, 0,89 % ва 0,046 % ни ташкил этади ва юқори қатламларида азот етарли ҳисобланади. Ушбу тупроқларни юқори қатламларида C:N нисбати 4,3-6,8 бўлиб, тупроқлар гумусида азот етарли миқдорда эканлигини кўрсатади. Ҳайдалма қатламларда гумус миқдорига кўра бу тупроқлар тасниф бўйича [3] ўртача кўрсаткичга (1,0-1,5 %) тўғри келади.

Ушбу тупроқларда умумий фосфор миқдори юқори қатламларида 0,096-0,072 % бўлиб, ўрта қисми ва она жинсида 0,070-0,074 % ни, калий мос равишида 1,48-1,63 % ва 1,18-1,33 % ни ташкил этади. Ушбу тупроқларда умумий фосфор жуда кам, калий миқдори ўртача кўрсаткичга тўғри келади, гипс миқдори бўйича 0,502-1,053 % бўлиб, жуда кам ҳисобланади.

Чироқчи тумани “Соҳибкор” массивидаги сугориладиган ўтлеки-бўз тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равишида 0,809-1,059 % ва 0,691-1,019 % ни ўрта қисмида 0,592-0,846 % ни, она жинсида 0,466 % ни ташкил этади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,088-0,116 % ва 0,064-0,110 % ни, ўрта қисмида 0,064-0,084 %, она жинсида 0,050-0,075 % ни ташкил этади. Тупроқларда C:N нисбати қатламлар бўйича 5,2-6,3 бўлиб, уларнинг гумуси азотга бой ҳисобланади.

Ҳайдов қатламида гумус миқдорига кўра бу тупроқлар тасниф бўйича кам (0,5-1,0 %) ўртача (1,0-1,5 %) кўрсаткичга тўғри келади.

Ушбу тупроқларда умумий фосфор миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларда мос равишида 0,126-0,138 % ва 0,082-0,094 %, ўрта қисмида 0,078-0,090 % ва она жинсида 0,075-0,078 % ни ва калий мос равишида 1,79-1,89 %, 1,22-1,48 % ва 1,40 % ни ташкил этади. Ушбу тупроқларда фосфор миқдори жуда кам, калий ўртача кўрсаткичга тўғри келади. Со₂ карбонатлар миқдори қатламлар бўйича 6,34-8,18 % оралиғида бўлиб, ўртача карбонатли ҳисобланади.

Қамаши тумани ”Гагарин” массиви сугориладиган бўз-ўтлеки тупроқларининг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида гумус миқдори мос ҳолда 0,720-1,117 % ва 0,440-0,902 %, ўрта қисмида 0,335-0,828 %, она жинсида 0,205-0,334 ни ташкил этади. Таснифга кўра бу тупроқларнинг ҳайдов қатламларида гумус бўйича кам (0,5-1,0 %) ва ўртача (1,0-1,5 %) гумусли ҳисобланади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,046-0,102 %, ўрта қисмида 0,030-0,060 % ва она жинсида 0,020-0,035 % ни ташкил этади. Бу тупроқларда азот миқдори етарли эмас ҳисобланади. Уларда C:N нисбати қатламлар бўйича 4,2-7,5 бўлиб, гумуси азотга нисбатан бой ҳисобланади.

Умумий фосфор миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларда мос равишида 0,092-0,202 % ва 0,090-0,166 %, ўрта қисмида 0,078-0,168 %, она жинсида 0,075-0,156 %, умумий калий қатламлар бўйича мос равишида 0,86-1,98 % ва 0,87-1,77 %, ўрта қисмида 0,85-1,20 %, она жинсида 0,85-1,10 % ни

ташкил этади. Ушбу тупроқларнинг барча қатламлари фосфор ва калий бўйича кам кўрсаткичга туғри келади. Карбонатлар миқдори қатламлар бўйича асосан 5,40-7,00 %, айrim қатламларда 8,08-10,46 % ни ташкил этади ва бу тупроқлар ўртача ва юқори карбонатли хисобланади. Карбонатларнинг энг кўп миқдори тупроқларнинг ўрта қисмига туғри келади. Гипс миқдори барча тупроқлар қатламлари бўйича асосан 0,025-0,346 %, айrim қатламларда 2,082-4,299 % бўлиб гипслашмаган ва кам гипсли хисобланади.

Юқорида келтирилган маълумотларга кўра, сугориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқларнинг юқори хайдов ва ҳайдов ости қатламлари гумус бўйича кам (0,5-1,0 %) ва ўртача (1,0-1,5 %) гумусли, азот бўйича етарли кўрсаткичга, умумий фосфор бўйича кам, калий бўйича кам ва ўртача кўрсаткичга тўғри келади. Ушбу тупроқлар гумуси С:N нисбати бўйича 4,2-6,4 ва 5,3-6,3 га кўра, азотга нисбатан бой ҳисобланади.

Тупроқларда карбонатлар миқдори қатламлар бўйича 6,34-8,03 % бўлиб, ўртача карбонатли, гипс бўйича 0,502-1,053 % бўлиб, гипслашмаган ҳисобланади.

Сугориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларнинг юқори хайдов ва ҳайдов ости қатламлари кам ва ўртача гумусли ва азот бўйича етарли эмас кўрсаткичга, умумий фосфор ва калий бўйича кам кўрсаткичга тўғри келади. Ушбу тупроқлар гумуси С:N нисбатига кўра 4,2-7,5 бўлиб, азотга нисбатан бой ҳисобланади. Тупроқларда карбонатлар миқдори қатламлар бўйича 5,40-10,46 % бўлиб, ўртача ва юқори карбонатли, гипс бўйича 0,025-0,346 % асосан ва айrim қатламларда 2,082-4,299 % бўлиб, гипслашмаган ва кам гипсли ҳисобланади.

Юқорида тадқиқ қилинган ўтлоқи ва ярим гидроморф шароитдаги ўтлоқи-бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларнинг кимёвий хоссалари бўйича олинган маълумотлар ушбу тупроқларнинг хозирги кимёвий ҳолатини кўрсатиб беради ва ушбу худудда авалги ишларда олинган маълумотлар билан таққосланганда [5] яқин конуниятлар кузатилди. Изланишларда тупроқларнинг ўрганилган хоссаларига доир олинган маълумотлар асосида

аниқланган конуниятлар ушбу тупроқларнинг геоморфологиясини хисобга олиниб, ҳамда генетик қатламларида уларнинг кимёвий хоссаларини асосий кўрсаткичларини тадқиқ қилиш асосида олинди. Бу эса ушбу тупроқларда келажақда содир бўладиган ўзгаришларни башорат қилишда маълум даражада аҳамиятлидир.

ХУЛОСАЛАР

1. Қашқадарё воҳаси бўз тупроқлар минтақаси турли шароитда, турли геоморфологик районларда, ҳар хил ётқизикларда шакилланган гидроморф ва ярим гидроморф шароитдаги ўтлоқи, ўтлоқи-бўз, ва бўз-ўтлоқи тупроқларнинг асосий кимёвий хоссаларини ўзгаришини генетик горизонтлари бўйича ўрганилиши натижасида, ушбу тупроқларда гумус, азот, фосфор ва калий миқдори тупроқ типларига боғлиқ эканлиги аниқланди. Сугориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқларда гумус кўрсаткиси тасниф бўйича кам (0,5-1,0 %) ва ўртача (1,0-1,5 %) гумусли, азот бўйича етарли, умумий фосфор бўйича кам, калий бўйича кам ва ўртача кўрсаткичга тўғри келади. Тупроқларда С:N нисбати 4,3-6,8 ва 5,3-6,3 бўлиб, уларда гумус азотга нисбатан бой ҳисобланади. Сугориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларнинг юқори қатламлари кам ва ўртача гумусли, азот бўйича етарли эмас, фосфор ва калий бўйича кам кўрсаткичга тўғри келади. Ўрганилган тупроқлар С:N нисбатига кўра 4,3-6,8 ва 4,2-7,5 бўлиб, уларнинг гумуси азотга нисбатан бой ҳисобланади.

2. Ўрганилган барча тупроқлар азот ва калий бўйича кам ва ўртача, фосфор бўйича кам кўрсаткичда эканлиги, уларда ушбу элементлар миқдори юқори қатламлардан пастта томон камайиб бориши аниқланди.

3. Ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқларда карбонатлар қатламлар бўйича 6,34-8,03 % бўлиб ўртача карбонатли, ўтлоқи-бўз тупроқларда 5,40-10,46 % бўлиб, ўртача ва юқори карбонатли ҳисобланади. Гипс бўйича асосан 0,502-1,053 % ва 0,025-0,346 % бўлиб гипслашмаган, остки қатламларда 2,082-4,299 % ни ташкил этади ва кам гипслашганҳисобланади.

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти

*Қабул қилинган вақти
14 май 2019 йил*

Адабиётлар

1. Тошқўзиев М.М., Зиямухамидов Э.А. Тупроқнинг кимёвий таркибини оптималлаштириш ва унумдорлигини ошириб боришнинг назарий асослари концепцияси ва амалиётга айrim тавсиялар. Меъёрий хужжат. Тошкент-2004, 39 б.
2. Тошқўзиев М.М. «Республика асосий тупроқларида гумус миқдори ва уни сугориладиган дехқончиликда ўзгариши. Ер ресурсларидан оқилона фой-даланиш ва тупроқларни муҳо-фазалаш. Илм.-амал. анж. мав-руза ва тезислари тўпл. Т, 2001. б 188-190.
3. Тошқўзиев М.М. Тупроқдаги умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддаларини унинг унумдорлиги кўрсатгичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар. Тошкент, 2006. – 47 б.

4. Ташқузиев М.М. Зиямухамедов И.А. Шербеков А.А. Состояние органического вещества почвы и повышения ее плодородия в условиях орошаемого земледелия Узбекистана. В материалах Международной научной конф. Черновцы-2005, 120-125 с.
5. Л.Турсунов, Р.Бобоноров, А.Вакилов, С.Юсупов “Қашқадарё ҳавзаси ҳудуди тупроқлари” Тошкент-2008, 157-179 б.
6. Роде А.А. Система методов исследования в почвоведении. М: «Наука», Новосибирск, 1971, - С. 19-26.
7. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М: МГУ, 1970. – 487 С.
8. Методы агрохимических анализов почв и растений Средний Азии, СоюзНИХИ, Ташкент, 1977.

Очилиев С.К., Тошкузиев М.М.

Химические свойства орошаемых гидроморфных и полугидроморфных почв серозёмного пояса Кашкадарьинского оазиса

Изучены закономерности распределения гумуса, азота, фосфора, калия, карбонатов и гипса по генетическим горизонтам орошаемых гидроморфных и переходных полугидроморфных почв в зависимости от их геоморфологии, механического состава, степени засоления, почвообразующей породы. Установлено, что почвы отличаются друг от друга по изученным выше показателям.

Ochilov S.Q., Toshquziev M.M.

Chemical characteristics of irrigated hydromorphic and semi hydromorphic soils of Kashkadarya basin serozem soils zone

The regularities of the distribution of humus of the nitrogen, phosphorus, potassium, carbonates and gypsum over the genetic horizons of irrigated hydromorphic and transitional semi – hydromorphic soils depending on their geomorphology, mechanical composition, degree of salinity and soil-forming rock. It is established that the soil differs from each other by the parameters studied above.

УДК: 631.417

М.М.ТОШҚҮЗИЕВ, С.Қ. ОЧИЛОВ

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИ СУГОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ ВА ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

Мақолада Қашқадарё воҳаси автоморф шароитдаги сугориладиган оч тусли бўз ва типик бўз тупроқларнинг геоморфологияси, механик таркиби, шўрланганлиги, она жинсига боғлиқ ҳолда уларда гумус ва озиқа элементларидан азот, фосфор, калийни миқдори, ҳамда карбонатлар ва гипсни тупроқларни генетик горизонтлари бўйича тақсимланиши қонуниятлари тадқиқ қилинди. Натижаларга кўра, ушбу тупроқлар ўрганилган хоссалари қўрсаткичлари бўйича бир-бираидан фарқланиши аниқланди.

Тупроқ генетик қатламларида гумус ва озиқа элементлари миқдори юкори эмаслиги, гумус қўрсаткичи тасниф бўйича кам ($0,5\text{-}1,0 \%$), азот миқдори оч тусли бўз тупроқлар юкори қатламларида $0,058\text{-}0,102 \%$, типик бўз тупроқларда $0,044\text{-}0,098 \%$ бўлиб, С:N нисбатга кўра, биринчиларида гумус азотга нисбатан бой, иккинчиларида гумус азот билан етарли таъминланган. Тупроқларда умумий фосфор ва калий миқдори бўйича кам ва ўртача қўрсаткичда, карбонатлар миқдори юкори эмас, гипс миқдорига кўра асосан кам, айrim қатламлари ўртача гипслашган.

Калит сўзлар: *автоморф тупроқлар, гумус ва умумий азот, фосфор, калий, генетик горизонт, механик таркиб, гумусли ҳолат*

КИРИШ

Тупроқларнинг кимёвий хоссалари уларниг учундорлигини белгилашда катта аҳамиятга эга. Кимёвий таркиб тупроқ учундорлигига тўғридан-тўғри, шунингдек ўсимликлар ҳаётидаги муҳим томонларини белгилашда кимёвий хоссалари орқали билвосита таъсир қиласи. Бир томондан бу ўсимликлар учун муҳим бўлган у ёки бошқа озиқа

моддаларни етишмовчилиги, масалан, фосфор, азот, калий, темир ва айrim микро элементлар, ёки иккинчи томондан ўсимликлар учун токсик ҳисобланадиган ортиқчаси элементлар бўлиши мумкин [1].

Тупроқ хосил бўлишида унинг дастлабки тупроқ хосил қиласидан жинсининг кимёвий таркибидан фарқланадиан бир қатор умумий тупроқ

жараёнлари билан боғлик бўлган муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзгаришлар содир бўлади [2].

Тупроқларда содир бўладиган кимёвий жараёнлар жуда мураккаб ва турли тумандир. Бу жараёнлар тупроқларда гумус ҳосил бўлиши, уларнинг физик-кимёвий хоссаларидан сингдириши сифими, сингдирилган катионлар таркиби ва бошқа бир катор кўрсаткичларга ўз таъсирини ўтказади [3-5].

Юқоридаги маълумотларга кўра, тупроқлар хосса-хусусиятлари, улардан сугориладиган дехқончиликда фойдаланганда тупроқлар кимёвий таркибини ўрганилаётган худудни минтақавий хусусияти, тупроқларнинг литологик – геоморфологик шароити, таркиб топган ётқизиклари ва шулар асосида вужудга келган турли типга мансублиги ҳисобга олинган ҳолда ўрганиш ва уларда содир бўладиган ўзгаришларни тадқиқ қилиш муҳим ва долзарб масалалардан ҳисобланади. Айнекса ушбу йўналишдаги изланишлар, яъни саҳро минтақаси тупроқларни кимёвий хосса-хусусиятларини ҳозирги ҳолатини билиш ва уни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришга жалб қилгандан сўнг ўтган даврдаги ўзгаришни ва келажагига доир маълумотлар бериш имконини яратади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН УСЛУБЛАР

Иzlанишлар Қашқадарё ҳавзасида бўз тупроқлар минтақасида 6 та геоморфологик районни ўз ичига олган 5 та туманда тарқалган асосий тупроқ типлари ва фарқларида 6 та танлаб олинган массивларда олиб борилди ва бунда ушбу тупроқларнинг кимёвий хоссаларини уларнинг генетик қатламлари ҳамда она жинсига боғлик ҳолда ўзгариши аникланди.

Тадқиқотларда генетик-географик, профил-геокимёвий ва кимёвий-аналитик усусларидан

фойдаланилди.[2] Тупроқларнинг кимёвий таркиби, агрокимёвий таҳлилар Е.В. Аринушкина (1970) «Руководство по химическому анализу почв» [6], “Методы агрохимических анализов почви растений Средней Азии” услугбий кўлланмалари бўйича бажарилди. Тупроқларда гумус миқдори катталиклари М.М. Тошқўзиев (2006) бўйича таснифланди [4].

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Сугориладиган оч тусли бўз тупроқлар ўрганилган худудда Косон тумани “Чироқчи” номли массивида оч тусли бўз тупроқлар минтақаси лёссимон ва пролювиал ётқизиклардан ташкил топган тоғ олди тексликда, яна ҳам Нишон туман “Оқ олтин” массиви тоғ олди ва тоғ ости кенг тўлқинсимон аллювиал ва пролювиал ётқизиклардан ташкил топган ва Гузор туманидаги “М. Хасанова” массиви Гузор дарё ёйилмаларининг юкори ва ўрта қисмлари, аллювиал ва пролювиал ётқизиклардан ташкил топган геоморфологик районларда тарқалган. Сугориладиган типик бўз тупроқлар Шахрисабз туман “У. Ибрагимов” массиви пролювиал ётқизиклардан ташкил топган тоғ олди ва тоғ ости тексликлари, Китоб-Шахрисабз чўкмаси ва Қашқадарё терассасига ёндош туташган ҳамда Чироқчи туман “Соҳибкор” массиви лёссимон ва пролювиал ётқизиклардан ташкил топган тоғ олди ва тоғ ости тексликлари геоморфологик районларда тарқалган.

Куйида юқорида келтирилган, турли геоморфологик районларда турли ётқизикларда таркиб топган тупроқларда ва уларнинг генетик қатламларида гумус ва асосий кимёвий элементларини тарқалиш қонуниятларига доир маълумотларга тўхталинади (жадвал).

Жадвал

Қашқадарё вилояти бўз тупроқлар минтақаси сугориладиган оч тусли ва типик бўз тупроқларининг умумий кимёвий таснифи, %

Тупроқ номи	Кесма №	Чукурлик, см	Гумус,	Азот,	C:N	Фосфор	Калий	CO ₂ ,	Гипс,
Ғузор тумани “М. Хасанова” массиви. Янгидан Сугориладиган оч тусли бўз тупроқлар									
Ўртача шўрланган, огир қумоқли	100	0-23	0,981	0,080	8,9	0,126	1,10	7,61	0,970
		23-50	0,849	0,050	8,2	0,102	1,05	8,04	2,328
		50-74	0,391	0,038	6,0	0,100	1,13	6,42	4,106
		74-100	0,290	0,036	4,7	0,098	0,98	6,80	4,484
Ўртача шўрланган, огир қумоқли	102	0-35	0,925	0,102	5,3	0,134	1,05	7,39	0,494
		35-60	0,797	0,084	5,5	0,080	1,00	7,77	0,222
		60-80	0,414	0,052	4,6	0,076	1,00	9,87	0,132
		80-105	0,335	0,042	4,6	0,080	0,96	8,41	0,123
		105-139	0,334	0,040	4,8	0,120	0,86	8,52	
Кучсиз шўрланган, огир қумоқли	105	0-32	0,798	0,076	6,1	0,120	1,63	7,34	0,165
		32-66	0,721	0,064	6,5	0,115	1,33	8,04	0,518
		66-105	0,438	0,052	4,9	0,110	1,29	7,39	0,856
		105-140	0,412	0,078	5,0	0,090	1,21	8,84	0,580
Нишон тумани “Оқ олтин” массиви. Сугориладиган оч тусли бўз тупроқлар									
Ўртача шўрланган, Енгил, баъзан ўрта қумоқли	108	0-27	0,699	0,078	5,2	0,146	1,130	7,50	5,344
		27-57	0,598	0,062	4,8	0,124	1,163	7,34	5,340
		57-93	0,571	0,058	5,7	0,100	1,42	9,01	1,917

		93-125 125-160	0,311 0,300	0,044 0,038	4,1 4,6	0,094 0,090	1,010 1,005	8,70 7,00	0,806 0,617	
Кучсиз баъзан ўртача шўрланган, кумлоклар	114	0-37 37-64 64-96 96-125	0,489 0,313 0,258 0,207	0,064 0,042 0,036 0,300	3,5 4,3 4,2 4,0	0,188 0,170 0,134 0,120	1,20 1,10 0,98 0,95	6,80 7,60 6,40 6,00	0,181 10,05 18,36 10,84	
Кучсиз, баъзан ўртача шўрланган, енгил кумоқли		0-20 20-55 55-82 82-100 100-138	0,673 0,571 0,465 0,412 0,300	0,058 0,046 0,040 0,036 0,036	6,7 7,2 6,8 6,6 4,8	0,160 0,148 0,138 0,130 0,120	1,15 1,05 1,00 0,95 0,90	6,71 5,81 5,07 6,23 6,10	0,181 6,961 6,138 5,439 5,723	
Косон тумани “Чирокчи” массиви. Янгидан сугориладиган оч тусли бўз тупроклар										
Ўртача шўрланган, енгил кумоқли		0-28 28-56 56-84 84-109 109-145	0,940 0,674 0,624 0,441 0,363	0,076 0,076 0,068 0,052 0,044	6,2 6,3 5,3 4,1 4,8	0,186 0,140 0,140 0,135 0,130	1,25 1,17 1,05 1,00 0,95	6,71 6,12 6,12 8,61 8,10		
Кучли шўрланган, енгил кумоқли	127	0-39 39-53 53-95 95-128 128-150	0,620 0,535 0,437 0,306 0,300	0,090 0,076 0,068 0,052 0,054	4,0 4,1 3,9 3,4 3,2	0,152 0,144 0,140 0,134 0,126	1,16 1,15 1,19 1,20 1,22	7,34 6,71 7,08 6,92 6,07	0,272 3,267 2,724 1,764 0,453	
Ўртача шўрланган, енгил кумоқли		0-28 28-44 44-86 86-122 122-160	0,728 0,571 0,520 0,337 0,330	0,068 0,068 0,062 0,044 0,038	6,2 4,9 4,9 4,4 5,0	0,165 0,148 0,128 0,140 0,135	1,89 1,18 1,16 1,10 1,00	7,13 6,49 7,02 8,87 6,10	1,925 1,580 1,004 2,625 0,453	
Шахрисабз тумани “Ў.Ибрагимов” массиви. Сугориладиган типик бўз тупроклар										
Кам шўрланган, ўрта кумоқли	77	0-44 44-52 52-90 90-125	1,026 0,776 0,465 0,386	0,048 0,042 0,034 0,028	12,4 10,7 7,9 8,0	0,132 0,120 0,106 0,130	1,42 1,30 1,25 1,09	5,86 6,07 6,02 6,23	0,025 0,074 0,082 0,099	
Кам шўрланган, ўрта кумоқли		0-35 35-57 57-92 92-140	0,805 0,624 0,389 0,310	0,044 0,032 0,030 0,030	10,6 11,3 7,5 6,0	0,200 0,138 0,134 0,112	1,29 1,16 1,15 1,13	8,03 7,76 8,40 8,61	0,107 0,115 0,165 0,123	
Шўрланмаган, ўрта кумоқли		0-23 23-64 64-104 104-132 132-170	0,878 0,832 0,653 0,415 0,258	0,052 0,048 0,042 0,032 0,030	9,8 10,0 9,0 7,5 6,9	0,214 0,180 1,145 1,138 0,110	1,49 1,40 1,20 1,15 1,05	6,05 7,10 7,24 6,80 6,30		
Чирокчи тумани “Соҳибкор” массиви. Эскидан сугориладиган типик бўз тупроклар										
Кучсиз шўрланган оғир кумоқли	78	0-30 30-59 59-93 93-130	0,640 0,417 0,386 0,280	0,054 0,048 0,030 0,030	6,9 5,0 7,5 5,4	0,120 0,116 0,104 0,100	1,85 1,60 1,24 1,10	7,13 8,61 7,66 7,00	0,049 0,518 7,965 3,851	
Кучсиз шўрланган, ўрта кумоқли		0,28 28-44 44-63 63-103 103-140	0,787 0,679 0,589 0,433 0,226	0,094 0,088 0,056 0,040 0,040	4,8 4,5 6,1 6,3 3,3	0,152 0,126 0,124 0,106 0,114	1,19 1,42 1,23 1,23 1,20	6,65 6,81 7,29 8,98 8,71	0,156 0,074 0,148 0,255 0,930	

Тупроқда гумус тарқалишини тадқиқ қилишга доир маълумотларга қўра, бўз тупроклар минтақасида турли геоморфологик районларда шакилланган оч тусли бўз тупрокларда гумусни умумий миқдори юқори эмаслиги аникланди ва тупроқлар профилида генетик қатламлари бўйича бир текис камайиб бориши кузатилди. Чунончи Косон тумани “Чирокчи” массивида лёссимон ва пролювиал ётқизиқларда ташкил топган оч тусли бўз тупрокларнинг хайдалма ва хайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равишда 0,620-0,940 % ва 0,535-0,674 % ни, ўрта қисмида 0,437-0,624 % ва она жинсида 0,300-0,363 % ни ташкил

этади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,068-0,090 % ва 0,068-0,076 % бўлиб, пастга томон бироз камайиб боради. Ушбу тупроқларда C:N нисбати ҳайдов қатламларида 4,0-6,2 бўлиб, тупроқлар гумуси азотга нисбатан бой эканлигини кўрсатади. Ҳайдалма қатламидаги гумус миқдорига қўра бу тупроқ таснифи бўйича [4] кам кўрсаткичига (0,5-1,0 %) тўғри келади.

Ушбу тупроқларда умумий фосфор миқдори юқори қатламларда 0,152-0,186 %, ости қатламларда 0,140-0,148 % ни, умумий калий мос равишда 1,16-1,25 % ва 1,15-1,18 % ни ташкил этади ва тупроқларда фосфор кам, калий миқдори жуда

кам кўрсаткичда эканлиги аниқланди. Карбанатлар миқдори барча кесмаларда диярли яқин бўлиб, уларнинг генетик қатламларида 6,07-8,87 % оралиғида фарқланади, энг кўп миқдори ўрта ва остики қатламларида 7,02-8,87 % ни ташкил этади. Тупроқларда гипс миқдори асосан 0,272-1,580. Айрим қатламларда 1,925-3,267 % бўлиб жуда кам ва кам гипсли хисобланади.

Гузор тумани “М.Хасанова” массивида Фузордарё ёйилмасининг аллювиал ва пралювиал ётқизиклардан ташкил топган янигидан сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг хайдов ва хайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равища 0,798-0,981 % ва 0,721-0,849 %, ўрта қисмида 0,391-0,438 % ва она жинсида 0,290-0,412 % ни ташкил этади.

Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,076-0,102 %, ўрта қисмида 0,038-0,052 % ва она жинсида 0,036-0,078 % ни ташкил этади. Тупроқларда C:N нисбати хайдов қатламларида 5,3-7,1 ва ости қатламларида 4,7-5,0 бўлиб, уларнинг гумуси азотга нисбатан бой эканлигини кўрсатади. Айникса, ости қатламлар. Бу тупроқлар ҳам, ҳайдалма қатламларидаги гумус миқдорига кўра, тасниф бўйича кам (0,5-1,0%) кўрсаткичга тўғри келади.

Ушбу тупроқларда хайдов қатламларида умумий фосфор ва калий миқдори мос равища 0,120-0,126 % ва 0,102-0,180 %, кам кўрсаткичга тўғри келади, ости қатламлари томон камайиб боради ва 0,080-0,115 % ҳамда 0,086-1,33 % ни ташкил этади. Карбанатлар миқдори барча тупроқлар генетик горизонтларида яқин бўлиб, 6,42-9,87 % ни ташкил этади, энг кўп кўрсаткичи ўрта ва ости қатламларга тўғри келади 8,04-9,87 % ва тупроқлар ўртача карбонатли хисобланади. Гипс миқдори асосан 0,132-0,970 %, айрим қатламларда 2,328-4,484 % бўлиб, жуда кам гипсли ва кам гипслашган хисобланади.

Нишон тумани “Оқ олтин” массиви сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг хайдов ва хайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равища 0,489-0,699 % ва 0,313-0,598 %, ўрта қисмида 0,258-0,571 % ва она жинсида 0,207-0,300 % ни ташкил этади. Таснифга кўра бу тупроқларнинг хайдов қатлами жуда кам (>0,5 %) ва кам (0,5-1,0 %) гумусли хисобланади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,058-0,078 %, ўрта қисмида 0,036-0,058 % ва она жинсида 0,030-0,038 % ни ташкил этади. Тупроқларда C:N нисбати қатламлар бўйича 4,8-7,2 бўлиб, уларда гумус миқдори камлиги хисобига, азотга нисбатан бой хисобланади.

Умумий фосфор миқдори хайдов ва хайдав ости қатламларда мос равища 0,146-0,188 % ва 0,124-0,170 % бўлиб, ости қатламларда 0,090-0,134 %, умумий калий ушбу қатламларда мос равища

1,15-1,63 % ва 0,90-0,120 % бўлиб, тупроқларнинг юқори қатламида ушбу элементлар ўртача, ости қатламларида паст кўрсаткичларга тўғри келади. Карбонатлар миқдори қатламлар бўйича 6,00-9,01 % бўлиб, уларнинг энг кўпни юқори ва ўрта қисмига тўғри келади. Гипс қатламлар бўйича нотекис тақсимланган бўлиб, айрим қатламлар жуда кам гипсли 0,181-1,917 % бўлиб, асосан 5,340-10,055% оралиқда, айрим қатламларда 18,366 % ни ташкил этади ва бу кўрсаткичлари бўйича тупроқларнинг ушбу қатламлари ўртача гипслашган хисобланади.

Юқорида келтирилган маълумотларга кўра, сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг ўрганилган кўрсаткичлари бўйича кимёвий таркиби ушбу тупроқларнинг геоморфологияси, шўрланганлиги, механик таркибига боғлик ҳолда фарқланади. Барча тупроқларнинг хайдов қатламларида гумуснинг миқдори 0,5-1,0 % оралиғида бўлиб таснифга кўра кам гумусли, умумий азот миқдори гумусга мос равища 0,058-0,102 %, бўлиб, азотга камбагал хисобланади. Хайдов ости қатламларда ушбу элементларнинг миқдори бироз камайиб, ости қатламлари ва она жинсида сезиларли камайган. Шуларга мос равища ушбу тупроқларда C:N нисбати юқори қатламларда асосан 5,2-6,7 енгил механик таркибли тупроқларда 4,0-6,7 ҳамда ости қатламларда 3,2-6,0 бўлиб, ушбу қатламлар гумуси азотга нисбатан бой хисобланади. Тупроқларнинг ҳайдалма ва хайдов ости қатламларида умумий фосфор ва калий миқдори кам ва ўртача кўрсаткичга тўғри келади. Ости қатламларда яна ҳам камайиб боради. Карбонатлар миқдори тупроқларнинг генетик қатламлари бўйича асосан 6,15-0,70-9,01 % оралиғида бўлиб, ўртача карбонатли хисобланади ва уларнинг энг юқори кўрсаткичи ўрта қисми ва она жинсига тўғри келади. Гипс миқдорига кўра, асосан кам гипсли хисобланади, айрим ҳолларда ўртача гипслашган.

Шахрисабз тумани “У.Ибрагимов” массивидаги сугориладиган типик бўз тупроқларнинг хайдов ва хайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равища 0,805-1,026 % ва 0,624-0,832 %, ўрта қисмида 0,389-0,465 % ва она жинсида 0,310-0,386 % ни ташкил этади. Таснифга кўра, бу тупроқларнинг ҳайдо қатлами кам (0,5-1,0 %) ва ўрта (1,0-1,5 %) гумусли хисобланади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,044-0,052 %, ўрта қисмида 0,032-0,042 % ва она жинсида 0,028-0,030 % ни ташкил этади. Тупроқларда C:N нисбати қатламлар бўйича 6,9-12,4 бўлиб, юқори қатламларига нисбатан ости қатламларда гумус азотга нисбатан бой хисобланади.

Умумий фосфор миқдори хайдов ва хайдав ости қатламларида мос равища 0,132-0,214 % ва 0,120-0,180 % бўлиб, ости қатламларда 0,106-0,145 %, умумий калий ушбу қатламларда мос равища 1,29-1,49 % ва 1,16-1,40 % бўлиб, ости қатламларда

1,05-1,13 % ни ташкил этади. Тупроқларни юқори қатламларида фосфор ўртачадан юқори, калий ўртача хисобланади, ости қатламларда улар ўртача кўрсаткичдадир. Карбонатлар миқдори қатламлар бўйича 6,02-8,40 %, энг кўп миқдори ўрта қисми ва она жинсига тўғри келади ҳамда ушбу тупроқлар ўртача карбонатли хисобланади. Гипс миқдори генетик қатламлари бўйича 0,025-0,165 % бўлиб, гипслашмаган хисобланади.

Чирокчи тумани “Соҳибкор” массивидаги сугориладиган типик бўз тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида гумус миқдори мос равишда 0,640-0,787 % ва 0,417-0,679 %, ўрта қисмида 0,386-0,589 % ва она жинсида 0,280-0,326 % ни ташкил этади. Таснифга кўра, бу тупроқларни ҳайдов қатлами кам гумусли (0,5-1,0 %) хисобланади. Гумусга мос ҳолда юқори қатламларда умумий азот миқдори 0,048-0,094 %, ўрта қисмида 0,030-0,056 % ва она жинсида 0,030-0,40 % ни ташкил этади. Тупроқларда С:N нисбати қатламлар бўйича 4,54-7,5 бўлиб, барча қатламлари гумуси азотга бой хисобланади.

Умумий фосфор миқдори ушбу тупроқлар генетик қатламларида текис тақсимланган бўлиб, 0,120-0,152 % ни, умумий калий 1,10-1,42 % ни ташкил этади ва ушбу элементлар бўйича ўртача кўрсаткичга тўғри келади. Тупроқларда карбонатлар текис тақсимланган бўлиб, қатламлар бўйича 6,65-8,98 % ни ташкил этади, юқори миқдори ўрта қатламлари ва она жинсига тўғри келади, ўртача карбонатли хисобланади. Гипс миқдори қатламлар бўйича 0,074-7,965 % оралиғида фарқланади ва гипслашмаган, айрим қатламлари кучсиз гипслашган хисобланади.

Юқорида келтирилган маълумотларга кўра, сугориладиган типик бўз тупроқлари кимёвий кўрсаткичлари геоморфологияси, механик таркиби, шўрланганлиги бўйича фарқланади. Барча тупроқларнинг ҳайдов қатламларида гумус миқдорига кўра кам гумусли (0,5-1,0 %), умумий азот гумусга мос равишда тақсимланган бўлиб, юқори қатламларда 0,044-0,094%, остиларида 0,028-0,056 % ни ташкил этади ва С:N нисбатига (7,5-12,4) кўра, тупроқлар гумуси азот билан етарли даражада таъминланган. Тупроқларда умумий

фосфор ва калий ўртача миқдорда бўлиб, уларда карбонатлар юқори эмас, асосан ўрта қисми ва она жинсида тўпланган, кам гипсли хисобланади.

Юқорида тадқиқ қилинган худуддаги автоморф шароитдаги сугориладиган оч тусли бўз ҳамда типик бўз тупроқларнинг кимёвий хоссалари бўйича олинган маълумотлар ушбу худудда аввалги йилларда олинган маълумотлар билан таққосланганда якин қонуниятлар кузатилади [8]. Изнанишларимизда тупроқларнинг ўрганилган хоссалар бўйича олинган маълумотлар бўйича аникланган қонуниятлар ушбу тупроқларнинг геоморфологиясига боғлиқ ҳолда, генетик қатламларидаги ўзгаришларни хисобга олингани ҳолда тадқиқ қилиш асосида олинди.

ХУЛОСА

1. Қашқадарё воҳаси бўз минтақасида турли шароитда, геморфологик районларда, ҳар хил ётқизикларда шакилланган автоморф шароитдаги сугориладиган оч тусли бўз ва типик бўз тупроқларнинг асосий кимёвий хоссаларини ўрганилиши натижасида ушбу тупроқларда гумус, азот, фосфор ва калий миқдори юқори эмаслиги, уларда гумус курсаткичи тасниф бўйича кам (0,5-1,0 %), азот юқори қатламларида оч тусли бўз тупроқларда 0,058-0,102 %, типик бўз тупроқларда 0,044-0,094 % бўлиб, С:N нисбати мос ҳолда 3,2-6,7 ва 7,5-12,4 ни ташкил этиши аникланди. Шунга кўра, оч тусли бўз тупроқлар гумуси азотга нисбатан бой, типик бўз тупроқлар гумуси азот билан етарли таъминланган хисобланади.

2. Ўрганилган тупроқларда умумий фосфор ва калий миқдори сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида кам ва ўртача кўрсаткичда, типик бўз тупроқларда ўртача миқдорда эканлиги ва ҳар иккала тупроқларда ушбу элементлар миқдори ости қатламларга томон камайиб бориши аникланди.

3. Ўрганилаган тупроқларда карбонатлар миқдори юқори эмас, 5,10 - 9,87 % оралиқда бўлиб, уларнинг энг кўп миқдори тупроқларнинг ўрта қисми ва она жинсида тўпланганлиги аникланди. Гипс миқдорига кўра, тупроқлар кам гипсли, айрим қатламлар ўртача гипслашган.

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти

*Қабул қилинган вақти
20 апрель 2019 йил*

Адабиётлар

- Почвоведение, 2 час В.А.Ковда, А.Н.Розанов “Москва”-1988 г. С.150-200.
- Роде А.А. Система методов исследования в почвоведении. М: «Наука», Новосибирск, 1971, - С. 19-26
- Ташкузиев М.М., Зиямухамедов М.А. Концепция научных основ оптимизации химического состава почвы, повышения их плодородия и предложения производству, Ташкент, 2004, 40 с.
- Тошқўзиев М.М. Тупроқдаги умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддаларини унинг унумдорлиги кўрсаттичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар. Тошкент, 2006. – 47 б.
- Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И. Гумусное состояние горных, предгорных почв и вопросы

формирования гумусовых веществ. Материалы международной научно-практической конференции: «Роль почвенной науки для устойчивого развития сельского хозяйства и экологии» посвященной 90-летию академика А.М. Мамытова, Бишкек – 2017, с. 113-120.

6. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализа почв. М: МГУ, 1970. – 487 С.
7. Методы агрохимических анализов почв и растений Средний Азии, СоюзНИХИ, Ташкент, 1977.
8. Л.Турсунов, Р.Бобоноров, А.Вакилов, С.Юсупов “Қашқадарё ҳавзаси ҳудуди тупроқлари” Тошкент- 2008, 157-179 б.

Тошкузиев М.М, Очилив С.К.

**Химические свойства орошаемых светлых и типичных сероземов серозёмного пояса
Кашкадарьинского оазиса**

В статье применительно автоморфные почвы долины Кашкадарья изучены закономерности распространения гумуса, азота, фосфора, калия, а также карбонатов и гипса в генетических горизонтах орошаемых светлых и типичных сероземах, с учетом геоморфологии, механического состава, засоления и материнской пароды. Выявлены различия между этими подтипами почв в отношении изученных их свойств.

Показано не высокое содержание гумуса (0,5-1,0 %) и различия в содержании азота, порядка 0,058-0,078 % в светлых сероземах и 0,0044-0,098 % типичных сероземах, относящиеся к боли высокой обогащенности гумуса азотом и достаточной обеспеченности азотом гумуса типичных сероземов. Почвы по содержанию фосфора и калия относятся к недостаточному и среднему уровню. Количество карбонатов не высокое, по содержанию гипса характеризуются в основном, как низкогипсированными отдельные горизонты средне гипсированные.

Toshquzief M.M, Ochilov S.Q

Chemical characteristics of irrigated light and typical serozem soils of Kashkadarya basin serozem soils zone

In this article, with respect to automorphic soils of the Kashkadarya valley, regularities of the distribution of humus, nitrogen, phosphorus, potassium and carbonates and gypsum in the genetic horizons of irrigated light and typical serozems were studied, taking into account geomorphology, mechanical content, salinization and parent rock. The differences between these soil subtypes in relation to their studied properties are revealed.

Not high humus content (0.5-1.0%) and differences in nitrogen content of the order of 0.058-0.078 % in light serozem soils and 0.0044-0.098% of typical serozem soils related to high supply level of humus and nitrogen, and sufficient supply level and of nitrogen and humus in typical serozem soils are shown. The soil content of phosphorus and potassium are in low and medium level. The amount of carbonates is no high; according to the content of gypsum, they are characterized mainly as low gypsum, individual horizons are moderately gypsum.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

ЎРМОНЧИЛИК

УЎК 635.976

И.С.СОДИҚОВ, А.Х.ЎРОҚОВ, Б.К.КАСИМХАДЖАЕВ
Э.Т.БЕРДИЕВ, М.З.ХОЛМУРОТОВ

АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

Мақолада автомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштиришда манзарали дараҳт-бута ўсимликлардан фойдаланиш, уларни йўл чеккаларига жойлаштириш, экиш схемаси ва парваришлар бўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Автомобиль йўлларида кўкаlamзорлаштириш характери ўзгариши 2-3 км дан кам бўлмаслиги ва 10 км дан кўп бўлмаслиги керак. Лойихаланаётган ўсимликлар, бу худудга мослашган ўсимликлар билан бир хил бўлиши керак. Бошқа ўсимлик турларидан фойдаланиш факат контраст ва манзара хилма-хиллиги учун бўлиши керак. Уларнинг экологик жиҳатдан мослигини, чиқинди газларига нисбатан чидамлигини, йўлларнинг экплуатациясига таъсирини (гуллагандан, барги тўкилгандан, илдиз ўсиши) хисобга олиш керак.

Таянч сўзлар. *Кўкаlamзорлаштириши, автомобиль йўллари, архитектуравий-бадиий безаш, ҳимояловчи кўкаlamзорлаштириши, яшил дараҳтзорлар, ландшафтли гуруҳлар, йўл бўйи ландшафтлари.*

КИРИШ

Автомобиль йўлларини архитектура-бадиий безаш даражасини тубдан ошириш, атроф мухит муҳофазаси ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича замонавий талаблар билан ўзаро боғлик холда республика автомобиль йўллари бўйи минтақаларини ободонлаштириш ва кўкаlamзорлаштиришга ягона тизимили ва комплекс ёндашишини шакллантириш максадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 сентябрда ПҚ-3262-сонли “Автомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштириш ва архитектура-ландшафт конструкциялаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарордаги вазифалар ижросини таъминлаш ваавтомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштириш тизимини такомиллаштириш масаласи бугунги кунда автомобиль йўллари соҳасининг долзарб вазифаларидан хисобланади.

Автомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштиришнинг асосий максади йўл ва унинг элементларини нокулай ҳаво-иклимдан, йўл худуди ва атрофини транспортдан ифлосланишидан ҳимоя қилиш ва архитектура-бадиий безатишни, ҳамда ҳайдовчининг йўлни кўринишини идрок қилиши ва

харакат йўналишини мўлжалга олишини таъминлашни ташкил қилишдан иборатdir [1].

Автомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштиришнинг асосий вазифаларини кўйидагилар ташкил қиласди: йўлларни қор, кум босишидан ва чанг-тўзондан асрар; очик жойларда транспорт воситасини бошқаришни қийинлаштирадиган ён томондан эсадиган кучли шамолни тўсиш; ўйма ва кўтарма ён бағларини сув ва шамолдан емирилишидан ҳимоялаш; йўлнинг кўринишини идроқ қилиш, йўлнинг тўғри ва эгри бўлакларида йўналишини аниқлаштириш; инсонлар ва транспорт ҳаракати хафсизлигини яхшироқ таъминлаш учун шароит яратиш; йўлни атроф ландшафтига мослаштириш, табиат гўзаллигини кўрсатиш ва шунингдек, ландшафтни бойитиш; микроклиматни яхшилаш; иншоотларнинг узоқ муддат ишлашини таъминлаш [2].

Автомобиль йўлларини кўкаlamзорлаштириш асосан икки турга бўлинади: ҳимояловчи ва манзарали кўкаlamзорлаштириш. Ҳимояловчи кўкаlamзорлаштиришга кўйидагилар киради: нурашга қарши ҳимояловчи кўкаlamзорлаштириш; кордан ҳимояловчи кўкаlamзорлаштириш; қумдан ҳимояловчи кўкаlamзорлаштириш; шовқин-газ-

чангдан ҳимояловчи кўкаламзорлаштириш. Манзарали кўкаламзорлаштириш – автомобиль йўлини архитектура-бадиий кўкаламзорлаштириш учун қўлланилади [2].

Нурашга қарши ҳимояловчи кўкаламзорлаштириш автомобиль йўлларини атмосфера ёғинлари ва учириб кетувчи шамолларнинг бузувчи таъсиридан ҳимоялаш учун қўлланилади. Тупрок юзаларини нурашга қарши ҳимоялаш чораларининг самарали усуllibаридан бири, уларда илдизи 20 см ва ундан чукурроқ ўсувчи ўсимлик қатламини барпо қилиш ва натижада зич, мустаҳкам чимли қатлам ҳосил қилишдир. Ҳосил қилинган ўсимлик қатлами ҳимоя вазифасини бажаришидан ташқари автомобиль йўлларини эстетик безатиш элементи ҳам хисобланади.

Кордан ҳимояловчи кўкаламзорлаштириш йўл поини кор босишидан ҳимоялаш учун қўлланилади. Бу турдаги кўкаламзорлаштириш бир ёки бир неча тасма кўринишида, унча катта бўлмаган ҳажмли кор босиши кузатиладиган жойларда бута девор кўринишида қўлланилади. Кумдан ҳимояловчи кўкаламзорлаштириш-автомобиль йўлларини кум босишидан сақлайди ҳамда йўл бўйлаб ётувчи қумларни ўсимлик экиш билан мустаҳкамлашни ўз ичига олади.

Шовқин-газ-чангдан ҳимояловчи кўкаламзор-

лаштириш йўлнинг ахоли яшаш жойлари ва уларнинг яқинидан, курорт минтақаси худуди ёнидан, даволаниш масканлари, туризм ривожланган худудлар, кўриқхоналар, миллый боғлар ҳамда маданий қимматбаҳо қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун мўлжалланган ерлар ва бошқа жойларда қўлланилади. Бу турдаги кўкаламзорлаштириш маҳсус танлаб олинган кўп қаторли дараҳт-бутали экинлардан ташкил топади ва шовқин тарқалишини, заҳарли газлар ва йўл қопламасида тўпланувчи чангларни тарқалишини олдини олишда самарали тўсик хисобланади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИ МУҲОКАМАСИ

Йўл бўйи минтақасини комплекс ҳимоялаш талабларига биноан яшил экинларни асосий кўрсатгичлари қуйидаги тартибдан иборат бўлади: тасма кенглиги – 10 м дан кам бўлмаган; дараҳт баландлиги 7-8 м дан кам бўлмаган; буталар баландлиги – 1,5-2 м дан кам бўлмаган [3]. Шовқин-газ-чангдан ҳимояловчи яшил тасма барпо қилиш учун дараҳт турларини танлашда уларнинг автомобильлардан чиқаётган газларга таъсирини инобатта олиш лозим. Амалдаги йўриқномага асосан ҳимоя тасмаларини яратиш 1-жадвалда келтирилган кўрсатгичлар билан характерланади [2].

1-жадвал

Яшил дараҳтзорларни шовқин камайишига таъсири

Ҳимоя тасмаларини турлари	Шовқин дараҷасини камайтириш, дБА, ҳаракат жадаллиги авт/соат бўлганда				Қайта ишланган газлар концентрациясини камайтириш, %
	200	600	1200	>1600	
Баргли дараҳтлар буталар билан кенглиги 10 м бўлган уч қаторли тасма	7	8	8	8	40 – 50
Баргли дараҳтлар буталар билан кенглиги 10 м бўлган тўрт қаторли тасма	8	9	9	9	50 – 60
Шахмат шаклидаги иғнабаргли дараҳтлар буталар билан кенглиги 20 м бўлган тўрт қаторли тасма	15	17	17	18	50 – 60
Шахмат шаклидаги баргли дараҳтлар буталар билан кенглиги 20 м бўлган беш қаторли тасма	15	18	18	19	60 – 70

Манзарали кўкаламзорлатириш автомобиль йўлини атроф-муҳит табиати билан уйғулигини кўчайтириш мақсадида амалга оширилади. У ўз таркибига фақат янги дараҳт ва буталарни экиш эмас, балки атроф ландшафтiga органик мос тушувчи ёки эътиборсиз жойларни ёпиб турувчи йўл бўйи тасмаларидаги мавжуд ўсимликларни сақлаш, кўшимча янги кўчатлар экиш ва сақлашни ҳам олади.

Мавжуд боғ-парк услуги ва махаллий шароитга мос ҳолда манзаравий кўкаламзорлаштиришда учта асосий усул қўлланилади:

тартибли (қаторли ёки кўп қаторли экиш), ландшафт-гурухли (ёки эркин) ва аралаш [3].


Тартибли усул буталар, тўғри ёки эгри чизиқли бир хил қаторли дараҳтларни қатъий аниқланган жойлашишини кўзда тутади. Алоҳида турдаги ўсимликлар қатори ёки уларни гурухлари орасидаги масофа мавжуд безатишли йўл бўллаги бўйича доимий қолади. Бу усул йўлнинг текис жойдан ётувчи ёки маҳсус безатилган йўлларда, шаҳар ва ахоли яшаш жойларига кириш ва ахоли яшаш жойларида қўлланилади (1-расм).



1 – расм. Дараҳтларни тартибли экиш (қаторли).

Ландшафт-гурӯхли (ёки эркин) усул дараҳт ва буталарни алоҳида элемент кўринишида ва ҳар хил ўлчамдаги гурӯхларни эркин (тасвирий) жойлаштириш кўзда тутади. Бу усул асосан


йўлнинг адирили ёки тўлқин рельефли худудларидан ўтган жойларда кўлланилади [4]. Ландшафт-гурӯхли усулидан фойдаланишга мисоллар 2-расмда келтирилган.



2 – расм. Дараҳт ва буталарни монотон экиш ортида ландшафт-гурӯхли жойлаштириш.

Аралаш усулда дараҳтларни тартибли ва ландшафт-гурӯхли экишни ташкил этиш

хисобланади (3-расм). Бу усул бир текис рельефли туманларда кўлланилади.



3-расм. Автомобиль йўлларини аралаш усул билан манзарали кўкаламзорлаштиришга мисол: 1 – химоя тасмаси; 2 – дараҳтларни тартибли экиш; 3 – ландшафт-гурӯхли экиш.

Бунда асосан қуидаги кўринишлар кўлланилади: тартибли экилган қаторларда ландшафтли гурухларни нотекис жойлаштириш; тартибли экинлар ва йўл орасидаги (қаторли экиш ортида) эркин тасмада ландшафтли гурухларни нотекис жойлаштириш; ландшафтли гурухларни ва тартибли экинларни йўлларни кесишиш жойларида, дарё, жарликлар ва бошқалар кесишган жойларда жойлаштириш.

Манзара самарали бўлиши ва дарахтларни эркин ривожланиши учун экилган дарахтнинг катталигига боғлиқ ҳолда қаторлар ва дарахтлар орасидаги масофа 5 м дан 20 м гача қабул қилинади. Ёш кўчаларни экишда уларда манзарани тезроқ ривожлантириш учун дарахтлар ва қаторлар орасидаги масофа кичикроқ (энг катта масофадан 2-4 марта кам) қабул қилинади. Автомобиль йўлларини манзарали кўкаламзорлаштириш учун 4-6 ёшдаги кўчатлар ва 2-3 ёшдаги буталар кўлланилади [5, 6].

Максус турдаги экинлар автомобиль йўларининг ажратувчи тасмасини кўкаламзорлаштиришда фойдаланилади. Бу кўкаламзорлаштириш тури йўлларни архитектура-тасвирий безатишдан ташқари ҳаракат хавфсизлигини оширишда ҳам кўлланилади. Коида бўйича ажратувчи тасмага бир биридан 20-30 м, йўл четидан эса камида 1,75 м масофада жойлашувчи тўлиқ бута ёки кўндаланг тасма (бир ёки икки қаторли девор) кўринишида экиш амалга оширилади. Бундай кўчатлар қарама-қаршидан келаётган автомобилларни ёритиш чироклари нурларидан саклайди [6].

Ҳаракат хавфсизлиги шароитидан келиб чикиб, кўриш масофасини таъминлаш ва ҳайдовчилар йўналишни идрок этиши учун эгрининг ташки қисмида экилган дарахтлар қуюқлаштирилади ва ички томонидан сийраклаштирилади ёки умуман экилмайди. Күёш ёритганда улар қопламада ҳайдовчини чарчатадиган соялар тасмаларини пайдо қиласди. Дарахтлар ораси 2-3 м ва ҳаракат тезлиги 80-100 км/соат бўлганда нокулайлик сезилади [7].

Манзарали кўкаламзорлаштириш объектнинг атроф-муҳит билан уйғуллашувини кучайтиришга мўлжалланган бўлиб, транспорт иншоотининг меъморий-бадиий безалиши учун кўлланилади. Манзарали кўкаламзорлаштириш нафақат янги дарахтлар ва буталарни экишни, балки йўлнинг бошқа қисмидаги мавжуд ўсимликларни саклаб қолишни, атрофдаги манзарага органик равишда мос келадиган янги экинларни қўшишни вакўримсиз жойларни ёпишни (бекитишни) ўз ичига олади.

Кўкаламзорлаштириш характериўзгарishi 2-3 км дан кам бўлмаслиги ва 10 км дан кўп бўлмаслиги керак. Лойиҳаланаётган ўсимликлар, бу ҳудудга мослашган ўсимликлар билан бир хил бўлиши керак. Бошқа ўсимлик турларидан фойдаланиш

фақат контраст ва манзара хилма-хиллиги учун бўлиши керак. Уларнинг экологик жиҳатдан мослигини, чиқинди газларига нисбатан чидамлигини, йўлларнинг эксплуатациясига таъсирини (гуллаганда, барги тўкилганда, илдиз ўши) хисобга олиш керак [6].

Қаторли дарахтларни йўл пойи четидан 5 м дан яқинроқ масофада жойлаштириш тавсия этилмайди. Хиёбонлардаги алоҳида дарахтлар орасидаги масофа танланган дарахт турларига караб, бир-биридан 10 дан 15 метргача оралиқда танланади [7, 8].

Янги қурилган магистрал йўлларда куйидаги сабабларга кўра экишнинг хиёбонли (аллея, йўл икки четига қатор дарахтларни экиш) тури тавсия этилмайди: хиёбонлар келажакда йўлни кенгайтириш имкониятини чеклайди; айrim ҳолларда, ҳалокатсиз йўлдан чиқиб кетишга имкон бермайди; йўловчилардан атрофдаги ландшафтни беркитади; йўлда кўриниш ёмонлашади, кузда барглар тушиши туфайли қўшимча қоплама устки юзасида сирпаниш хавфи пайдо бўлади; куёшли кунда ҳайдовчининг кўришини камайтирувчи ҳамда чарчатувчи, қоплама устки юзасида доғли соя пайдо бўлади [7].


Хиёбонли (аллея) экиш фақат асосий йўллардан бирор бир обьектга, масалан, тураг-жойга, саноат ва ижтимоий корхонага, ёдгорликка, туризм ривожланган ҳудудга ва бошқаларга кирадиган йўлларда тавсия қилинади. Йўл четидан манзарали табиий обьектлар - кўллар, дарёлар, боғлар, монументал тузилмалар мавжуд жойларда - хиёбон тузилиши ҳамда ҳудуддаги обьектни ансамбли бошлангани сезилиши керак.

Гурухли экишни энг мақбул кўкаламзорлаштириш шакли деб хисоблаш керак. Ушбу турдаги кўкаламзорлаштириш бирон бир обьект яқинида ҳар қандай режа ва кесимда амалга оширилиши мумкин. Гурухли ўсимликлар ҳайдовчиларнинг диккатини муҳим нуқталарга қаратиши керак – булар автобус бекати, эгри боши, айрилишлар, дам олиш жойи, кўприк ва бошқалар.


Ўймада гурухли экиш ён бафр қиялигини тепа қисмида ва кўтармада йўл пойи пастки қисмида амалга оширилади. Автомобиль йўлларида ҳаракат шароитига, йўл белгиларининг яхши кўринишига ва йўлларни саклаш механизмларининг ишлашига таъсир қиласлиги учун дарахтлар ёки буталарни йўл ёқасига экишга йўл қўйилмайди. Тартибли экиш йўлнинг бир ёки икки четига уларнинг вазифасига боғлиқ ҳолда, лекин йўл четига 5 м дан яқин бўлмаган масофада [7] жойлаштирилади (4-расм).

Мавжуд эгри участкаларда эгрининг ички қисмида кўрнишни таъминлаш мақсадида қаторли экиш тавсия этилмайди. Хиёбонларда алоҳида дарахтлар орасидаги масофа дарахт туридан келиб чиқсан ҳолда 10-15 м ни ташкил қиласди [6]. Реконструкция қилинаётган йўлларда қаторли экиш

турлари тавсия этилмайди. Қаторли экиш асосий этилади (5-расм). Йўлга айрим объектлардан чиқиш жойларида рухсат



4-расм. Дараҳтларни қатнов қисми чети ва йўл пойи қирғогига нисбатан жойлашуви:
а – нолинчи белгид; б – кўтартмада; в – ўймада.




5 –расм. Асосий йўлга чиқиш жойида қаторли экиш.

Кўкаlamзорлаштиришни мақсадга мувофиқ шакли гурухли экиш ҳисобланади (6 – расм). Гурухли экиш ҳам қатнов қисми четига 5 м дан яқин бўлмаган масофада жойлаштирилади. Йўл ёқасига экиш тавсия этилмайди.


Йўлнинг тўғри участкасида гурухли экиш эркин композицияда жойлаштирилади (7-расм). Йўлнинг эгри участкаларида трасса йўналишини

оптик қабул қилиш учун эгрининг ташқи томонига зич гурухли экиш тури, ички қисмiga эса алоҳида буталарни (агар баланд ўсувчи дараҳтлар буталарни “яшаб кетиш” хисобини ва улар орасида ривожланиш холосасини берса) экиш тавсия этилади. Бундай ҳолларда кўчатлар йўналтирувчи вазифасини бажаради (8-расм).




6 –расм. Гурухли экишга мисоллар:

а, б, в – ҳар хил турдаги олди бутали гурух; г – дараҳтлардан иборат бўлган бир турдаги мустақил гурух; д – шунга ўхшаш гурух; е, ж – тўрт дараҳтдан иборат бўлган гурух (мустақил гурухга ўхшаш); з – бутали гурух.




7 – расм. Йўлнинг тўғри участкасидаги гурухли экиш



8 – расм. Йўлнинг эгри участкасидаги йўналтирувчи гурухли кўчатлар

Ўймаларни кўкаламзорлаштириш учун буталарни гурухли ўтқазишдан фойдаланилади (9-ўйманинг юқори қисмida жойлашган дараҳт ва расм).




9 – расм. Ўймаларни гурухли экиш билан кўкаламзорлаштириш:
а – режа; б – кўндаланг кесим.

Йўлларнинг кесишиш ва ажралиш жойларидағи кўчатлар уларни характерини белгилаши лозим, лекин кўринишликка тўсқинлик қилмаслиги шарт (10-расм).

Кўприкларни кириш жойларини кўкалам-

зорлаштиришда коида бўйича курилиш даврида бузилган табиий ландшафтни қайта тиклаш ва яхши кўриниш шароитини ташкил этиш вазфалари очилади.




10 – расм. Йўл туташмаларини кўкаламзорлаштириш:
1 – ўт экиш ва паст бўйли экинлар; 2 – дараҳт ва буталарнинг зич экилган қатори.


Автомобиль магистраларининг ажратувчи тасмасида майсазор билан бирга буталарнинг кўндаланг экиш тавсия этилади. Бундай экиш тури ажратувчи тасма чегараларини аниқ кўринишида ва ҳайдовчиларни кўзларини қаршидан келаётган автомобильларнинг ёритиш чироқларидан қамашишини олдини олишни таъминлайди. Кўчатлар орасидаги масофа 20–25 м, баландлиги эса 1,0 – 1,2 м бўлиши шарт, буталар ҳар йили кесиб турилади. Бута кўчатлари 45° бурчак остида

жойлаштирилади [6].

Йўллардаги тасвирий жойларни шарҳлашда, хисобий харакат тезлиги 100 км/соат бўлганда узилган жой кенглиги $l_p=100$ м, лойиха бўйича эса бундан кўп, мисол учун 120 – 150 м. Аксинча, йўллардаги карьеерларни беркитишида карьеердан чиқиш жойларини ёпмаган холда узилган жой кенглиги чегаравийдан камроқ бўлади. Бу холда узилган жой кенглиги 60 м атрофида бўлади (11-расм) [6].



11 – расм. Йўлдаги экинларнинг узилган жойи кенглигини аниқлашга мисол.
а – манзара кўринишини очиб бериш мақсадида (узилган жой кенглиги чегаравийдан кўп);
б – манзаралаштириш мақсадида (узилган жой кенглиги чегаравийдан кам).



12 - расм. Режадаги эгрида йўналтирувчи дараҳтлар: а – радиуси кичик эгриларда; б – кичик бурчакли ва бурилиш радиуси катта эгриларда.

Йўналтирувчи дарахтлар ҳаракат йўналиши ўзгаришини кўрсатади ва узоқдан ҳайдовчига бурилиш даражасини кўрсатиб туради. Улар йўл пойидан ташқарида факат йўл ўқига параллел равишда чизикли жойлашган бўлади. Уларнинг

узунлиги асосан бурилиш радиусига боғлик бўлади. Уларнинг чизиклари эса эгрига кириш жойидан қаралганда ҳаракат тасмасининг ҳамма кенглигини ёпиши керак (12 – расм).

*Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалари,
қуриши ва эксплуатацияси институти
Тошкент давлат аграр университети*

*Қабул қилинган вақти
15 май 2019 ийл.*

Адабиётлар

1. Денисов И.П. Справочник по озеленению автомобильных дорог. - М.: Тран., 1968. - 82 с.
2. МШН 33-2008 Указания по благоустройству и озеленению автомобильных дорог. – Ташкент, 2008. - 145 с.
3. Садиков И.С., Азизов К.Х., Ўроқов А.Х. Автомобиль йўлларини ободонлаштириш ва жиҳозлаш. Дарслик. - Тошкент, 2018. - 316 б.
4. The Street Tree Effect and Driver Safety. Naderi, Jody Rosenblatt, Kweon, Byoung Suk and Meghelal, ITE Journal on the Web. – Praveen, 2008. - pp. 69-73.
5. Орнатский Н.П. Благоустройство автомобильных дорог. - М.: Тран., 1986. - 92 с.
6. Автомобиль йўлларини кўкаламзорлаштириш ва архитектура ландшафт конструкциялаш, ободонлаштириш тизимини лойиҳалаш, уларни ташкил этиш ва сақлаш бўйича услубий қўлланма. - Т.: Ўзйўлкўкаламзорлаштириш УК, 2018. - 146 б.
7. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1980. - 189 с.
8. Anderson Ch.R. Preservation of landscape features. "Highway Res. Board Spec. Rept.". - N 138. - p. 95-97.
9. Hackett B. Highway and the landscape. "J. Inst. Highway Eng". 19. - N 7. - p. 27-30.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида" ги Фармони.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3262-сонли "Автомобиль йўлларини кўкаламзорлаштириш ва архитектура-ландшафт конструкциялаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори.
12. Қайимов А., Бердиев Э.Т. Ландшафтли қурилиш. –Тошкент, Фан ва технология, 2016. - 330 б.

И.С.Содиков, А.Х.Ўроқов, Б.К.Касимхаджаев, Э.Т.Бердиев, М.З.Холмуров **Проблемы совершенствования системы озеленения автомобильных дорог**

В статье приводятся результаты исследований по размещению, посадке и уходу декоративных деревьев и кустарников при озеленении автомобильных дорог. Характер озеленение автомобильных дорог должен быть постоянным в протяжении 2-3 км, но он не должен превышать более 10 км. Проектируемые декоративные растения для озеленение дорог должны быть максимально приспособленными в местные почвенно-климатические условия и должны быть также одинаковыми по составу. Другие виды растений используется для повышения декоративности ландшафта и для контраста. При этом необходимо учитывать экологическую устойчивость рекомендуемых растений к выхлопным газам и влияние их к эксплуатации автомобильных дорог (цветение, опадение листьев и плодов в дорожное полотно, характер развития корневой системы и т.д.).

I.S.Sodikov, A.H.Urokov, B.K.Kasimkhadzhaev, E.T.Berdiev, M.Z.Kholmurotov **Problems of improving the car roading system**

The article presents the results of research on the placement, planting and care of ornamental trees and shrubs when landscaping roads. The nature of road landscaping should be constant over a distance of 2-3 km, but it should not exceed more than 10 km. Designed ornamental plants for landscaping roads should be maximally adapted to local soil and climatic conditions and should also be of the same composition. Other types of plants are used to enhance the decorativeness of the landscape and for contrast. At the same time, it is necessary to take into account the environmental stability of the recommended plants to exhaust gases and their influence on the operation of roads (flowering, abscission of leaves and fruits in the roadway, the nature of the root system development, etc.).

ЗООТЕХНИЯ ВА ВЕТЕРИНАРИЯ

ЎЎК.:574.5:639.2/3:639.3

Б.К.КАРИМОВ

АМУДАРЬЁ ҚУЙИ ОҚИМИДА БАЛИҚЧИЛИҚ СОҲАСИНинг ИҶЛИМ ЎЗГАРИШИ, СУВ ТАҚЧИЛЛИГИ ВА ШЎРЛАНИШИ ШАРОИТИДАГИ АҲВОЛИ ВА КЕЛАЖАҚДА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Амударье қуи оқимида ов балиқчиллиги ва аквакультура ривожланиши, унга иҷлим ўзгариши, сув танқислиги ва шўрланишининг таъсири, балиқ маҳсулотларига бўлган истеъмол меъёри ва талаб ўрганилган. Ўзбекистонда кейинги 2 йилда аҳоли жон бошига ўртача 2.04-2.6 кг балиқ маҳсулотлари истеъмол қилинаётгани, аммо бу кўрсаткини меёри 7.3 кг/йил эканлиги кўрсатилган. Тадқикотлар худудда соҳа ривожи йўлида жиддий антропоген глобал ва маҳаллий таҳдидлар борлигини, соҳанинг уларга қарши барқарорлигини ошириш стратегияси сифатида биринчи навбатда сувдан фойдаланишини бошқаришни аквакультура ва ов балиқчиллиги экологик талабларини ҳисобга олган ҳолда ташкиллаштириш, иҷлим ўзгаришлари ва шўрланишининг экологик ва иқтисодий зарарини юмшатиш ёки бутунлай бартараф этиш имконини яратадиган, шўрланишга чидамли аквакультура объектларини ҳамда мос келадиган юқори самарадор аквакультура ва барқарор кўл-товар ов балиқчиллиги технологияларини жадал жорий этиш, илмий-тадқиқот институтларида илмий фаолиятни ва халқаро ҳамкорликни кескин кучайтириш таклиф этилган.

Таянч сўзлар: *Амударё, иҷлим ўзгариши, сув танқислиги, шўрланиши, балиқчиллик, аквакультура*

КИРИШ

Орол денгизи ҳавзасидаги (ОДҲ) арид-чўл зоналарида ўтган XX аср давомида атмосфера ҳавосини температураси деярли 2.8°C га кўтарилиган [1]. Иҷлим ўзгаришини ўрганиш бўйича халқаро йиғиннинг хulosасига кўра [6] 2100 йилга бориб, худудда ўртача йиллик ҳаво температуранинг ошиши 3.7°C ташкил этиши ва ёғингарчиликларнинг камайиши башорат қилинмоқда. Яқинда Польшадаги Катовитс шахрида бўлиб ўтган БМТ Иҷлим Конференцияси хulosасига кўра айни пайтда глобал иҷлим исиши даражасини саноатлаштириш бошланиш даврига нисбатан 1.5°C дан оширмасликка эришиш учун имкониятлар мавжуд. Агар бу кўрсаткич 2°C дан ошиб кетса, биохилма-хилликни камайишига, дengiz satxinинг kўtariiliшиiga, ekstremal ob-ҳavo ҳodisalarinining yanada kўpaiishi, insон kасалликлari soninining yusiши va boşqa falokatli oqibatlarga olib keliishi muқarrar экан. Бизнинг арид ОДҲда эса

бунга кўшимча равища таҳдидлар юзага келмоқда, масалан кейинги 50 йил мобайнида иҷлим исиши оқибатида музликлар юзаси 1/3 қисмга кисқарди [13]. Таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, яқин келажакда бу муаммо ва боғлиқ таҳдидлар сакланиб қолаверади [9, 10].

Хозирги даврда иҷлим ўзгаришининг сув экосистемаларига салбий таъсири билан боғлиқ бўлган муаммолар айниқса ОДҲ даги пасттекислик зоналарида ва Амударье ва Сирдарье қуи оқимлари ва дельталарида жуда кескин ривожланмоқда. Шунинг учун ҳам ушбу мақола муаллифи асосий эътиборни Амударье қуи оқимидағи (АҚО) ов балиқчиллиги ва аквакультуранинг иҷлим ва сув минерализацияси ўзгаришлари шароитидаги аҳволини таҳлил қилишга ва юзага келаётган салбий таъсиirlарни юмшатиш ва олдини олиш мақсадига хизмат қиладиган экологик ва иқтисодий барқарор балиқчиллик ва аквакультура концепцияларини аниқлаб беришга қаратди.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ

Таҳлил этилаётган АҚО худудига Орол денгизининг куриб қолган жанубий-шарқий акваторияси (хозирги кунда Оролқум номи билан машхур), Тұямұон сув омборидан бошланадиган Амударьё ёқаси: Хоразм ва Ташауз вилойтлари, Қорақалпоғистон автоном республикасы, Сарикамиш депрессияси ва Амударьё дельтаси киради. Муаммога оид дала тадқиқотлари 2006-2015 йиллар мобайнида бир қатор халқаро лойихалар доирасыда олиб борилған. Тадқиқотлар мобайнида күп марта АҚОда жойлашған сув экосистемаларини, ов баликчилиги ва аквакультура фермаларини бориб күрдік. Худуддаги аквафермерлар билан улар дуч келаёттан экологик ва иқтисодий муаммоларини билиш мақсадида сўровномалар ҳам уюштирилди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Ўзбекистонда балиқ маҳсулотлари истеъмол меъёри. Балиқ ва бошка сув экосистемаларидан олинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари жаҳон миқёсида инсон учун ўта муҳим протеин манбаидир. Глобал миқёсда балиқ ва денгиз маҳсулотлари инсон диетасыда истеъмол қилинадиган оқсилнинг 6,7% ни ташкил этади [5]. Шу жойда айтиб ўтиш жоизки, бизда халиям аҳоли жон бошига истеъмол қилиниши миқдорининг медицина томонидан аниқ күрсатилған мейрлари ишлаб чиқылмаган. Кўпчиллик ушбу мейр йилиги 12 кгни ташкил қилиши керак деб ҳисоблади, аммо буни исботи ҳеч қаерда ва ҳеч бир мейрий хужжатларда асослаб берилмаган. Бундан ташқари, ушбу миқдор тирик вазндари ёки қуруқ моддами - номаълум.

Шунинг учун биз ривожланған хорижий давлатларнинг, жумладан АҚШнинг ушбу масаладаги тажрибасини ўргандик. Америка қўшма штатлари табиатни муҳофаза қилиш агентлигининг (USEPA) мейрий хужжатларига асосан, одам кунига 6.5-20 г, яъни жон бошига тахминан 7.3 кг/йилига балиқ маҳсулоти истеъмол қилиши керак экан (<http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/handbook/>). АҚШга доир яна бир мейрий хужжат – “Америкаликлар учун диетик кўлланма” га [14] кўра

эса ЭПК ва ДПК кислоталарининг кундалик диетик мейри – 250 мгни таъминлаш учун ҳафтасига 227 г дengiz маҳсулотларини (асосан балик) истеъмол килиш керак, яъни йилига 11.8 кг.

АҚШда 2011 йилда жон бошига ўртача 6.8 кг балик маҳсулотлари истеъмол қилинган (кунига тахминан 9 г) [12]. Европа Иттифоқида бу кўрсаткич ўртача 25.1 кгни ташкил этапти, лекин турли давлатларда орасидаги фарқ катта – Венгрияда 4.8 дан Португалияда 55.9 гача. 2017 йилда Германияда бу кўрсаткич 14 кг эди (www.ec.europa.eu/fisheries/files).

Ўйлаймизки республикамиздаги мавжуд гидроэкологик ва иқтисодий шароитда юқорида келтирилған маълумотларга таянган ҳолда, Ўзбекистон учун биз биринчи стратегик марга сифатида АҚШда (USEPA) тавсия қилинган миқдорни асос сифатида, яъни 7.3 кг/йилини яқин келажак учун вақтингчалик мейр қабул қилишини таклиф этамиз.

АҚОда балиқ маҳсулотларига бўлган истеъмол талаби. Таъкидлаш лозимки, хозирги кунда экологик инқизорзга учраган ОДХ ҳавзасида балиқ хўжалиги сектори аҳолини балиқ маҳсулотларига бўлган талабини кондира олмаяпти. Масалага чукуррок қарайдиган бўлсақ, 2006-2007 йилларда мамлакатимизда аҳоли жон бошига балиқ истеъмоли атиги 0.5 кг эди [9]. Ўзбекистон Давлат статистика Кўмитаси ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги берган маълумотларга қараганда, ўтган 2016-2017 йилларда ўрта хисобда 65.3 – 82.3 минг т балиқ етиштирилганини хисобга олганда, ушбу кўрсаткич хозирга келиб эса ўрта хисобда 2.04 – 2.6 кг/йилга яқинлашиб қолди. Лекин бу ҳамон дунё бўйича ўртача кўрсаткичдан (18-20 кг) анча оркада эканлигича коляпти [5].

Статистик маълумотлар тахлили АҚО худудидаги эса ҳозирги кунда аҳоли жон бошига балиқ истеъмоли бутун Ўзбекистонга қараганда юқорироқ – 3.74 кг/йил бўлиб, Қорақалпоғистонда 2.5 дан Хоразмда 5.02 кг/йилигача ўзгариб туради (жадвалга қаранг). Юқорида биз таклиф килган мейрни, яъни

Жадвал

АҚО худудида 2017 йилдаги балиқчилик соҳасига оид маълумотлар


Вилоят	Аҳоли сони, минг	Етиштирилған балиқ, т	Жон бошига балиқ истеъмоли, кг/йил*	Тавсия этилган балиқ истеъмолига нисбатан дефицит*	
				Жон бошига, кг/йил	Худуд бўйича, т/йил
Қорақалпоғистон	1818	4515	2.5	4.8	8726
Хоразм	1777	8919	5.02	2.28	4052
Жами	3595	13434	3.74	3.56	12798

Аҳоли сонини ўсишини хисобга олмагандаги хисоб.


7.3 кг/йилни хисобга олсақ, АҚО худудида ўртача жон бошига балиқ истеъмоли дефицити 3.56

кг/йилга, жами балиқ дефицити эса йилига 12798 т тенг бўлади (1, 2 расмлар). Бутун республикани миқёсида олганда (2017 йил маълумотлари

асосида) бу дефицит миқдор йилига 155000 ташкил этади.



1-расм. Қорақалпоғистон автоном республикасида 2006-2017 йиллардаги балиқчилик секторининг солиштирма кўрсаткичлари.



2-расм. Хоразм вилоятида 2006-2017 йиллардаги балиқчилик секторининг солиштирма кўрсаткичлари.

АҚОда балиқчилик секторининг келажакда ривожланиш стратегияси. Албатта АҚО худудида мавжуд балиқ маҳсулотларига бўлган талабни тўла қондириш учун қайси йўлдан боришимиз керак деган савол туғилиши табиий.


Биринчидан, тахлил мутасадди давлат идораларида, фермерлик хўжаликларида ва адабиётда мавжуд бўлган сув экосистемалари компонентлари сифати ва унинг гидробионтларга таъсири, балиқ турлари популяциялари динамикаси ва биологик маҳсулдорлиги ва б. зарур маълумотларни етарли эмаслигини, баъзан эса умуман йўклигини кўрсатади. Бу эса сув ҳавзалари балиқ маҳсулдорлигини оширишга қаратилган чора-

тадбирларни илмий асосланган тарзда ишлаб чиқишини қийинлаштиради, жумладан балиқ ресурсларини популацион таркибини ва биологик маҳсулдорлигини кўтариш мақсадида амалга оширилиши зарур бўлган чавоқлантириш дастурларини. Шунинг учун ҳам маҳаллий университетларда ва илмий-тадқиқот институтларида балиқчиликка оид илмий фаолиятни ва мониторингни кескин кучайтириш бирламчи стратегик вазифа бўлмоғи лозим. Масалан, иқлим исиши натижасида вегетация даврининг узайиши олимларимиз олдига аквакультурада етиштириладиган балиқ турларини диверсификациялаш вазифасини кўяди. Ҳозирги кунда республикамиз

аквакултурасида асосан экстенсив ва қисман ярим интенсив технологиялар кўлланилган ҳолда асосан 3 та карпсизон балиқ турлари етиштирилади: ок толстобик (дўнгешана, 70-80%) карп ва оқ амур (20-30%). Бу технологияларда маҳсулдорлик 2-3 т/га дан ошмайди, яъни фойдаланилган сувнинг биологик маҳсулдорлиги атиги 160 – 240 г/м³ ни ташкил этади. Бинобарин, юқори температурага ва минерализацияга мослашган аквакултура обьектларини ирригация тизимлари сувидан фойдаланган ҳолда қафас ёки сув биридан-бирига окиб ўтиб турадиган бассейнларда (кичик ховузчаларда) интенсив балик ўстириш усуслари ҳар бир куб м сувда карп, африка лаккаси ёки бошка турлардан камидаги 40-50 кг ҳосил олиш ва балик етиштириш хажмини кескин ошириш имконини яратади.

Иккинчидан, АҚО ҳудудидаги балиқчилик амалга оширилаётган сув экосистемалари ҳозирги кундаги биомаҳсулдорлиги 13-20 кг/га teng, бу эса бизнинг жанубий ҳудудимиз учун жуда паст

кўрсаткичdir (3-расм). Яққол мисол сифатида Германияни олишимиз мумкин, у ердаги икlimning бизга караганда анча салқинлигига қарамасдан, табиий сув ҳавзаларидан овланадиган карп балиғи маҳсулдорлиги 150 кг/га гача етади [4]. Демак, ҳар томонлама илмий асосланган ҳолда сув ҳавзаларини сифатли ўсимликхўр балиқлар (дўргешена ва оқ амур) ва карп билан кўшимча чавоқлантириш маҳсулдорликни камидаги яна 100 кг/га гача кўтариши аник. Қорақалпоғистондаги баъзи фермерлар айтишича, улар чавоқлантириш йўли билан ижарага олган ҳавзаларининг маҳсулдорлигини 30 кг/га гача оширганлар. Лекин бу борада ҳали ҳам сифатли чавоқлар етишмаслиги муаммо бўлиб турибди. Хулоса шуки, ишончли илмий маълумотларга асосланган ҳолда балиқчиликни такомиллаштириш чора-тадбирлари, масалан қимматли балиқ турлари билан чавоқлантиришга асосланган кўл-товар аквакултурасини жорий килиш табиий сув ҳавзалари балиқ маҳсулдорлигини жиддий оширишнинг навбатдаги асосий стратегиясидир.



3-расм. Амударё кўйи оқими ҳудудидаги сув ҳавзалари балиқ маҳсулдорлиги динамикаси.


Учинчидан, факатгина АҚО ҳудудида эмас, балки бутун республикамизда балиқчилик соҳаси ҳозиргача чучук (дарё) сувидан фойдаланиш занжирида энг охирги ўринда турибди. Сув ҳавзаларини ижарага олган аквафермерлар уларга бериладиган сув вегетация даврида мунтазам етарли даражада таъминланишига ишончларини йўқотганлар, ҳатто сув одатда сероб бўладиган Фарғона водийсида ҳам бу ҳолат йўқ эмас. Уларнинг ҳавзаларидаги балиқ маҳсулдорлиги ҳудудда тез-тез рўй берадиган сув тақчиллиги натижасида кескин пасайиши одатий ҳолга айланган. Оқибатда балиқчилик фермерлигига ўстирилаётган балиқлар қирилиб кетиши ҳавфи юқори ва фермерлар иқтисодий таваккалчиликка ўрганиб қолганлар. Бундай таҳдидлардан хабар топган потенциал сармоядорлар ҳам инвестиция киритишга интилмайдилар. Соҳа фаолиятини иқтисодий таҳдидлардан сугурталаш эса ҳозиргача деярли

мавжуд эмас. Бу ҳолатга албатта барҳам берилиши лозим. Ушбу ҳолатнинг 2та стратегик ечими бор: 1) сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш стратегиясини аквакултура ва табиий сув ҳавзалари ов балиқчилиги экологик талабларини ҳисобга олган ҳолда ташкиллаштириш орқали такомиллаштириш; 2) Сув таъминотидаги тақчилликка ва кескин ўзгаришларга сезирлиги паст бўлган, фавкулодда ҳолатларда минерализацияси юқори бўлган коллектор-дренаж сувларидан ҳам фойдаланса бўладиган интенсив ва ёпиқ тизимли аквакултура технологияларини жорий этиш.

Сув шўрланиши ва унинг балиқчиликка салбий таъсирини юмшатиш стратегияси. Ҳозирги кунда чучук сув ресурслари шўрланиши ва унинг экологияга салбий таъсири Дунё миқёсида долзарб муаммога айлануб қолди [11]. Дунёдаги энг катта ички кўллардан бўлган Орол денгизи экосистемасида 1960 йилларгача ов балиқчилиги

саноати муваффакиятли равища фаолият олиб борган ва Қоракалпоғистон учун энг даромадли асосий иқтисодий фаолият турига кирган. Денгизда ва дельта кўл системаларида 1200 нафардан ортиқ балиқчилар 113 дан ортиқ кемаларда фаолият олиб боришган ва Ўзбекистон республикасида етишириладиган балиқнинг карийб 98% таъминлашган [2]. Аммо Орол денгизида овланаётган балиқ микдори жуда қисқа давр ичида, яъни 1960-1980 йиллар орасидаёқ жуда камайиб кетиб [8], 1983 йилда ов балиқчилиги тўхтатилди (4-расм). Агар ушбу инқирозни чуқурроқ тахлил киладиган бўлсак, қўйидаги муҳим хуносага келамиз. Унинг бирламчи сабаби ирригация ривожланиши ва иқлим ўзгариши оқибатида денгиз

сатхининг, сув ҳажмининг ва юзасининг кескин қискаришлари эмас, балки сув шўрлик даражасининг жуда юқори суръатларда ошиб кетиши бўлди. Кузатишлар шуни кўрсатдики, 1960 йилларгача Орол денгизининг шўрлиги ўртacha 10 г/л атрофида бўлган бўлса, 2000 йилларга келиб, чукурлиги нисбатан саёз бўлган ушбу денгизга тушаётган сув ҳажмининг қискариши ва катта миқдордаги компенсацияланмаган буғланишлар натижасида бу кўрсаткич 160 г/л дан ошиб кетди [17]. Айнан шу омил 1980 йилларнинг аввалига келибօқ мавжуд 20 абориген ва овланадиган қимматли балиқ турларининг аста-секин йўқолиб кетишига сабаб бўлди (4-расм).



4-расм. Орол денгизида сувнинг шўрланиш даражаси ва овланган балиқ миқдори орасидаги боғлиқлик (1955-1985 йиллар)

Ҳақиқатан ҳам, бизнинг олиб борган тадқиқотларимиз кўрсатишича ОДҲ хавзасидаги карпсимон балиқлар бошлангич онтогенези даврига 3,5 г/л гача шўрланиш деярли заарли таъсир кўрсатмайди, аммо ундан ошиб кетса, тухумдан балиқ личинкалари чиқмасданоқ ўла бошлайди ёки чавоқлари ривожланиши бузилади [7]. Бундан ташқари ҳозирги даврда мавжуд бўлган АҚО ва дельтасидаги кўлларнинг Сарикамиш, Шаркй Қоратерен, Джилтирбас кўлтифи, Судочье, Ходжакўл-Қоражар, Уллушўркўл ва б. кўпчилигига сувнинг шўрлик даражаси 3 – 12 г/л оралиғида [10].

Аммо сүғорма дәхқончиликда дренажсиз ерлар шүрланиши мұкаррап эканлигини ҳисобға олсақ, сув ҳавзаларимизнинг шүрланишидек жуда экологик хавфли мұаммодан күтулишнинг яқин орада иложи йўқлигини тан олиш керак. Демак, бизнинг фикримизса сув шүрланишининг балиқчилик

соҳасига таъсирини юмшатиш ва камайтиришнинг энг мақбул стратегияси - шўрланишга чидамли толерант балиқлар ва бошқа аквакультура обьектларини ҳамда мос келадиган технологияларни танлаб олиш ва жадал суръатлар билан жорий қилиш деб тан олиниши лозим.

Афсуски, XXI аср бошидан буён антропоген ва табиий сабабларга кўра юзага келаётган сув ресурслари такчиллиги ва сифатининг ёмонлашуви, инвестицияларнинг ҳамда иктиносидий ресурсларнинг етишмовчилиги ва б. муаммолар АҚО худуди ов балиқчилиги ва аквафермерлари орасида яқингача умидворлик ҳисларини тез-тез умидсизлик ва тушкунлик ҳисларига алмашиниб туришига сабаб бўлиб келмоқда эди. Аммо кейинги йилларда мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг балиқчилик соҳасига бўлган мунтазам юкори эътибори, шахсан унинг ташаббуси билан қабул

қилинган бир қатор Президент Қарорлари, жумладан 01.05.2017 йил 1 майда эълон қилинган № ПҚ-2939-сонли “Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги, 2018 йил 6 апрелдаги ПҚ-3657-сон “Балиқчилик тармоғини жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2018 йил 6 ноябрда эълон қилинган № ПҚ-4005 сонли “Балиқчилик соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги тарихий Қарорларнинг ҳаётга тадбик қилиниши ҳозирданоқ республикамизда, жумладан АҚО ҳудуди балиқчилик соҳасида ҳам катта ижобий силжишларга олиб келмоқда.

ХУЛОСА

Ҳозирги кунгача балиқ маҳсулотлари аҳоли жон бошига истеъмол қилиниши миқдорининг медицина томонидан аниқ кўрсатилган меёrlари ишлаб чиқилмаган эди. Ўзбекистонда мавжуд шароитда юкорида тахлил этилган аҳоли жон бошига балиқ маҳсулотлари истеъмолини оптималлаштириш борасидаги умумжаҳон тажрибасига таянган холда, Ўзбекистон учун биз биринчи стратегик марра сифатида АҚШда (USEPA) тавсия қилинган миқдорни асос сифатида, яъни 7.3 кг/йилни яқин келажак учун вақтинчалик

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

меёр қилиб қабул қиласак мақсадга мувофиқ бўлади. Келажакда эса албатта бу қўрсаткични жаҳон даражасига (18-20 кг/йил) олиб чиқиш стратегик вазифа бўлмоғи лозим.

Маҳаллий университетларда ва илмий-тадқиқот институтларида балиқчиликка оид илмий фаолиятни ва мониторингни кескин кучайтириш, жаҳондаги балиқчилик соҳасида илгор ўринларда турган мамлакатлар билан тажриба алманиниш ва малакали кадрлар тайёрлаш борасида ҳамкорликни йўлга кўйиш муҳим стратегик вазифадир.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқаришни аквакултура технологик ва табиий сув ҳавзалари ов балиқчилиги экологик талабларини хисобга олган ҳолда ташкиллаштириш орқали такомиллаштириш навбатдаги муҳим стратегик йўналишдир.

Сув шўрланишининг балиқчилик соҳасига салбий таъсири жуда катта ва бу таъсирини юмшатиш ва камайтиришнинг энг мақбул стратегияси - шўрланишга чидамли балиқлар ва бошқа аквакултура обьектларини ҳамда мос келадиган технологияларни танлаб олиш ва жадал суръатлар билан жорий қилиш ҳамда ёпиқ тизимли аквакултура технологияларини ривожлантиришдир.

*Қабул қилинган вақти
28 марта 2019 йил*

Адабиётлар

1. Атлас «Оценка состояния окружающей среды Узбекистана по экологическим индикаторам. Ташкент, Госкомземгеодезкадастр, 2008. 63с.
2. Тлеуов Р.Т. Новый режим Араля и его влияние на ихтиофауну. Ташкент, Изд-во Фан, 1981.190с.
3. Aladin N., T. Chida, J.-F. Cretaux, Z. Ermakhanov, B. Jollibekov, B. Karimov, Y. Kawabata, D. Keyser, J. Kubota, P. Micklin, N. Mingazova, I. Plotnikov, M Toman. Current Status of Lake Aral – Challenges and Future Opportunities. In: Lake Ecosystem Health and Its Resilience: Diversity and Risks of Extinction. Proc. Of the 16th World Lake Conf., At Bali, Indonesia, 2017, pp. 448-457.
4. Anwand, K. Fischereiliche Bewirtschaftung natürlicher Gewässer. In: Industriemäßige Fischproduktion, Herausgeber: Werner Steffens. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1981. S. 96 – 134.
5. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome, 2016. 200 pp.
6. IPCC 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm (December 30, 2018).
7. Karimov B.K, D. Keyser. The effect of salt composition on the salinity tolerance of mirror carp (*Cyprinus carpio L.*) during early ontogeny. Archive Fish. Mar. Res., 46(3), 1998, pp. 225-239.
8. Karimov Bakhtiyor, Helmut Lieth, Mohira Kurambaeva and Irina Matsapaeva. The Problems of Fishermen in the Southern Aral Sea Region. – Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2005, No.10, pp. 87-103. DOI: 10.1007/s11027-005-7832-0.
9. Karimov B.K., Kamilov B.G., Maroti Upare, Raymon Van Anrooy, Pedro Bueno and D.R. Shohimardonov. Inland capture fisheries and aquaculture in the republic of Uzbekistan: current status and planning. FAO Fisheries and Aquaculture Circular. No 1030/1. Rome, FAO, 2009, 124p.
10. Karimov, B., Matthies, M., Kamilov, B. Unconventional Water Resources of Agricultural Origin and their re-utilization potential for development of desert land aquaculture in the Aral Sea Basin. In.: The Global Water System in the Anthropocene: Challenges for Science and Governance, Springer Int. Publishing Switzerland, 2014. Pp. 143-159. DOI: 10.1007/978-3-319-07548-8_10.

11. M. Cañedo-Arguelles, C. P. Hawkins, B. J. Kefford, , R.B. Schäfer, B. J. Dyack, S. Brucet, D. Buchwalter, J. Dunlop, O. Frör, J. Lazorchak, E. Coring, H. R. Fernandez, W. Goodfellow, A. L. González Achem, S. Hatfield-Dodds, B. K. Karimov, P. Mensah, J. R. Olson, C. Piscart, N. Prat, S. Ponsá, C.-J. Schulz, A. J. Timpano. Saving freshwater from salts. *Science*, 351: 914-916 February 2016. DOI: 10.1126/science.aad3488. DOI: 10.1007/978-3-319-07548-8_10.

12. Raatz S.K., Silverstein J.T., Lahns L., Picklo M.J. Issues of fish consumption for cardiovascular disease risk reduction. *Nutrients*. 2013, 5(4), 1081-1097.

13. Semakova E K, Gunasekara Z, and Semakov D. Identification of the glaciers and mountain naturally dammed lakes in the Pskem, the Kashkadarya and the Surhandarya River basins, Uzbekistan, using ALOS satellite data. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/19475705.2015.1023852>.

14. USDA and HHS (US Department of agriculture and US Department of Health and Hyman Services). Dietary guidelines for Americans, 2010. Washington DC: USDA and HHS, 2010.

15. Wecker B., Karimov B., Kamilov B., Matthies M., Lieth H. Sustainable Aquaculture in Recirculating Systems; Feasibility Study for the Catchment Area of the Aral Sea. Contribution no. 40 of the Institute of Environmental Systems Research, University of Osnabrueck. (Ed. Prof. Dr. Michael Matthies). 2007. ISSN Nr. 1433-3805. DOI: 10.13140/RG.2.1.1491.9760.

Каримов Б. К.

Состояние сектора рыбного хозяйства в регионе нижнего течения реки Амудары в условиях изменения климата, дефицита воды, салинизации и пути дальнейшего устойчивого развития

Аннотация: Было изучено современное состояние сектора рыболовства и аквакультуры и воздействие на них изменения климата, дефицита воды и салинизации, а также нормы потребления рыбных продуктов на душу населения и потребность в производстве рыбы в регионе нижнего течения реки Амудары. Анализ показал, что в последние 2 года на душу населения было потреблено 2,0-2,6 кг/г рыбы, что гораздо ниже предложенного стандарта – 7,3 кг/г. Выявлено, что имеются серьезные антропогенные глобальные и локальные барьеры на пути развития сектора. Для повышения устойчивости к ним в первую очередь необходимо: усовершенствование управления водными ресурсами с учетом экологических требований рыбного хозяйства, ускоренное внедрение технологий интенсивной аквакультуры и озерно-товарного рыбоводства, диверсификация аквакультуры путем интродукции солеустойчивых видов, усиление научно-исследовательской активности в НИИ и международного сотрудничества, позволяющих смягчить и устранить негативное воздействие изменения климата, недостатка воды и салинизации.

Karimov B. K.

The status of fisheries sector in Amudarya river downstream under impact of climate change, water scarcity and salinization, the ways for future sustainable development

The development of capture fisheries and aquaculture sector in Amudarya River downstream (ARD) under impact of climate change, water scarcity and salinization was studied and fish consumption standards and demand was determined. Analyses of sector have revealed that last 2 years fish consumption in Uzbekistan was 2.04-2.6 kg per capita per year, however according to suggested standard it should be 7.3 kg. Investigations have revealed that current development of the sector facing serious anthropogenic global and local constraints. The strategy of mitigation of negative impacts should include above all considerable improvement of water management measures taking into account needs of fisheries sector, introduction of climate smart aquaculture and fisheries practices, enhancement of fisheries by aquaculture based restocking of natural waters, strengthening research and international cooperation.

УДК: 581.52.63

¹КУЗМЕТОВ А.Р.,²ТОШОВ Х.М.,²ЭСАНОВ Х.К.,¹ИСРОИЛОВ С.У.

БУХОРО ВИЛОЯТИ ДЕВХОНА КЎЛИНИНГ ЮКСАК СУВ ЎСИМЛИКЛАРИ ТУР ТАРКИБИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Мазкур мақолада Бухоро вилояти Девхона қўлининг юксак ўсимликлари тур таркиби ва уларнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига кўра Девхона кўлида 21 оиласга мансуб

45 тур юксак ўсимликлар учраши аниқланган. Аниқланган турлар сув бўйи ва сувда учрайдиган гурухларга ажратилган. Бу ўсимликларнинг балиқчиликдаги аҳамияти тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

“Девхона” кўли юксак ўсимликларини ўрганиш натижалари 21 тур сувда ва 24 тур ўсимлик сув бўйида учраши аниқланди. Ўрганилган мазкур турлар кўлнинг фитопланктон ва зоопланктонларини ўрганишда, кўлда гидробиологик тадқиқотлар олиб бориша мухим асос бўлиб хизмат қиласди. Келтирилган ўсимлик турлари рўйхати тадқиқотчилар гидробиологик тадқиқотларни олиб бориша илмий аҳамиятга эга эканлиги келтирилган.

Таянч сўзлар: *юксак ўсимликлар, сув олди ўсимликлари, кўл, оила, турлар, сув ўсимликлари, балиқчилик.*

КИРИШ

Юксак сув ўсимликлари (макрофитлар) сув экосистемаларининг мухим аҳамиятга эга компонентларидан бири хисобланади. Макрофитларнинг аксарият қисми сув ҳавзаларнинг дастлабки маҳсулоти хисобланади [1]. Юксак сув ўсимликлари сувликларни эвтрификацияси ва ифлосланиш жараёнларини кўрсатувчи индикатор сифатида хизмат қиласди [2].

Бухоро вилояти сув ҳавзаларида учрайдиган юксак сув ўсимликлари асосан ўт ўсимликлари бўлиб хисобланади. Уларни сувда ўсадиган ва сув бўйларида ўсадиган гурухларга ажратиш мумкин [3]. Сувда ўсадиган юксак ўсимликлар сувда яшайдиган хайвонлар (балиқлар, зоогланктон, зообентос ва бошқ.) учун мухим аҳамиятга эга бўлиб, турли даражада хизмат қиласди: балиқ турлари учун яшаш макони; моллюскалар, қисқичбақасимонлар ва сувда яшайдиган ҳашаротлар учун қишлоғ жойи; бентос организмлар учун субстрат; сув күшлари учун уя қурадиган жой ва озука; ўтхўр балиқлар, ондатра, нутрия ва бошқа сув ҳайвонлари учун озука; йиртқич сув ҳайвонларидан яширинадиган жой. Бу ҳолат юксак сув ўсимликларининг сув ҳавзаларидаги биохилма хиллики шаклланишида ва сақлашда мухим аҳамиятга эга.

Девхонакўли Бухоро вилояти Қоровулбозор тумани худудида жойлашган бўлиб майдони 1700 гектарни ташкил қиласди. Унинг сув заҳираси 765 млн м³дан иборат. Ўртача чукурлиги 15-17 м, максимал чукурлиги 30 м. Сув олиш манбаси Қарши марказий коллектори ва Қоровулбозор марказий канали хисобланади. Кўлнинг қирғокларидан 5 метр чукурликкача бўлган майдонларида турли юксак ўсимликлар ўсади. Шу даврга қадар мазкур ўсимликлар рўйхати тузилиб систематик таҳлили келтирилмаган. Натижада ўсимлик турлари бўйича

айрим чалкашниклар учраб туради. Чунки табиий сув ҳавзаларида ўтхўр балиқларнинг озиқланишида бу жуда мухим аҳамиятга эга. Шу мақсадда биз улардан гербарийлар йигиб таҳлил қилдик.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Тадқиқот обекти Бухоро вилояти Девхона кўлининг юксак сув ўсимликлари хисобланади. Девхона кўлининг юксак ўсимликларининг рўйхатини тузишда “Бухоро воҳаси флораси таҳлили” маълумотларидан [4] фойдаланилди.

Турлар таркибини аниқлашда “Определитель растений Средней Азии” [5] ва гербарий намуналарини йиғища маршрутли [6] методдан фойдаланилди. Туркум ва турларнинг илмий номлари «Определитель растений Средней Азии» [5], халқаро индекслар - International Plants Names Index [7], The Plant List [8] бўйича ва таксонларнинг муаллифлари Brummit R.K., Powell C.E. [9] кўлланмаси асосида келтирилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Девхона сув ҳавзаси гидробиологиясини ўрганиш бўйича олиб борилган дала тадқиқотлари 2015-2018 йилларда амалга оширилди. Унда сув ҳавзаси кирғокларида 3-5 метр чукурликкача бўлган худуддаги ва сув бўйи юксак ўсимлик турлари йигиб ўрганилди. Мазкур майдонда ҳар йили ўсимлик турларининг ўзгаришлари кузатилди. Бу ерда асосан қамиш ва қўға турлари доминантлик қилганлигини кўриш мумкин. Бу турлар маҳаллий аҳоли томонидан қурилиш материали ва чорва моллари учун ем ҳашак сифатида фойдаланилади. Тадқиқотлар натижасида йигилган юксак ўсимликларни сувда ва сув бўйида ўсуви гурухларга ажратдик.

Тадқиқотлар натижасида Девхона кўлида юксак сув ўсимликларининг 21 оиласга мансуб 45 тур учраши аниқланди (жадвал 1).

Жадвал 1

Бухоро вилояти Девхона кўли юксак сув ўсимликлари

№	Ўсимлик тури	Сувда ўсуви	Сув бўйида ўсуви
	Salviniaeae - Салвиниядошлар		
1	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	+	
	Equisetaceae – Қирқбўғимдошлар		
2	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.		+
	Ceratophyllaceae – Шохбарғдошлар		
3	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	+	

	Ranunculaceae – Айнектовондошлар		
4	<i>Batrachium divaricatum</i> (Schrank.) Wimm	+	
5	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nym	+	
	Chenopodiaceae – Шўрадошлар		
6	<i>Atriplex tatarica</i> L.		+
7	<i>Chenopodium album</i> L.		+
	Polygonaceae – Торондошлар		
8	<i>Polygonum persicaria</i> L.	+	
9	<i>Polygonum aviculare</i> L.		+
	Plumbaginaceae – Плумбагелладошлар		
10	<i>Limonium otolepis</i> (Schrenk.) Kuntze		+
11	<i>Limonium meyeri</i> (Boiss.) Kuntze		+
	Tamaricaceae – Юлғундошлар		
12	<i>Tamarix hispida</i> Willd.		+
13	<i>Tamarix ramosissima</i> Lab.		+
	Brassicaceae – Карамдошлар		
14	<i>Arabidopsis pumila</i> (Steph.) N.Busch		+
	Fabaceae – Бурчоқдошлар		
15	<i>Alhagi pseudo alhagi</i> (M.B.) Desv.		+
16	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		+
	Haloragaceae – Уртудошлар		
17	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	+	
18	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	+	
	Asteraceae - Қокиётдошлар		
19	<i>Acropitilon repens</i> (L.) D.C.		+
20	<i>Cichorium intybus</i> L.		+
21	<i>Karelinia caspia</i> (Pall.) Less.		+
22	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) Cam.		+
23	<i>Paramicrorhynchus procumbens</i> (Roxb.) Kirp		+
	Apocynaceae – Кендирдошлар		
24	<i>Cynanchum sibiricum</i> Willd.		+
	Plantaginaceae – Зубтурумдошлар		
25	<i>Plantago major</i> L.		+
26	<i>Plantago lanceolata</i> L.		+
	Juncaceae – Якандошлар		
27	<i>Juncus articulates</i> L.	+	
28	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	+	
	Butomaceae – Сувниёздошлар		
29	<i>Butomus umbellatus</i> L.	+	
	Cyperaceae – Ҳилолдошлар		
30	<i>Bolboschoenus popovii</i> T.V. Egorova	+	
31	<i>Cyperus rotundus</i> L.		+
32	<i>Scirpus mucronatus</i> L.	+	
33	<i>Scirpus triquetus</i> L.	+	
	Poaceae - Бүгдойдошлар		
34	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	+	
35	<i>Aeluropus litoralis</i> (Gouan) Parl.	+	
36	<i>Calamagrostis dubia</i> Bunge.	+	
37	<i>Echinochloa crus galli</i> R. et. Sch.	+	
38	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex Steud.	+	
39	<i>Erianthus ravennae</i> (L) P.Beauv.		+
	Potamogetonaceae – Фижжакдошлар		
40	<i>Potamogeton crispus</i> L	+	
41	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L	+	
	Lemnaceae - Поябаргдошлар		
42	<i>Lemna minor</i> L.	+	
	Typhaceae – Қўғадошлар		
43	<i>Typha angustifolia</i> L.	+	
44	<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	+	
45	<i>Typha minima</i> Funck	+	

Девхона кўли юксак ўсимликларини ўрганиш натижалари 21 тур сувда ва 24 тур ўсимлик сув бўйида учраши аниқланди. Ўрганилган мазкур

турлар кўлнинг фитопланктон ва зоопланктонларини ўрганишда, кўлда гидробиологик тадқиқотлар олиб боришда муҳим асос бўлиб хизмат

қилади. Келтирилган ўсимлик турлари рўйхати тадқиқотчилар гидробиологик тадқиқотларни олиб борища илмий аҳамиятга эга.

Девхона кўли юксак сув ўсимликлари ҳавзада ўзининг бир катор хусусиятларини намоён қилади. Жумладан, улар сувлиқда микроКлимни белгилайдива нафақат сувда балки тегишли ландшафтда мұхитнинг биоиндикациясини белгилаб беради. Шунингдек, гидробионтлар учун озука манбаи, йиртқич бўлмаган ҳайвонлар учун душманлардан яшириниш жойи, увидиригини бевосита ўсимликларга кўядиган (фитофил) балиқлар учун субстрат, сувдаги ортиқча ва тирик организмларга зарарли бўлган оғир металлар ва уларнинг ионлари учун депо бўлиб хизмат қилади. Танаси бирмунча юмшок бўлган рдест (*Potamogeton crispus* L.), шохбарг (*Ceratophyllum demersum* L.), ряска (*Lemna minor* L.) каби юксак ўсимликлар оқ амур каби ўсимлиkhўр балиқлар учун тўғридан-тўғри озиқа бўлиб хизмат қилади.

Девхона кўлининг табиий мұхити(ўртача чукурлиги 15-16 м) ни ҳисобга олиб ундан (асосан зофора) фитофил балиқлар учун табиий урчиш жойларини (чукурлиги 3м гача бўлган асосан

жанубий қисмда) кўпайтириш кўлнинг балиқлаштириш нормаларини ҳам табиий шароитда бажаришни амалга оширади.

ХУЛОСА

Девхона кўли ҳам бошка текислик кўллари каби мезотрофлашган кўл ҳисобланади. Лекин Девхона кўлининг юксак ўсимликлар билан камрок қопланганлиги унда балиқчилик фаолиятини кенгайтириш мүмкнингидан далолат беради. Юксак сув ўсимликларининг тур таркибини ўрганиш мазкур кўлда балиқ етиштириш имкониятларини кенгайтиради.

Кўлнинг жанубий қисмидаги зофора балиғининг табиий урчиши кулагай бўлган жойларни сунъий тарзда қамиш ва кўғадан тайёрланган боғчалар орқали гектарига 30-50 тагача кўпайтириш кўлнинг балиқлаштириш имкониятларини оширади.

Девхона кўлида нисбатан кам учровчи оқсилга бой бўлган ряска каби юксак ўсимликларни маҳсус кўпайтириб ёш балиқчаларга озиқа сифатида берилса, улар жуда яхши ўсиб, тўлақонли семизликка эга бўлади ва қишдан бемалол чиқиб кета олади.

¹Тошкент давлат аграр университети

²Бухоро давлат университети

Қабул қилинган вақти

10 апрель 2019 йил

Адабиётлар

1. Уманская М.В. Высшая водная растительность оз. Кандрыкуль (Республика Башкортостан). Самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – Самара, 2014.-Т.23, № 2. – С.141-145.
2. Мержвинский Л.М., Мартыненко В.П., Высоцкий Ю.И., Становая Ю.Л. Высшая водная растительность озера Островцы. – Витебск, 2011. №2 (62) – С. 75-81.
3. Эсанов Х.Қ. Аслонова К.А., Файзуллаев Ш.С. Бухоро вилояти сув ҳавзаларида учрайдиган юксак сув ўсимликларининг аҳамияти. Микроскопик сувўтларини ва юксак сув ўсимликларини кўпайтириш, уларни халқ хўжалигига кўллаш. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Бухоро, 2018. – Б. 83-86.
4. Эсанов Х.Қ. Бухоро воҳаси флораси таҳлили. Биол. фан. фалс. докт. дис. – Тошкент, 2017. – 179 б.
5. Определитель растений Средней Азии. В 11-х т. – Ташкент: Наука, 1968-2015.
6. Щербаков А.В., Майоров С.Р. Инвентаризация флоры и основы гербарного дела (Методические рекомендации). – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – С. 48.
7. <http://www.ipni.org>. International plants Name Index.
8. The Plant List [Электронный ресурс]. – <http://www.theplantlist.org>.
9. Brummit R.K., Powell C.E. Authors of plant names. – Kew: Royal Botanic Gardens, 1992. – 732 p.

**Кузметов А.Р., Тошов Х.М., Эсанов Х.Қ., Истроилов С.У.
Организация организации южного кавказа и их путь к бухарской области**

В данной статье анализирован видовой состав и значение высших растений озера Девхона Бухарской области. По результатам проведенных исследований в озере Девхона встречаются 45 видов высших растений относящихся к 21 семейству. Определенные виды группируются на околоводные и водные растения. А также приведены данные о значении этих растений для рыбоводство.

Результаты исследования "Девхона" озер высотных растений были обнаружены у 21 вида воды и 24 вида воды растения. Эти виды являются основой для изучения фитопланктона и зоопланктона озера, а также для гидробиологических исследований на озере. Перечисленные виды растений имеют научное значение для исследователей при проведении гидробиологических исследований.

**Кузметов А.Р., Тошов Х.М., Эсанов Х.К., Исройлов С.У.
Body structure of south caucasus and their way to bukhara region**

This article indicates the importance of the species and their significance in the Bukharion Devkhona lake. As a result of the analysis we specified that 21 family plants includes 45 species of plants we detected in the lake at the Devkhona. Indetified species are devided into two groups: the first group is which plantes live around the water place and the second group is which their life cycle occur in the water. They play an important role to the fishing.

The results of the study of the "Devxona" lake high plants were found in 21 species of water and 24 species of plant water. These species are the basis for studying phytoplankton and zooplankton of the lake, as well as for hydrobiological research on the lake. Listed species of plant species have a scientific significance for researchers in conducting hydrobiological research.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯЛАШ

УДК 62-1-9, 631.33.02

Ш.Ш.РЎЗИЕВ, З.БЎРИЕВ

МАШИНАЛАРНИНГ ИШЛАШ ЖАРАЁНИДА ПРУЖИНАЛАРНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ

Пружиналар машина ва механизмларнинг асосий эластик элементи хисобланиб жуда кенг кўламда қўлланилади. Шу боис уларнинг ўз параметрларини сақлаш қобилияти ёки параметрларининг ўзгариши машина – механизм ишига ўз таъсирини қўрсатади. Пружина ҳам бошқа деталлар каби статик, динамик ва циклик юкланиш шароитида ишлайди

Таянч сўзлар. *Машина, деталл, статик, динамик, циклик юкланиши, деформация, мустаҳкамлик, эзилиши, иш сифати, пружина, релаксация жараёни, интенсивлиг.*

КИРИШ

Машиналар деталлари ўз вазифасини бажариш жараёнида фойдали ва зарали кучлар таъсирида бўлади. Бу эса деталларга статик, динамик ва циклик юкланишлар тушишига олиб келади яъни улар ишлаш жараёнида сикилиш, эгилиш, буралиш ва силжиш деформациялари таъсирида бўлади. Айнан шунинг учун уларни мустаҳкамликка, эзилишга ва ейилишга текширилади ҳамда ушбу натижалардан келиб чиқсан ҳолда уларни тайёрлаш технологияси ва материаллари танланади.

Бизга маълумки барча машиналар бир неча ёки кўплаб қисмлардан тузилган. Бу қисмлар эса механизмлардан, механизмлар эса кўплаб деталлардан ташкил топади. Буларга мисол қилиб валлар, ўқлар, подшипниклар, қўйма ва йиғма деталлар, пружиналар, клапан, болт-гайкалар, стаканлар, втулкалар, зичловчи деталлар, поршен, слиндр, ҳалқалар ва бошқаларни келтириш мумкин. Уларнинг ўлчамлари ҳам бажарадиган ишига қараб турлича бўлиши мумкин. Умумий ҳолда ана шундай деталлар йиғилиб улкан имкониятларга эга инсонлар оғирини енгил қиласидиган машиналар йиғилади. Ушбу машиналар ишлаш вақтида ҳар бир детал ўзига юклатилган вазифани қай даражада тўлиқ бажариши машинанинг иш сифатига тўғридан-тўғри таъсир этади.

Машиналар деталлари ўз вазифасини бажариш жараёнида фойдали ва зарали кучлар таъсирида бўлади. Бу эса деталларга статик, динамик ва циклик


юкланишлар тушишига олиб келади яъни улар ишлаш жараёнида сикилиш, эгилиш, буралиш ва силжиш деформациялари таъсирида бўлади. Айнан шунинг учун уларни мустаҳкамликка, эзилишга ва ейилишга текширилади ҳамда ушбу натижалардан келиб чиқсан ҳолда уларни тайёрлаш технологияси ва материаллари танланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЕКТИ ВА УСЛУБИЁТИ

Юкорида санаб ўтган деталларимиз орасида пружиналарнинг машиналар ишлаш жараёнидаги аҳамияти каттадир. Пружиналар машина ва механизмларнинг асосий эластик элементи хисобланиб жуда кенг кўламда қўлланилади. Шу боис уларнинг ўз параметрларини сақлаш қобилияти ёки параметрларининг ўзгариши машина – механизм ишига ўз таъсирини қўрсатади. Таъкидланганидек, пружина ҳам бошқа деталлар каби статик, динамик ва циклик юкланиш шароитида ишлайди. Бу эса фойдаланиш жараёнида вақт ўтиши билан пружинанинг параметрлари (эластиклиги, геометрик ўлчамлари) ўзгаришига яъни унинг иш қобилиятининг камайишига олиб келади. Бу жараёнда пружиналар қайта тиклаш ёки янгисига алмаштириш зарурати туғилади. Пружиналарни таъмирлаш янгисини сотиб олишдан арzonга тушиши мумкин, лекин пружиналарни кўп маротаба қайта тиклаш имконияти мавжуд эмас.

Ишлаш жараёнида пружинанинг эластиклиги камайиши бу релаксация жараёни билан изохланувчи ходисадир.

Бу борада иш олиб борган олимлар релаксацияга – эластик деформациядан пластик деформацияга ўтиши натижасида кучланишиларни мустақил камайиши деб изоҳ берадилар. Пружиналардаги релаксация жараёни 1-расмда кўрсатилган график кўринишида ифодаланади. Графикдаги АВ егри чизик релаксация жараёнини ифодалайди, у икки қисмдан ташкил топган: АС қисмда пружина кучи тез суратда камаяди, СВ қисмда эса аста-секин камайиб боради [1].




1-расм. Пружиналарда содир бўладиган релаксация жараёни графиги

Пружиналарда релаксация ҳодисаси етарлича чукур ўрганилмаган бўлиб, кўпчилик ҳолларда релаксация биринчи босқичи металл кристалл панжараси чегараларидаги доначалар диффузион ўзгаришлари билан, иккинчи босқичи эса бевосита доначалардаги силжиш жараёнлари билан изоҳланади [2].

Сиқилувчан пружиналарнинг ишлаш жараёнига тўхталар эканмиз, қўлланиш соҳаси бўйича улар юқори харорат (двигател газ тақсимлаш механизми клапан пружиналари) шароитида ҳам ишлайди.

Машиналардан фойдаланишда пружинага таъсир этувчи харорат релаксация жараёнига бошқа омиллардан фарқли равишда кучли таъсир кўрсатади. Бу металда ҳарорат таъсирида атомлар ҳаракатланувчанлиги, диффузия тезлигининг ошишига, кўчиш ва диффузион жараёнлар



2-расм. Пружиналарнинг ишончлилиги: бузилмасдан ишлаш (а) эҳтимоллиги Р(т) ва носозликлар (б) интенсивлиги λ(т) ни баҳоловчи эгри чизиклар

интенсивлигининг тезлашишига олиб келади [3, 4].

Пружиналар машина ва механизмларларда қўлланилганда уларнинг маълум бир вазифани (масалан белгиланган босим кучини ушлаб туриш) бажариши талаб этилади. Статик юкланишда релаксация жараёни бошланғич ишчи узунликка сиқиб қўйилган пружинада юкланишга нисбатан чизиқли равишида ўзгаради.


Пружиналардан фойдаланиш вақти ва циклик юкланиш релаксация жараёнига харорат ёки статик юкланиш ҳолатига нисбатан сезиларли даражада таъсир этмайди. Биринчи босқичда релаксация жараёни интенсив кечиб, кейинги босқичда эса секинлашиб боради.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Картошка эккич қисгичларидаги қўлланилган пружиналарни ишончлилигини баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида курилган пружиналар ишончлилик кўрсаткичларидан: бузилмасдан ишлаш эҳтимоллиги $P(t)$ нинг ишлов берилган майдон юзаси W га ва носозликлар интенсивлиги $\lambda(t)$ нинг ишлаш вақти t га нисбатан ўзгариши эгри чизикларининг (2-расм) таҳлили асосида қўйидаги хуносаларга келиш мумкин:

– эккич жамламасига кирувчи 10 дона пружина ҳар доим ҳам эккичининг кафолатли хизмат даврида эккичининг сифатли иш қобилиятини таъминлаб бера олмайди (узоқ муддат ишлаш қобилияти эгри чизиги);

– носозликлар интенсивлигининг эгри чизиги учта асосий зонага бўлинган: ОА – мослашиш даври; АВ – нормал эксплуатация даври; ВС – авария ҳолати (пружина ашёсида чарчашдан емирилиш) даври. Лекин ушбу эгри чизигда носозликлар интенсивлиги ажралиб турган ОА – мослашиш давридаги чўққилар, пружина тайёрлаш жараёни ва унинг ашёсига қўйиладиган талабларни кучайтириш лозимлигини кўрсатади [5].



Қатор ораларига ишлов берувчи култиваторлар ишчи органларининг чуқурлигини ростлагичлари параметрларини асослаш устида тадқиқотлар олиб борган Т.С. Набиев нормал шароитда фойдаланилаётган култиваторларда ҳар хил ҳолатдаги ва узунликдаги пружиналар учрашини (бир жамланмада), култиваторни жорий таъмирлашда ва мавсумга тайёрлашда таъмирловчилар ёки механизаторлар пружиналар ҳолати, кўрсаткичлари ва ростланишларига умуман эътибор бермаслигини таъкидлаб ўтган. Бу эса пружиналар кучининг ҳар хил даражада бўлишига ва ишчи органлар ботиши чуқурлиги текислигини бузилишига олиб келади. Култиваторларни жорий таъмирлашда ва мавсумга тайёрлашда пружиналар тўпламини баландлиги ва кўрсаткичлари бўйича бир хilda танланишига ҳамда баландлиги бўйича бир биридан 5% гача фарқланиш рухсат этилиши асослаш берилган [6].

Бир қанча илмий тадқиқот институтлари тадқиқотлари натижасига кўра [1] двигателлар иш жараёнида 90 фоиз клапан пружиналарининг эркин баландлиги 0,5... 3,0 мм га қисқариши ва 45... 55

фоиз пружиналарнинг эластиклиги 4...25 фоизга камайиши асослаш беришган [3].

Пружиналар параметрларнинг ўзгаришининг машина-механизм ишига салбий таъсирини ўрганиш асосида қўлланиш соҳасига кўра салбий таъсири даражаси қўйидаги жадвалда келтирилмоқда (1-жадвал).

Тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, пружина кучининг ўзгаришининг машина-механизм ишига салбий таъсири кенг ўрганилган. Лекин пружина тавсифи тушунчасида $P(f)$ функция кучининг деформацияяга (эгилиш ўқи узунлиги) боғлиқлиги тушунилади. Деформация қийматининг ошиши унинг кучи ошишига олиб келишини, механизм учун пружина лойихаланаётган даврда унинг параметрлари давлат стандартлари талабларига мос ҳолда танланиши, унинг параметрларини муайян ростлаш ишлари билан ўзгартириш машинанинг техник, технологик, эргономик ва ишончлилик кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатади [7].

1-жадвал

Пружина параметрларининг ўзгаришини машина иш жараёни ва агротехник талабларнинг бузилишига таъсири

Машина тури	Машина номи	Пружина ўрнатилган қисм	Пружина параметри ўзгаришининг иш жараёнига таъсири
1	2	3	4
Кишлоп хўжалик ва мелиорация машиналари	Култи-ватор	ишчи орган	Ишчи органларнинг тупрокка ботиши қийинлашади, тупрокнинг каршилик кучи (зичроқ ерларда) ўзгарса, ишчи қисмлар кўтарилиб кетади ва ишлов бериш чуқурлиги қийматининг ўзгаришига олиб келади.
	Дон экиш сеялкаси	экиш чуқурлигини ростлаш механизми	Пружина тавсифини ўзгариши белгиланган экиш чуқурлигини таъминлаш имконини пасайтиради, чуқур экилган уруғларни унмай қолиши, саёз экилган уруғларни нобуд бўлишига олиб келади.
	Чигит сеялкаси	тупроқни зичлаш механизми	Кўмгич томонидан табиий қиялик бурчагида кўмилган чигит устидаги тупроқни зичлаш учун хизмат қиласи. Зичлашнинг нормал босимда бажарилмаслиги экилган уруғнинг тўла униб чиқиши имконини пасайтиради ва хосилдорликни камайишига олиб келади.
	Роторли ўт ўргич	роторнинг горизонтал мувозанат-ловчи механизми	Роторларнинг горизонтал жойлашишида ўриш тозалигини пасайишига олиб келади.
	Фреза	барабан фрикциони	Фреза иш ҳолатига туширилганда барабанлар айланишдан тўхтаб қолади ёки айрим секциялар белгиланган чуқурликда ишлов бермайди.
	Гидравлик тизим	гидравлик босимни ростлаш клапанлари	Пружина кучининг камайиши тизимдаги босимни белгиланган қийматда саклаш имконини бермайди, ростлаш ишлари хажмини кескин ошириб юборади, бажарилаётган иш сифатига ва машина техник-иктисодий кўрсаткичларини пасайишига олиб келади.
Ички ёнуб двигатели	Газ тақсимлаш механизми	клапан пружинаси	Двигател куввати пасайишига, ёнилғи сарфининг ошиши кетишига олиб келади.
	Таъмин-лаш тизими	форсунка пружинаси	Пуркаш босими пасайишига ва оптималь вариантдаги момент қийматининг ўзгариши ўз навбатида ёнилғи сарфи ошиши ҳамда двигател кувватининг пасайишига сабаб бўлади.

	Юкори босим ёнилғи насоси	плунжерни қайтариш пружинаси	Белгиланган иш тартибидаги керакли миқдорда плунжер усти хажмни тұлышыга салбай таъсир күрсатады, узатилаётган ёнилғи хажмининг ўзгарувларынан булиши двигателнинг равон ишлашини бузиши мүмкін.
Трактор ва автомобиль	Автомобил юриш кисми	амортизатор пружинаси	Машина тезлигининг, юк күтәрүвчанлик қобилятиның камайиши, машина күч тасификацияның ўзгариши ҳамда бошқарылған мүмкіннен пасайышыга олиб келиши мүмкін.
	Илашиш муфтаси	фрикцион дискларни сикиси пружинаси	Фрикцион дисклар да маховикнинг юкланишда шатаксираша оқибатида фрикцион қопламының күйишига олиб келади.

ХУЛОСА

Шу боис юқоридаги таҳлилларга асосланған ҳолда шуны таъкидлаш лозимки, пружина параметрлари ҳам доимий тарзда назорат қилиніши, белгиланған деформацияланиш қийматыда күчнінг техник талабға мөс келишини таъминлаш лозим. Бундан ташқары пружина эркін

баландлыгынан ўзгариши натижасыда пружина эластичигини камайиши қийматы илмий жиһатдан асосланмаганлығы учун таъмирлаш ишлаб чиқариш жараённанда белгиланған техник талаблар да мөбөрий техник хужжаттарға асосланған ҳолда пружиналардан фойдаланиш мақсадда мувофиқдір.

*Чирчиқ олий танк қўмондон-муҳандислик билим юртаси,
Тошкент давлат аграр унитверситети Термиз филиали*

*Қабул қилинған вақти
16 марта 2019 йил*

Адабиётлар

1. Бодиренкон В. Биологические защиты растений.-Л., 1978.-с.20
2. Yo'ldoshev Sh.U.. Mashinalar ishoncliligi va ta'mirlash asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2006. – 696 b.
3. Усков В.П.. Справочник по восстановлению базисных деталей двигателей. –Брянск., Клинцовская городская типография, 2000. –589 с.
4. Технология ремонта машин/ Под ред. проф.А.А.Пучина. – М.:Колос, 2007. –488 с.
5. Надежность и ремонт машин/ Под ред. проф.В.В.Курчаткина. – М.: Колос, 2000. – 776 с.
6. Аширбеков И.А., Горлова И.Г. Машиналар ишончлилиги ва техник сервиси. Тошкент, 2011, -161-1706
7. И.С.Серый, А.П.Смелов. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин – М.: Агропромиздат, 1992.

Ш.Ш.Рўзиев, З.Бўриев.

Изменение параметров пружины при работе машин.

Пружины—являются основным эластичным элементом машин и механизмов, применяются в очень широком спектре механизмов, по этому сохранение и изменение их параметров воздействует на работоспособность машин. Пружины, как и другие детали работают под воздействием статических, динамических и циклических нагрузок.

Sh.Sh.Ruziev, Z.Buriev.

Changed spring parameters when machines are running.

Springs – is the main elastic element of machines and mechanisms and is adopted in a very wide range of mechanisms. Therefore, saving and changing their parameters affects the performance of machines. Springs, like other parts of the work under the influence of static, dynamic and cyclic loads.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

УДК 12.08.2018

Г.Н.БЎРИБОЕВА, Т.А.ХЎЖАҚУЛОВ

СТАТИСТИК ФУНКЦИЯЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ СУВ СИФАТИ КИМЁВИЙ ИНДЕКСЛАРИНИ ТАҚСИМЛАШ

Мақолада сув таркибининг экологик тозалигини таъминлашга оид муаммоларини кенг миқёсда ҳал қилиш, гидрокимёвий сифат қўрсаткичларини баҳолаш меъзонларини ишлаб чикиш, сувдаги гидрокимёвий параметрларнинг ўзгариши объектлар факат характерли функциялар даражасида амалга оширилиш, амалий муаммоларни ечишда кўпроқ формулалар билан кўриб чиқилган. Гидрокимёвий маълумотларнинг статистик таҳлилини замонавий технологияси, сув обьектларида кимёвий моддаларнинг статистик тақсимланишини одатдаги ҳолат билан тавсифлайдиган олдинги тахминга асосланган параметрик усувлар тарқатиш қонуни келтирилган. Статистик тақсимотларнинг асосий ассиметри гидрокимёвий инградиентларини гидрокимёвий ҳолати келтирилган. (Тўпаланг мисолида).

Калит сўзлар: экологик тозалиг, гидрокимёвий сифат, NDV контцепцияси, ифлослантирувчи мода, гипотеза, техногенезис, гамма тақсимоти.


Сув маъмурчилиги сув таркибининг экологик тозалигини таъминлашга оид муаммоларини кенг миқёсда ҳал қилишда асосий аҳамиятга эга бўлган ҳолат - гидрокимёвий сифат қўрсаткичларини баҳолаш меъзонларини ишлаб чикишдан иборат. Ушбу вазифа, асосан NDV контцепциясини жорий қилиш билан боғлиқ. Сув таркибидаги моддаларнинг табиий "фон" мазмунини таҳлил қилиш, сувдаги гидрокимёвий параметрларнинг ўзгариши объектлар факат характерли функциялар даражасида амалга оширилиши мумкин. Бироқ, бу ёндашув жуда кўп миқдордаги қўшимча маълумотни эмас, балки жуда мураккаб математик аппаратдан фойдаланишни талаб қиласди. Амалий муаммоларни ечишда кўпроқ оддий формулалар кўриб чиқиласди. Текшириш фонда ва назорат чизигида жойлашган сув омборининг алоҳида нуқталарида амалга ошириласди. Агар бу сув омборида ифлослантирувчи моддаларнинг барқарор бўлмаган оқими ва индивидуал индикаторлар орасидаги статистик муносабатларни эътиборга олинмаса, муаммо муайян ифлослантирувчи моддалар учун тарқатиш функцияларини самаралик даражаси камаяди.

Гидрокимёвий маълумотларнинг статистик таҳлилини замонавий технологияси, сув обьектларида кимёвий моддаларнинг статистик

тақсимланишини одатдаги ҳолат билан тавсифлайдиган олдинги тахминга асосланган параметрик усувлар тарқатиш қонуни хисобланади. Афсуски, гидрокимёвий ахборотни статистик таҳлил қилиш тажрибаси шуну қўрсатдик, кўпинча кислород ва кремнийдан ташқари, сув сифатининг кўплаб кимёвий қўрсаткичлари одатдагидан сезиларли даражада фарқ қиласидиган тақсимотларга эга. Масалан, жадвалда 2004-2016 йиллар мобайнида ойлик гидрокимёвий кузатиш маълумотига статистик ишлов бериш натижалари келтирилган. Дарё бўйидаги хизалама Фаол техногенез (Тўпаланг) зонасида ва фаол техногенез (Сариосиё, шаҳар остидан) ҳудудида жойлашган (Тўпаланг сув омборининг юкори қисми).

Тўпаланг саноат комплекси суви сифатининг кимёвий таркиби қўрсаткичларининг типик қўрсаткичларига, унга кўра, унинг нормал максимал эҳтимоллик смета усули оптималь чизиқли холис зид нисбатига асосланган. Shapiro-Wilk тест жараёни. Бу мезон нормал тести тасодифий ўзгарувчилар учун энг самарали тестлардан бири эканлиги таъкидлаш лозим. Тасодифий тарқалиш нормасининг нол гипотезаси $W < W_{kp,N}(\alpha)$. нинг тенгизлиги қондирилса, қийматлар рад этилади $N > 50$ ўлчамли намунали ва

аҳамиятлилик даражаси а ~ 0.05 бўлган параметр $W_{kp,N} \sim 0.95$ ва фаол зонаси Техногенезис (Тўпаланг, жойлашган қаторларининг кўриб кимёвий моддалар кўпчилик тарқатиш иккала фаол Техногенезисдан ташкарида, сув омбори Сариосиё шахри), оддий тақсимот қонуни билан тавсифланмаган. Истисно, таъкидланганидек, сувда кислород ва силикон таркибига киради. Бу ҳолат мухим аҳамиятга эга. Шундай қилиб, , хисоблаш фон киймати гидрокимёвий кўрсаткичлари ўртacha қадриятлар 5% юкори ишонч оралиги қабул қиласди. Мавжуд методик кўлланмада NDV ташкил этиш бўйича раҳбарлик, бу баҳолаш стандартларни белгилаш учун асос хисобланади, бу максимал рухсат этилган контцентрациялардир. Статистик тақсимотларнинг асосий асимметри гидрокимёвий инградиентлар асосан гидрокимёвий ҳолати сув ҳосили белгиланади. Энг оддий ҳолатда, сув кимёвий таркибининг таркиби биринчи навбатда, кўйидагича:



1-расм. U ва v параметрларининг турли кийматлари комбинацияси бўлса, гидрокимёвий кўрсаткичларнинг тақсимланиш функцияси

Иккинчи турдаги бетта тақсимоти $U = 1, v = 1$ учун Саучи-Лорентз тақсимотига зиён етказади (1-расм).

Агар $J = G_0 \cdot Q^J$, бўлса, бу ҳолатда $(Q) = \frac{G_0}{Q^{\alpha}}$, $\alpha=1-j$.

Бу ҳолатда маълум бўлгандек
 $P(C) = \left| \frac{d\varphi^{-1}(C)}{dx} \right| \cdot P_Q(\varphi^{-1}(C))$.

Шунга кўра;
 $P(C) = \frac{1}{J_0} \cdot C^{\left(\frac{1}{\alpha-1}-1\right)} \cdot P_Q\left(\frac{C^{\frac{1}{\alpha-1}}}{J_0} - \frac{1}{\alpha-1}\right)$.

Қоида тариқасида сув оқимларининг тақсимланишини тавсифлаш учун қабул қилувчилар кўлланилади. Гамма тақсимоти. Бу шартлар учун а(a) параметрларининг турли кийматлари учун $R(s)$ тақсимот функциясининг

$$C(t) = \frac{J(t)}{Q(t)}$$

Бу эрда $J(t)$ бу сув таркибидаги моддалар келишининг интенсивлиги,

$Q(t)$ - қабул қилувчи сув оқимининг оқим тезлиги.

Агар $P(J) J$ ва $P(Q) Q$ тарқатиш функциялари маълум бўлса, онволюцияни интеграл ёрдамида тарқатиш функциялари ва $P_c(C)$ ни аниқлаш қийин эмас:

$$P_c(C) = F\left(\frac{J}{Q}\right) = \int_0^\infty P_Q(Q) \cdot F_j(C \cdot Q) dQ.$$


Агар $J(t)$ ва $Q(t)$ гамма тақсимоти билан тасвирангган бўлса:

$$P(C) = \frac{C^{m-1} \cdot (1+C)^{u+v}}{B(u+v)}$$


табиати. Энг оддий ҳолатда, этарлича характерли кувватни тахмин қилишда фойдаланилганда $C(t)=q_0 \frac{Q(t)^y}{t}$ (рас 3), а PQ одатий қонун билан тарқатишни тарифлаймиз;

$$P(C) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{q_0 Q}{\tau_q} \right) \frac{a_q^y}{\tau_0} \cdot C^{y-1}.$$

Бу тарқатиш характерли хусусияти, "оғир думи" билан тавсифланади яъни ҳаддан ташқари кийматлар эҳтимоллиги сезиларли даражада ошди, кўриб чиқилаётган дағитимлари жуда юкори асимметрия хисобланган боғликлар, бир таглик ва жоиз таъсир стандартлари (NDV) каби кўрсаткичлар асосий, шунга кўра, $S(t)$ ўлчов киритиш учун таҳлил нотўғри фойдаланиш сабаб.



2-расм. А = 2 учун тақсимлаш зичлиги функцияларининг характеристири ва гамма функцияси шаклида сув оқими тақсимланишининг тавсифи (Cv = 1 (Pg1 (c) учун, Cv = 1.5 (Pn (c)) ва Саучий тақсимоти (Pk (c)) билан таққослаганда (Pg2 (s))))



3-расм. Хлор таркибининг оқим тезлигига боғлиқлиги (Тўпаланг дарёси, Сариосиё шаҳри, шаҳарнинг юқорисида).

ХУЛОСА

Жуда тўғри муаммоларни статистик таҳлили параметrik усуслар ишлаш гидрокимёвий ахборот кўрсаткичлари кўпчилиги тақсимлаш йилдан кўп материаллари ва гидрокимёвий кузатишлар ва гидрокимёвий сув сифатини тарқатиш

функциялари шакллантириш таҳлил томонидан тасдиқланган оддий тарқатиш қонун томонидан тасвиранган эмас. Шу муносабат билан фон гидрокреми кўрсаткичлари ва стандартлари учун ҳисоблаш техникасини мослаштириш жуда мухимдир.

*Тошкент давлат аграр университети,
Муҳаммад Ал – Хоразмий номидаги Тошкент
ахборот технологиялари университети*

*Қабул қилинган вақти
20 май 2019 йил*

Адабиётлар

1. М.С.Якубов, Т.А. Хужакулов, М.М.Хусанов Международная научно-техническая конференция перспективные информационные технологии «Роль экологической оценки при подготовке и реконструкции проектов водохозяйственного сектора» САМАРА, 2017 1040-1044 с.
2. Пегов, С.А. Верхневолжский региональный план действий по охране окружающей среды. 2-ая ред/под ред. С.А. Пегова. - Кострома, 2001. - 220 с.
3. Месаелян, С.М. Методика интегральной оценки загрязненности водных объектов / С.М. Месаелян, Р.В. Худадян // Вода и экология. - 2004. - № 1. - С. 46 - 50.
4. Горелкин Н.Е., Никитин А.М. Испарение с поверхности водоемов // Труды САРНИГМИ, Вып. 102 (183), М., Гидрометеоиздат. 2015. -С.3-24.
5. Козлов В.И., Абрамович Л.С. Справочник рыболова. М., Росагропромиздат, 2014.- 238 с. их на орошение.
6. Полинов С.А. Рекомендации к выбору оптимальных направлений использования и режимов сброса коллекторно-дренажных вод с Бухарского и Каршинского водохозяйственных районов. Отчет и НИР. Ташкент, САНИИРИ, 2015. -129 с.
7. Савельева Р.В., Барон М.А. О движении солей в почвогрунтах при промывном режиме орошения. Труды САНИИРИ, вып.118, Ташкент, 2015.-С.42-48.

Г.Н.Бурибоева, Т.А.Хужакулов

К анализу статистических функций распределения химических показателей качества воды

В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с качеством качества углеводородов, а также с изменениями гидрогидрохимических параметров, на уровне характерных особенностей. Существует современная технология статистического анализа и предопределяющие параметрические методы, которые описывают статистическое распределение химических веществ в обычном состоянии. Основной асимметрией статистического распределения являются гидрохимические ингредиенты. (В случае Топаланг).

G.N.Buriboeva, T.A.Xujakulov

To the analysis of statistical functions distribution of chemical indices of water quality

The article deals with a wide range of issues related to the environmental cleanliness of the water content, the development of the criteria for evaluating the quality of hydrocarbon quality, and the change in water-hydrochemical parameters, with more formulas for solving practical problems, at the level of characteristic features. There is a modern technology of statistical analysis of chemical data, and the pre-setting parametric methods that describe the statistical distribution of chemicals in water objects in the usual state. The basic asymmetry of the statistical distribution is the hydrochemical status of the hydrochemical ingredients. (In the case of Topalang).

УДК 796.5:577.4:38

Ш.Т.ЯКУБЖАНОВА, Х.Н. ХАЙДАРОВА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНЫ

В статье рассматриваются реформы в сфере туризма нашей страны, тенденции развития агротуризма, как нового туристического направления, а также исследования в этой статье. В частности, Ферганской область была охарактеризована как комплекс, который она считается агротуристическим районом. В данной статье представлены результаты исследований областей высокогорья, среднегорья, низкогорья, центральной пустыни, орошаемых (антропогенных) районов и их разнообразия, как агропромышленного потенциала.

Ключевые слова: *туризм, агрокомплекс, турист, агротуризм, агротур, геоморфология, классификация, традиции*

Глава Государства Узбекистан уделяет особое внимание развитию экономики и благосостоянию людей посредством развития туризма в стране. С этой целью, в 2 декабря 2016 года был издан Указ «О мерах по обеспечению быстрого развития туризма в Республике Узбекистан» и «Об организации работы Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан». Эти документы наряду с традиционным культурно-историческим туризмом и другими видами туризма, в том числе развития агропромышленных комплексов национальных и региональных программ по разработке и внедрению в отрасли туризма во всех регионах размещения объектов, система будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных кадров для запланированных задач и предпринимаются определенные меры.

В исследовании были изучены агротуристические возможности Ферганского района и считаем, что будет целесообразно дать комплексную характеристику. Основной причиной этого выбора является наличие высокогорного, среднегорья, низкой горы (adir), центральной пустынной равнины и антропогенных зон, а также различных агротуристических потенциалов и мощностей [4, с. 13-15].

Комплексное исследование этого региона в качестве модели может служить методологической основой для перспективного изучения других регионов. Оценивая потенциал и потенциал агротуризма Ферганского агротуристического района, компоненты природы - рельеф, климат, воды, почва и растительность, флора и фауна [5, с. 38-39]. Ключевую роль играет анализ агротуристических возможностей агроландшафтов.

Ферганский агротуристический район расположена в восточной части Узбекистана, в тектонической долине между горными системами Тянь-Шаня и Алая - в Ферганской долине. Окрестности окружают горы. Районы к югу от Восточного Туркестана и Алая, Ферганской и Отуйнок, Чаткала, на севере, северо-западу от Курдама и Карамазар окружен горными хребтами, западной Мугултог. Только к западу от района узкий переход (8-9 км) по равнинам Дельверзина и Мирзачуля через ворота Ферганы или Ходженд. Административно включительно Наманганская, Андижанская и Ферганская области [2, с. 122].

Климатические особенности Ферганского агротуристического района зависят от ее географического положения. Летний эпицентр сух и длителен, зима умеренная, температура довольно стабильная. Зимой холодная погода из гор накапливается в центре Ферганской впадины и вызывает среднемесячную среднегодовую температуру (-3°) в январе. Иногда зимой холодная погода на севере и северо-востоке простирается на

горы и значительно снижает температуру в долине, а абсолютный холод в январе падает до -30, -31 градусов. Весна коротка, изменения климата часто, более 30% годовых осадков в этом сезоне. Вечерние заморозки продолжаются до середины апреля. Весной, особенно в конце, сильные ветры, осадки и град [3, с. 180].

Регион является одной из древнейших областей Средней Азии, и его почва стала культурным наследием оазиса, особенно на его равнинах. Естественная форма почвы находится в пустыне Каракалпак Центральной Ферганы, и могут встречаться в горах.

Самыми крупными и наиболее водно-болотными реками в регионе являются Нарын, Карадарья и Сырдарья. Река Нарын формируется из объединения Малого и Большого Нарына, берущего начало от Центрального Тянь-Шаня. Он питается таяния снегов и льдов. Среднегодовое потребление воды в Учкургане составляет 427 м³ в секунду. Карадарья происходит от сочетания рек Тор, Карагулжа, начиная с Ферганской и Алайской горы, заполняется снегом и ледниками. Среднегодовое потребление воды вблизи деревни Баликчи составляет около 123 м³/сек. Карадары. Среднегодовой поток Сырдарьи в близи Кизилкишлок составляет 568 м³/сек. По данные В.Л. Шульца (1959), 45,2% годового стока Сырдарьи приходится на март-июнь, 35,5% - в июле-сентябре и 19,3% в октябре-феврале. Воды многочисленных рек, стекающих с гор окружающих Ферганскую долину, не достигает Сырдарьи, из-за потребления в поливных целях.

Для рационального использования водных ресурсов в долине были построены ряд водоемов (Кайракумский, Учкурганский, Андижанский, Курганский, Каркидонский и т.д.), каналы (Большая Фергана, Андикан, Фергана, Наманган, Южный Фергана, Куштепа). Эти водохранилища и каналы имеют большое значение для снабжения сельскохозяйственных культур водой. Большую территорию, где проходят эти каналы, занимают хлопковые, овощные, зерновые поля. Разнообразие агроландшафтов повышает агротуристический потенциал.

Ферганский агротуристический район является основным хлопководческим регионом в Узбекистане. В районе выращиваются сельскохозяйственные продукты: хлопок, пшеница, кукуруза, сорго, рис, фрукты - яблоки, персики, вишни, груши, миндаль, грецкие орехи, инжир, гранаты, виноград, овощи - помидоры, картофель, морковь и такие бахчевые дыня, арбуз, огурцы. Развито животноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, разведение шелкопрядов, пчеловодство и т. д [1, с. 87].

Из-за географических условий и природных ресурсов, разнообразия агротуристических возможностях и под влиянием различных областей высоты и специфических свойств, даёт возможность отличить 6 небольших агротуристических района, отличающихся друг от друга территорий: Западно-

Алайского, Центральная равнина, Гавасай, Чаткал, Фергана и Восточный Алай. Были идентифицированы их туристические объекты и проанализированы возможности для туризма (рисование-1).

Рисование № 1

Туристические ресурсы и возможности Ферганского агротуристического района.

Микро агротуристические районы	Агротуристические объекты	Другие туристические объекты	Инфраструктура
Западный Алай.	Агрокультуры: хлопковое поле, пшеница, кукурузные поля, бахчевые, овощи, леса, садоводство. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, шелководство, пчеловодство	Исторические-мемориальные памятники: Медресе Норбутабай (1798), Комплекс Дахма Шохон (1825), Урда Худаярхана (2 половина XIX вв.), Масджиди Жоме (1-четверти XIX вв.). Археологические памятники: Зураймомотепе (VI вв. до н.э.), Китконкалья (I, IV вв.). Памятники природы: Селенгур, пищера Капчигай. Народные-национальные ремесла: гончарства (керамика разных форм).	Железные дороги: Ташкент – Коканд, Ташкент – Наманган, Ташкент – Андижан, Маргилан – Коканд, Андижан – Москва, Бишкек – Джалалабад. Автомобильные дороги: Ташкент – Ош – Кашкар, Коканд – Ходжанд, Фергана – Ош, Коканд – Наманган, Коканд - Джамашуй
Центральный равнина	Агрокультуры: хлопковое поле, овощи, граната-инджиры. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство..	Памятники природы: Язъянские степы.	Автомобильные дороги: Фергана – Наманган, Коканд – Андижан, Ташкент – Фергана, Маргилан – Коканд.
Гавасай	Агрокультуры: хлопковое поле, овощи, садоводство, виноградники, леса. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство, шелководство.	Археологические памятники: Буонамозор, Мунчактепе. Народно-национальные ремесла: Национальные ножи, национальные тюбитехи.	Железные дороги: Ташкент – Андижан. Автомобильные дороги: Ферганский автодорожный кольцевой.
Чаткал	Агрокультуры: хлопковое поле, овощи, садоводство, виноградники. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство, шелководство.	Исторические-мемориальные памятники: Мавзолей Хужа Амин (XVII в), Медресе Мулла Киргизы (1911-12 гг.), Мечеть Ата Валихан турга (XX в), Медресе Гойибназар кази (1892), Фалосбонбува (1860), Мавзолей Лангарбиби (XVIII в), Мечет Исхакхантура (1806). Археологические памятники: Ахсикент, городищ Ахси. Объекты рекреации: Шаханд, Пахталикул, Санатория Чартак.	Ферганские железнодородный кольцевой, Ташкент – Наманган – Андижан, Ташкент – Андижан, Автомобильные дороги: Наманган – Чартак – Нанай. Авиа линии: Ташкент – Наманган.
Фергана	Агрокультуры: хлопковое поле, зерновая культура, кукурузные поля, бахчевые культуры, граната-инджиры, виноградники, плодово-ягодные культуры. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, шелководство, пчеловодство, коневодство, рыбоводство.	Исторические-мемориальные памятники: Святое место Ланкантепе. Мечет Понсад (1825, включено в списке ЮНЕСКО). Археологические объекты: Камолтепе (I-IV вв), Дальварзинтепе, Каратепе, Эшонтога, Киличмазартепе. Объекты рекреации: Чимган, Зилал, Санатория Нурафшан, зона отдыха “Асака чунтак”. Народные-национальные ремесла: Шахриханские ножи, Маргиланские шёлки и тюбитехи.	Железные дороги: Железнодородный кольцевой Ферганской долины. Автомобильные дороги: Фергана – Шахимардан, Фергана – Андижан, Андижан – Маргилан, Вадил – Алтиарик, Авиа линии: Ташкент – Фергана.

Восточный Алай Агрокультуры: хлопковое поле, зерновая культура, кукурузные поля, бахчевые культуры, граната-инджиры, виноградники, плодово-ягодные культуры. Животноводственные комплексы: скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, шелководство, пчеловодство, коневодство, рыбоводство.	Исторические-мемориальные памятники: Джаме мечет Андикан (конец XIX в.). Святое места Хавсканота, Куктунликота, Килич Ибрагим, Хужа Таксимота.	Железные дороги: Андикан – Учкурган, Андикан – Тентаксай, Автомобильные дороги: Андикан – Джалаабад, Ош – Бишкек. Авиа линии: Ташкент – Андикан.
---	--	---

В заключении следует, что Ферганский агротуристический район имеет возможность создать условия для формирования и развития агротуристического ресурсного потенциала и сельского хозяйства.

*Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
Ташкентский государственный аграрный университет*

Литература

1. Ахмедов Х.И., Аллаберганов А.А. Туризм фаолиятини ташкил этиш. -Тошкент: “O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyatı nashriyoti”, 2004. – 238 б.
2. Баратов П. Ўзбекистонтабиийгеографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 264 б.
3. Баратов П., Маматқулов М., Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 2002. – 439 б.
4. Якубжонова Ш. Агротуризм географияси// Ўзбекистон география жамияти ахбороти. –Тошкент, 2008. -№ 32. –Б. 13-15.
5. Якубжонова Ш.Т. Ўзбекистон табиий шароитининг агротуристик салоҳияти ва ҳудудий фарқлари// Ўзбекистон география жамияти ахбороти. –Тошкент, 2012. 39-жилд. –Б. 38-39.

**Ш.Т.Якубжанова, X.Н.Хайдарова
Фарғона вилояти агротуристларининг туристлик имкониятлари**

Мақолада мамлакатимизда туризм соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар, агротуризмни янги туризм йўналиши сифатида хорижий давлатлардаги ривожланиш тенденциялари, бу борада олиб борилган тадқиқотлар хусусида сўз боради. Жумладан, агротуристик район – Фарғона райони комплекс тавсифланган. Мазкур район ҳудудидаги баланд тоғ, ўрта тоғ, паст тоғ (адир), марказий чўл текислик, сугориладиган (антропоген) текислик минтақалари ва уларнинг хилма-хил агротуристик салоҳият ва имкониятлари юзасидан олиб борилган тадқиқот натижалари берилган.

**Sh.T.Yakubjanova, X.N.Xaydarova
Tourist opportunities of agro-tourist area of Fergana**

The article involves the reforms in the tourism sector of our country, trends in development of agro tourism as a new tourist destination, and research on this article. In particular, Fergana region was characterized as the complex, which it is counted as an agro touristic district. The results of the research on the areas of High Mountain, Medium Mountain, low mountain range, central desert, irrigated (anthropogenic) regions and their diversity as an agro-industrial potential are presented in this article.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76)

2019 йил

МУАММОЛАР. МУХОКАМАЛАР. ФАКТЛАР.

УДК: 86.

АШУРОВА Ф.А.

ҒОЯВИЙ ТАҲДИДЛАРДАН ҲИМОЯЛАНИШДА МУҚАДДАС ДИНИМИЗНИНГ ЎРНИ

Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда ёшлар тарбияси, уларнинг билим олиши, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир.

Хозирги кунда Ўзбекистон учун хатарли хуружлардан бири ғоявий таҳдидлар бўлиб, бу ғоявий таҳдидлар оммавий усулда-инсон нафсониятига таъсир ўтказиш ва унинг руҳий маънавий қарашларини издан чиқаришга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Бундай таҳдидлардан ҳимояланиша мукаддас динимизнинг ўрни нихоятда каттадир.

Калит сўзлар: *таҳдиid, ғоявий таҳдиid, миллий маданият, “оммавий маданият”, қадрият, эгоцентризм, стаrизм, нигилизм.*

КИРИШ

Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда ёшлар тарбияси, уларнинг билим олиши, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир.

Хозирги кунда Ўзбекистон учун хатарли хуружлардан бири ғоявий таҳдидлар бўлиб, унинг энг муҳим кўринишлари қўйидагилардир:

Биринчидан, жамиятда демократиянинг йўқлигини даъво қилиш;

Иккинчидан, миллий маданиятни инкор этиш руҳини таркиб топтириш;

Учинчидан, умуминсоний қадриятларга амал қилмаслиқда айлаш.

Бу ғоявий таҳдидлар оммавий усулда инсон нафсониятига таъсир ўтказиш ва унинг руҳий-маънавий қарашларини издан чиқаришга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Демак, бугун ёшлар тарбияси масаласига алоҳида аҳамият қаратмоғимиз лозимдир.

АСОСИЙ ҚИСМ

Тарбия ҳакида гап борар экан, эътиборингизни ёзувчи Тохир Маликнинг “Одамийлик мулки” китобида келтирилган ушбу фикрларга қаратиб ўтмоқчимиз. “Мавлоно Румий: “Модомики: юнонларнинг фалсафасини ўрганибсан,

иймонларнинг ҳам фалсафасини ўрган, у ҳам керак!” - деган эканлардан ўрганиш ҳакида. Тўғри, Америкадан ёки Европадан ўрганадиган жиҳатларимиз бор. Айтайлик, китобга бўлган қизиқиши. Уларнинг одоб-ахлоқларини камситмаган ҳолда, агар холис равишда таққосласақ, кўп жиҳатдан ўзимизники афзал эканини кўрамиз. Масалан: уларнинг олийжанобликлари бизнинг олийжаноблигимиз каби эмас. Уларнинг меҳроқибатлари, бизнинг меҳроқибатларимиз сингари эмас... Ўтган йигирманчи асрда жадидлар тарбия ҳакида фикр юритганларида Европадан кўп нарса олишга унданған. Миллатнинг ривожланишини шу билан боғлаганлар. Европанинг илм-фанда, маданиятда илғор эканига маҳлиё бўлганлар. Уларнинг фикрига бугун тўғридан-тўғри эргаша олмаймиз. Чунки тарбия соҳасида Америка ҳам. Европа ҳам кейинги юз йил ичидаги таназзулга юз тутган. Буни ўзлари ҳам тан оладилар ва ижтимоий соҳаларда турли тадқиқотлар ўтказадилар. Франциялик адаб Альбер Камюнинг “Бегона” деган асарига Нобель мукофоти берилган. Асар қаҳрамони ҳатто ўзининг онаси ўлимига бефарқ, севги ҳам унинг қалбини юмшата олмайди, хуллас у меҳрурватдан бегона, руҳсиз бир тана. Асар қаҳрамони оддий бир йигит эмас, балки бугунги Европанинг рамзий тимсоли. Буни ўзлари ҳам тан олганликлари учун юқори мукофотга лойик

кўришди”.

Бундай мисолларни бугунги кунда миллиатпарвар, ватанпарвар адиларимизнинг кўплаб асарларида учратишими мумкин.

Бугун ёшлар орасида “оммавий маданият”нинг эгоцентризм (лот. “ego” – мен, “centrus” – марказ) манманлик ва худбинликнинг учига чиқсан шакли: шахснинг фақат ўз қизиқиши доирасигагина боғлани қолиши, бошқаларнинг фикри билан хисоблашмай, ўз фикрлари ва шахсиятини юқори қўйиш;

- нигилизм – жамиятнинг ахлоқий, маънавий норма ва устунлари, тарихий ҳамда маданий қадриятларининг инкор этилиши; умумъетироф этилган, объектив қадриятларга нисбатан мутлақо салбий ҳамда ўта танқидий муносабатда бўлиш; муайян ҳодисага нисбатан бир ёқлама, келишувни рад этган тарзда муносабат билдириш; бузгунчилик ғояларини ўзида ифодалаш;

- старизм – (инг. “starizm” — “юлдуз-пастлик”) “оммавий маданият” кўринишларидан, субъектив эҳтиосларга берилган ҳолда эстрада артистлари, актёрлар, спортчилар, теледикторларни “илоҳийлаштириш”да намоён бўлиши каби кўринишларига тез-тез дуч келаяпмиз. Масалан, бундан 10-15 йил аввал баданига расм чизилган, йиртиқ-ямоқ, очик-сочиқ кийим кийиб олган ҳолатда жинсига ярашмайдиган қилиқларни қилиб юрган йигит-қизларни кўчаларимизда учратмас эдик. Минг афсуски, хозирда бундайларни учратиш унчалик мушкул бўлмай қолди. Афсуски, кўчани бошига кўтариб қаҳқаҳа ураётган қизлар тўдаси, сочини турли кўйларга солиб бўйнига занжир тақсан қизил пойафзалли “йигитлар” бугунги кун манзараларининг бир қисмини ташкил этмоқда. Улар кимдан намуна олмоқдалар? - деган савол кишини ўйлантиради.

Бунинг сабабларидан бири санъат ва адабиётимизнинг айrim нукталарида бўшлиқлар бўлишига шарт-шароит яратиб берганимизда эмасмикин. Айrim кино ёки қўшиқчиллик санъатида бугунги кунда фаолият юритаётган ижодкорлар миллий маданиятни тарғиб қилиш ўрнига ўзлари “оммавий маданият”нинг домига тушиб колмоқда. Улар кўпроқ Америка, Европанинг таникли актёрлари, қўшиқчиларига, уларнинг хатти-ҳаракатлари, кийиниши маданиятига тақлид қилмоқдалар. Косметик жарроҳлик йўли билан лаб, кўз, бурун каби аъзоларнинг шаклини, ҳажмини ўзгартириш ёки айrim эркак санъаткорларнинг эркакларга хос бўлмаган кийимларда саҳнага чиқиши ҳолатлари бунга мисол бўла олади.

Замонамизнинг энг машҳур (ижобий маънода) кишиларига ўхшашлик хоҳишини түғдирадиган ижобий намунанинг тарбиявий кучи ёшларнинг (болаларнинг) тақлид қилишга мойиллигига асослангандир. Ёшлар, кўпинча, ота-оналарига, маълум бир ижобий ютуқларга эришган

қариндошларига, ўқитувчиларига ва машҳур қаҳрамонларга тақлид қиласидар. Турли ёшдаги болаларга тақлид қилишга мойиллик турлича бўлади. Масалан, кичик ёшдаги болалар ижобий намунага ҳам, салбий намунага ҳам баб-баравар тақлид қиласидар. Бунинг сабаби уларда турмуш тажрибасининг ҳали жуда камлиги, иродада кучининг ниҳоятда заифлиги, ҳиссиятларининг ақл-идроидан устун туришидадир. Уларда таҳлил қилиш ва ҳаракатларга танқидий кўз билан қараб баҳо бериш хислатлари ҳали шакланмаган бўлади. Болалар улгайиб борган сари ўз теварак-атрофидаги катта ёшдаги кишиларнинг хатти-ҳаракатларига тобора танқидий назар билан қарайдиган бўладилар. Шу ёшдаги болалар ўз нуқтаи назарларидан тақлид қилишга арзигулик деб билган кишиларнигина ўзлари учун намуна деб биладилар ва уларга эътиқод кўядилар.

Шундай экан, ёшларимизни турли хил ғоявий таҳдидлардан ҳимоялашда миллий маданиятимизни ривожлантириб боришимиз, мазкур йўналишда илмий-амалий концепцияларни ишлаб чиқишимиз керак.

Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев 2018 йил 28 декабрь куни Олий мажлисга қилган мурожаатида “Буюк аллома ва адиларимиз, азиз-авлиёларимиз, енгилмас саркарда ва арбобларимизнинг бебаҳо мероси, миллий қаҳрамонларимиз жасоратини ёшлар онгига болаликдан бошлаб сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратишими керак” - деганида ҳам айнан шу масалаларни ҳам назарда туттганлигини унутмаслигимиз лозим.

ХУЛОСА

Ёшларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантиришда мукаддас динимизнинг ўрни бениҳоят каттадир. Масалан, биз юқорида таъкидлаб ўтган айrim санъат аҳллари орасида урфга айланган лабни катта ёки кичик қилиш ва кўз шаклини ўзгартириш каби “иллатларга”га карата диний манбаларимизда куйидаги фикрлар билдирилган. “Косметик жарроҳлик амалиёти тибий муолажа бўлмай, балки инсоннинг асл хилқатини ўз хавоий нафсига эргашиб ёки бошқаларга тақлид қилиб, рағбатларини рўёбга чиқариш мақсадида ўзгартириш бўлса, жоиз эмас. Мисол учун, муайян қиёфада кўриниш учун ёки фириб қасдида ва адолатни бузиш маъносига юз шаклини, бурун шаклини ўзгартириш, лабни катта ёки кичик қилиш ва кўз шаклини ўзгартириш ҳамда лунжни кенгайтириш кабилар”.

Оёғига қизил рангли пойабзal, шим ўрнига гулдор матодан тикилган шалвор кийиб саҳнага чиқаётган бошловчилар, бўйнига тилла занжир осган ёки энгига хотин-қизларнинг кийимлари учун мўлжалланган матолардан кўйлак кияётган

йигитларга ҳам диний манбаларда келтирилган “Эркак кишиларга, мўмин-мусулмон шахсларга ипак кийим кийишнинг ҳаром қилинганининг ҳикмати шуки, ипак нарса нозик бўлади, доимо нозикликни токазо қилади. Шунинг учун ипак кийим кийган эркак киши ана шу ипакдек мулоим бўлиб, ўзининг бўйнига юклатилган масъулиятлардан, куч-кудратли бўлиш, жасур бўлиш, чаккон бўлиш каби эркак кишига хос, ипакнинг мулоимлигига зид бўлган сифатлардан маҳрум бўлиб қолишининг олдини олиш маъносида Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло эркакларга ипак либосни

ҳаром қилган. Латофатли бўлишлари матлуб бўлган, юмшоқтабиат ва таналари майин бўлиб юриши матлуб бўлган аёлларимизга эса Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло бундай либосларни ҳаром қилмаган. Улар ипак либосларни кийсалар, улар билан безансалар, табиатларига мос бўлиб юрсалар, уларга тўлиқ рухсат бор. Аммо эркакларга эркакликларини сақлаш, чапдаст бўлиш, кучли бўлиш, мулоим-юмшоқ бўлишининг зиддида юриш маънолари юзасидан ипак либосларни кийишни ман қилган” каби мисоллар орқали тушунтириш ишларини олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Тошкент давлат аграр университети

*Қабул қилинган вақти
12 апрель 2019 йил*

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Тошкент 2018 йил 28 декабрь.
2. Шайх Мухаммадад Юсуф Мухаммад Содик. Зикр аҳлидан сўранг. 4-қисм, “Hilol-nashr” Тошкент-2016 й 275-бет
3. Тоҳир Малик Одамийлик мулки.”Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компаниясибош таҳририяти. Тошкент-2017.23-бет.

Ашуровой Ф. А.

Место святой религии в защите от идеальных угроз

Современный мир изменчив и прогрессивен. В век активных изменений, когда каждое государство стремиться наладить сплочённость наций и народностей проживающих на территории своей страны особое место занимает гармоничное развитие, морально устойчивое воспитание молодёжи при наличии угроз традиционного характера.

Одной из подобных угроз на сегодняшний день для Узбекистана являются идеальные угрозы, которые направлены на массы, с целью расслоения наций и народов путем влияния на психику человека, его культурно-идеальных взглядов. В статье автор освещает роль религии в защите от подобного рода угроз.

Ashurova F. A.

The role of Holy religion in defence against ideological threats

The modern world is changeable and progressive. Harmonious development, morally stable upbringing of youth in existence of traditional character threat take special place in the century of active changes, when every state striving to adjust unity of nations and nationalities living in the territory of their country.

Ideological threats, directed to the masses with the purpose of nation and nationalities stratification by means of influence on individual mentality, his cultural and ideological vies is one of such threats for Uzbekistan nowadays. In the article the author elucidated the role of religion in defence against such kind of threa

ҚИСҚА АХБОРОТЛАР

УДК: 636.1

О.А.МАМАДИЕВ, С.У.ИСРОИЛОВ, С.О.ШОДИЕВ

НАСЛДОР ТАНА ВА ҒУНАЖИНЛАРНИ ЖАДАЛ ЎСТИРИШ

Сут корамолчилигига сигирлар подасини ўз вактида, меъерда ва сермаҳсул биринчи түкқан сигирлар билан тўлдириш орқали ҳайвонларнинг насл ва маҳсулдорлик сифатларини такомиллаштириб бориш имкони туғилади, чунки босқисмабосқич подадан каммаҳсул сигирлар пучак қилиб чиқарилиб, сермаҳсуллари киритиб борилади. Бунинг асосини таналар ва ғунажинларни қайдаражада жадал ўстириш, ўз вактида оталантириш, ғунажинларни туғишга тайёрлаш алоҳида ўрин тутади [1,2].

Бу борада академик Ш.А.Акмалхонов, профессорлар У.Н.Носиров, М.И.Аширов, И.Максудовларни қатор илмий ишлари бўлиб, уларда тана ва ғунажинларни жадал ўстириш бўйича назарий фикр ҳамда амалий маслаҳатлар етарлича мавжуд [3,4,5,6,7].

Республикада 1 январ 2018 йилда 4418,3 минг бош сигир бўлиб, унинг фақат 4,59 фоизи фермер, қолган 95,41 фоизи шахсий ёрдамчи хўжаликларда парваришланмоқда.

Республикада жами қорамолларнинг 35,6 фоизини сигирлар, бу кўрсаткич фермер хўжаликлирида фақатгина 33,7 фоизни ташкил қилмоқда, вахоланки, бу нисбат меъерда сутчилик қорамолчилигига 40-50 фоизни ташкил қилиши керак.

Бу борада республика қорамолчилигига сигирлар подасини етарли миқдорда сермаҳсул биринчи түкқан сигирлар билан тўлдириш қониқарли деб бўлмайди, шу боисдан соҳа импортга қарам бўлиб, ҳар йили минглаб тана ва ғунажинлар катта валюта ҳисобига сотиб олиб келинмоқда, лекин бу моллар соҳага ижобий таъсир қилинлиги ҳакида етарли маълумотлар йўқ, кўп ҳолларда улар хўжаликлар ва шароит нуқтаи-назаридан асосиз бўлиб, изсиз сўниб кетмоқда, қилинган харажатлар совурилиб юборилмоқда. Импорт қилинган моллардан олинган авлод етарли эмас, уларнинг насл ва маҳсулдорлик сифатлари ўрганилмаган.

Ваҳоланки, республикамиз шароитига яхши мослашган қора-ола, қизил чўл, швиц ва бушуев зотли моллар ва уларнинг режали зотлар билан чатиштириб олинган дурагай бузоқ ва таналарни меъерда, имконияти бор хўжаликларда жадал ўстириш орқали импорт қилинган молларга нисбатан 3-5 баробар арzonга сермаҳсул биринчи түккан сигирлар ўстириш мумкин.

Бунинг учун юзлаб наслчилик фермер хўжаликларида наслли сигир ва асл букалардан бузоқ олиш ҳамда уларни режалар асосида ўстириш чораларини кўриш шарт.

Соғлом бузоқ олишга таъсир қилувчи омиллар дикқат марказида бўлиши керак, улар сигирнинг ва буқанинг физиологик ҳолати, уруғлантириш, бўғозлиқ даврининг кечиши, сигир ва ғунажинларни туғишга тайёрлаш, туғиши ўтказиш ҳисобланади. Шу жараёнлар рисоладагидек ўтса оталаниш меъерда ўтиб, тўлақийматли муртак ҳосил бўлиб, у келажакда талаблар даражасида ривожланади.

Туғилган урғочи бузоқларнинг насл қийматларига биринчи босқич келиб чиқишига қараб подани қайта тиклаш гуруҳини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир, бу тахминан 40-50 фоиз олинган урғочи бузоқлар сонига тўғри келади, ёки 100 бош сигирга камида 25 бош ғунажин ўстириш ҳисобидан келиб чиқилади.

Туғилган бузоқларга фермер хўжалигига қабул қилинган ўстириш технологияси асосида саклаш ва озиқлантириш чораларини кўриш, айниқса бузоқларни эрта ва етарли миқдорда дастлабки соғим оғиз сути билан, яъни бузоқ тирик вазнининг 5 фоизи ҳисобида оғиз сути ичирилади. Кейинчалик қаймоғи олинмаган (200-300 кг), қаймоғи олинган сут (400-600 кг) берилиши бузоқларни жадал ўсиши ҳамда касалликларга чидамлилигини оширади. Айниқса, бузоқга биринчи ҳамда иккинчи марта ичириладиган оғиз сутини назоратга олиш зарур, чунки унинг таркибида антителалар 6,0-4,2 фоизни ташкил этиб, бузоқ иммунитетини шакллантиради,

кейинги ичириладиган оғиз сути таркибида антителалар камайиб боради, 2,4; 0,2; 0,1 фоиз.

Бузоқларни эрта ем ва дағал озуқаларга ўргатиш (5-15 кунлик) сарфланадиган сут микдорини камайтириш ҳамда уларнинг ошқозон – ичак тизимини ҳажмли ва бақувват бўлишини таъминлайди, бундай моллар келажакда катта микдордаги озуқаларни истеъмол қилиб, ҳазм қилиш имкониятига эга бўлади [3,4,7].

Ўстириладиган бузоқ, тана ва ғунажинларни зотларнинг йирик, ўрта ва майда бўлишига қараб, уларнинг етук ёшдаги сигирларнинг тирик вазнидан келиб чиқиб ўрнатилади, бунда йирик зотлар сигирлари 620, ўрта зотлар 550 ҳамда майда зотлар сигирларининг 450 кг бўлиши кўзда тутилади. Жадал ўстириш таналарни арzon, хўжаликда етиширилган озуқалардан кенг фойдаланишини кўзда тутиб, 6-9 ойлигига ўртacha бир кунга 4,4 ЭОБ берилиб, унинг тўйимлилик бўйича ем 25 фоиз ва 75 фоизини кўк ёки ҳажмли озуқалар ташкил қиласди. 10-12 ойлигига 5,2 ЭОБ берилиб, ем нисбати 3-4 фоизга камайтирилади.

12 ойлиқда таналар вазни 260-280 кг ни ташкил этиб, 1 кг вазн ортишига 6,0-6,5 ЭОБ бирлиги сарфлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

12-18 ойлигига 1010-1020 ЭОБ бирлиги сарфланиб, 1 ЭОБ га 105 г ҳазмланувчи протеин тўғри келади, ўртacha вазн ортиши 480-520 г бўлган, тирик вазн давр охирида 351-384 кг ни ташкил этган.

Таналарнинг зоти ва зотдорлигига қараб 16-18 ойлигига 350-360 кг тирик вазнда сунъий уруғлантирилади. Бу борада таналарнинг завод (3,5 балл) семизлигига бўлиши таъминланиши натижасида биринчи уруғлантиришдан оталаниш

80-90 фоиз бўлиб, қочириш индекси 1,2-1,3 дан ортмайди.

Оталанган таналардан алоҳида гурӯхлар тузилиб, улар меъёрлар бўйича озиқлантирилади. Айниқса, ғунажинларни етарли микдорда тўйимли ва биологик актив моддалар билан таъминлаш учун тўлақийматли рационларда бокилади, улар рационининг 25 фоизини ем, 27 фоизини дағал ва 48 фоизини ширали озуқалар бўлиши, ҳомилани меъёрда ривожланиши ҳамда туғиши пайтига ўрта семизликда бўлиб, осон туғишини таъминлайди. Ғунажинларнинг тирик вазни 7 ойлик бўғозлигига 430-440 кг, 9 ойлигига 470-480 кг бўлгани маъкул. Бундай ғунажинлар тукқанидан кейин лактациянинг 2-3 ойида 450-500 кг тирик вазнга эга бўлади. Ғунажинларни меъёрда бокиши ҳомилани режада озиқланниши ҳамда ўзининг семизлик даражасини таъминлайди. Гунажинларни етарли озиқлантирмаслик ҳомиланинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади, скелетнинг яхши ривожланмаганлиги учун қийин туғиши, биринчи лактациядаги сут микдорига салбий таъсир кўрсатади.

Хунос

Республикамизнинг барча наслчиллик фермер хўжаликларида етарли микдорда наслдор моллар бўлиб, улардан олинган бузоқ, тана ва ғунажинларни илмий асосланган, тажрибада синалган жадал усуlda ўстириш орқали маҳаллий иқлим шароитига мослашган, касалликларга чидамили, соғлом, бақувват, конституцияси мустахкам, тана тузилиши замонавий сут ишлаб чиқариш технологияларига мос сермаҳсул, арzon биринчи туққан сигирлар етишириш имконини беради.

Қабул қилинган вақти 18 май 2019 йил

Адабиётлар.

1. Ваттио М. Основные аспекты производства молока. Wisconsin, USA, - с. 128-130.
2. Максудов И., Хайдаров К., Сувонқулов Ш.К. Қорамолчилик фермер хўжаликлари учун қўлланма. Самарқанд, 2008. 40-50 б.
3. Максудов И. Ёш молларни парваришлаш ва сермаҳсул сигирлар етишириш технологияси. Монография. Самарқанд, 2008. 50-53 б.
4. Носиров У.Н., Носиров Ф.У., Носиров Т.У. Чорвачиликда классик ва замонавий селекция усуллари. Тошкент, 2009. 201-202 б.
5. Носиров У.Н., Максудов И., Досмухамедова М. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш истиқболлари. Ўқув қўлланма. БМТ тараккиёт дастури. Тошкент. 2011. 210-230 б.
6. Носиров У.Н., Максудов И., Досмухамедова М. Бўғоз сигирларни парваришлаш ва туғишига тайёрлаш. Зооветеринария журнали, № 11, 2014. 25-26 б.
7. Носиров У.Н., Максудов И., Досмухамедова М. Соғлом бузоқ олиш ва ёш молларни парваришлаш. Зооветеринария журнали, № 12, 2014. 29-31 б.

ЕТИШТИРИЛАДИГАН ПИЛЛАЛАРНИНГ ИПАКЧАНИЛИГИ.

Пиллачиликнинг инсон манфаати йўлида хизмат қилаётганига беш минг йил бўлган бўлса, тарихий маълумотларга караганда бу кўхна соҳанинг бизнинг диёримизга кириб келганлигига, икки минг йил бўлмоқда. Шу давр мобайнида пиллачиликни янада ривожлантириш юзасидан доимий ҳаракатлар қилиб келинган, чунки, пилла ва ипак маҳсулотларидан халқ хўжалигининг турли тармокларида фойдаланилаётганлиги, унинг экспортбоплиги ҳамда кўплаб ишчи ўринларини таъминлаётганлиги шуни тақозо этади.

Бунга мисол қилиб, Ўзбекистон Республикаси президентининг 2017 йил 29 мартағи ПҚ 2856 сонли, 2018 йил 12 январдаги ПҚ 3472 сонли, 2018 йил 20 мартағи ПҚ 3616 сонли, 2018 йил 20 авгуустдаги ПҚ 3910 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 2017 йил 11 авгуустдаги 616 сонли, Республикада пиллачилик тармоғини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги қарорларида белгилаб берилган вазифаларни келтириш мумкин.

Юқоридаги қарорлarda белгилаб берилган параметрларни бажаришда "Ўзбекипаксаноат" уюшмаси раҳбарлиги остида соҳа мутахассислари ҳар бирлари ўzlари хизмат қилаётган иш участкаларида ишини тўғри ташкил қилиб, умумий ишимиз натижасини кўрсатишда ўзларининг ҳиссаларини кўшишлари керак, чунки охирги умумий натижа барча бўғинларда бажарилган ишлар йиғиндисидан ҳосил бўлади, шунинг учун иш давомида қайсиdir бўғимда йўл кўйилган камчилик занжир сифатида бошқа ишларга, ҳамда охирги натижага салбий таъсир кўрсатиши аниқ.

Кейинги йилларда Республикаизда пилла етишириш ҳажмлари ишончли тарзда аста-секин ошиб бормоқда, лекин афсуски унинг сифат кўрсаткичлари, пиллачиликда етакчи бўлган давлатларда етиширилаётган пиллалар сифатидан бирмунча пастлигича қолмоқда, айниқса етиширилган пиллалардан ипак чиқиши миқдори ҳам саноат корхоналари талабларига жавоб бермайди, натижада Республикаиздаги пиллақашлик корхоналарида бир кг ипак олиш учун сарфланаётган қуруқ пилла миқдори юқори, ҳамда ипак толасининг сифати паст, оқибатда Республикаиздан жаҳон бозорига чиқарилаётган ипак калавасининг ракобатбардошлиги ҳамда нархи кўнгилдагидек эмас, муттаносиб равишда уни сотишдан олинаётган даромад ҳам.

Етишириладиган пиллалар сифатининг яхши бўлишлиги, айниқса ундан олинадиган ипак

миқдорининг юқори бўлишлиги кўп факторларга боғлиқ, бу биринчи новбатда тайёрланётган ипак курти уруғлари сифатига, мавжуд озуқа базасининг етарлилиги ва сифат даражасининг юқорилигига, баҳорда ипак курти уруғларини мўътадил муддатларда, кечикмасдан жонлантириш учун инкубаторияларга кўйишига, ипак курти боқиши агротехникасини тўғри ташкил этишга, пиллакорлар манфаатдорлигини таъминлашга, ипак куртларини озуқага тўйғазиб даста кўйиши ташкил этишга, етилган пиллаларни сифатини бузмасдан териб топшириш ҳамда тирик пиллаларни қабул қилиш, дастлабки ишлов бериш жараёнларини технология асосида тўғри ташкил қилишга ва албатта қуруқ пиллаларни йигириб ипини олиш корхоналаридаги барча иш жараёнларини тўғри ва ўз муддатларида ташкил этишга боғлиқ.

Жумладан кейинги йилларда Республикаиздаги пилла наслчилиги станциялари ва ипак курти уруғчилиги корхоналаридаги, улар иқтисодий ахволининг оғирлиги, яъни сотган уруғлари пулларини бир неча йиллар мобайнида ололмасдан келганликлари, бунинг оқибатида бу корхоналардан тажрибали мутахассисларнинг кетиб колганлиги ва бошқа сабабларга кўра улар тайёрлаётган ипак курти уруғлари миқдори камайиб сифати кескин тушиб кетди. Сифатиз тайёрланган уруғларда эса, ипак курти зот ва дурагайлари муаллифлари уларни яратгандаги дастлабки асосий кўрсаткичлари ўзини тўлиқ кўрсата олмаяпти, натижада бундай уруғлардан жонланиб чиқсан қуртлар ҳосили ва ипак миқдори кам бўлган пиллалар ўрайпти. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, тут ипак куртининг аксарият хўжалик қимматли белгилари, шу жумладан пилланинг технологик хусусиятлари ҳам полигенлар, яъни бир неча генлар таъсирида рўёбга чиқади. Шунинг учун зотларни наслчилик корхоналаридаги 3-4 йиллик кўпайтириш ишларининг ҳар бир босқичида энг юқори кўрсаткичларга эга генотиплари танланмаса, ушбу зотнинг элита популациялари ва улар иштироқидаги саноатбоп дурагайлари ўзларининг генетик потенциалини тўлиқ намоён эта олмайди. Оқибатда ишлаб чиқариш шароитида технологик хусусиятлари паст, ипак бозорида рақобатлаша ломайдиган пилла ҳомашёси етиширилади. Шунинг учун ҳам "Ўзбекипаксаноат" уюшмаси томонидан бу корхоналарнинг фаолияти бироз қисқартирилиб, баъзилариники вақтинча бутунлай тўхтатилиб, етишмаган уруғ чет давлатлардан келтирилмоқда.

Демак Республикаиздаги барча уруғчилик

корхоналари иқтисодий аҳволини яхшилаб, уларни замонавий уруғ тайёрлаш жихозлари билан таъминлаб, малакали мутахассислар ишни бошқаришини ташкил этиш зарур, шунда четдан олиб келинаётган уруғ миқдорини камайтириб яқин келажакда эҳтиёжимизни тўлиқ ўзимизда тайёрланадиган уруғ билан таъминлашимиз мумкин бўлади. Республикамиз вилоятларида мавжуд бўлган озуқа тутзорлари хатолларини тўлдириб тўлиқ гектарлар хосил қилиш ва барг массасини кўпайтириш ҳамда босқичма-бокич навдор тутлар улушкини кўпайтириб озуқа барглари тўйимлилигини ошириб бориш ҳам пилла хосили ва унинг ипакчанилигига ижобий таъсир кўрсатади.

Ипак қурти уруғларини баҳорда энг мақбул, мўътадил муддатларда жонлантириш ҳам пилла хосили ва унинг ипакчанилигини ошириши аллақачон ўз исботини топган, афсуски кейинги

вақтларда бунга етарлича эътибор қаратилмаяпти. Жонланган қуртларни инкубаторияларда ўз эгаларини кутиб бир неча кунлаб қолиб кетишлиги ва ипак қурти боқиши агротехникасини тўғри ташкил этилмаётганлиги, пилладаги бу асосий иккита кўрсатгични паст бўлиб колишига сабаб бўлиб қолмоқда. Пиллаларни териш, гурухларга ажратиш ва топшириш, уларни ғумбагини ўлдириш, куритиш ва саралашдаги камчиликлар оқибатида, пилла хосили ва ипак маҳсулоти миқдори кам бўлиб уларнинг сифати паст бўлиб қолмоқда.

Юқорида санаб ўтилган баъзи бир камчиликларни бартараф этилиб пилла хосилдорлиги ва ундан чиқадиган ипак миқдори кўпайтирилиб уларнинг сифат кўрсаткичлари яхшиланишига эришилса, Ўзбекистон Республикаси президентининг юқорида айтиб ўтилган қарорлари ижросини таъминлаган бўлар эдик.

ToшДАУ

*Қабул қилинган вақти
28 май 2019 йил*

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон республикаси президенти ва Вазирлар маҳкамасининг қарорлари
2. Муаллифларнинг олиб борган кузатишлари ва тўплаган маълумотлари.
3. Ипак қурти зотларининг суперэлита ва элита босқичида технологик белгилар бўйича наслли пиллаларни танлаш услубияти - услубий қўлланма.

УЎТ:636.2

ЮСУПОВА М. С.

АГРАР ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КАСБИЙ ҲАРАКАТ КЎНИКМАЛАРИНИ ЎРГАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Таълим тизимини такомиллаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиқкан ҳолда, кадрлар тайёрлаш мазмунини қайта кўриш, халқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш ҳаётий зарурат ҳисобланади. Айниқса, аграр соҳа мутахассисларини тайёрлашда инновацион таълим методларининг ўрни бекиёсdir. Булардан, бири касбий ҳаракатларни бажариш кўникмаларини ўргатиши методи, яъни 4 поғонали методлари бўлиб «Тушунтириш», «Нима қилиш кераклигини кўрсатиб бериш», «Кўрсатилган тарзда қайтариш», «Машқ қилиш». Ушбу методдан самарли фойдаланиб аграр йўналишлари бўйича малакали мутахассис агрономларни тайёрлаш мумкин. Шунинг учун ушбу методи аграр йўналиши мутахассисларни тайёрлашнинг инновацион методи ҳисобланади.

Бу метод бўйича масалан, боғдорчилик бўйича амалиёт ўқитувчиси талabalарга аввал бирор масалан, олма ва нок пайвандтагларини кўлланилиш холатининг кичикроқ алоҳида босқичини тушунтириб беради, кейин нима қилиш кераклигини ўзи бажариб кўрсатади. Сўнgra талаба шу иш босқичини кўрсатилгандек бажариб тақрорлаши (имитация қилиши) керак.4 поғонали методни кўллашда шу поғоналар бўйича амалиёт ўқитувчиси талabalар билан дала амалиётида ёки маҳсус ажратилган тажриба майдонларида гурухли ҳамда якка тартибда иш олиб боради. Бунда ўқитувчи 1 ва 2-поғоналарда гурух билан, 3 ва 4-поғоналарда эса, ҳар бир талаба билан якка тартибда ишлаши асосий аҳамиятга эга бўлади. Бу ҳаракатларнинг мазмуни кўйидагича бўлади: 1-поғона. Масалан, боғдорчилик бўйича амалиёт ўқитувчиси нима қилиш кераклигини тушунтиради. У талabalарга маълум бир иш босқичи ёки бир кўникмани кўллаш учун

керакли барча олма ва нок пайвандтагларини кўлланилиш бўйича маълумотларни беради. 2-погона. боғдорчилик бўйича амалиёт ўқитувчиси тушунтирилган иш боскичи қандай бажарилиши кераклигини ўзи бажариб кўрсатади, талабалар эса, дикқат билан кузатиб, эслаб қоладилар. Одатда, ўқитувчи нима қилаётгани ҳақида талабаларга изоҳлар бериб, тақорлаб намойиш этиб боради. Яъни, пайвандтагларнинг ўсиш кучи ҳамда олма ва нок навларини биологик боғлиқ равишда пайвандтаг нав комбинациясида ўсимликларининг фаоллик даврига изоҳ беради. 3-погона. Амалиёт ўқитувчиси кўрсатиб берган иш боскичини бажариш ҳаракатларини талабалар кўрсатилган тарзда қайтарадилар. Ўқитувчи улар бажараётган ҳаракатлар юзасидан ўз фикрини билдириб, хатоларни тўғрилаб туради. 4-погона. Ҳар бир талаба тегишли иш боскичи бўйича ҳаракатларни ўқитувчи кўрсатиб бергандек қайтариб бажариб кўради ва ўқитувчининг бу иш боскичини тўғри бажариш бўйича изоҳларини тушунганидан кейин, бу иш боскичини кутилган натижага эришмагунича тақорлаб машқ қилишда давом этади. Шундан кейин амалиёт ўқитувчиси ишнинг кейинги боскичига доир ҳаракатни ўргатишга ўтади. Бу боскич қуидаги мазмунда бўлиши мумкин:

- машғулотда ҳар бир ҳаракатни ўргатишнинг бошланишида амалиёт ўқитувчиси томонидан назарий ва амалий маълумотлар берилади, сўнг эса, талабаларнинг шу ҳаракатларни амалий бажариш машқлари билан алмашинади;

- талабаларни ҳаракатлари амалиёт ўқитувчиси кўрсатиб берган ҳаракатлар доираси билан чекланади;

- талабалар якка тартибда ўрганиш (ўзлаштириш, машқ қилиш)га йўналтириладилар.

Ўқитишнинг 4 поғонали методини кўллаш юзасидан йўл-йўриқлар.

1-погона. Тушунтириш-қизиқтириш (мотивация), маълумот ва йўриқнома бериш. Боғдорчилик бўйича амалиёт ўқитувчиси аввал бу йўриқнома беришни ўкув хонасида ёки дала тажриба майдонида ўтказиш максадга мувофиқлигини ҳал қиласи. Бу эса, инструктажнинг моҳияти ва турига боғлиқ. У инструктаж вақти 20-30 дақиқадан ошиб кетмаслигини режалаштиради. Ўрганилаётган олма ва нок навларини биологик боғлиқ равишида пайвандлаш бўйича ишни бажаришга қаратилган топширик юзасидан инструктаж талабаларнинг қизиқишини ўйғотишдан бошланади, чунки уларнинг қизиқиши ва эътибори ўрганилаётган нарсага қаратилиши керак. Шу пайтда у ўзининг амалий иш тажрибасидан келиб чиқиб, мавзуга доир барча ўкув-дидактика материаллардан, масалан, вегетатив йўл билан кўпаядиган олма М-7, М-9, ММ-102, ММ-104, ММ-105, ММ-106 ва нок “Бехи А”, “Бехи ВА-29”, “Бехи

С”, “Бехи Р₃” пайвандтаглари, олма “Ренет Симиренко”, “Бабараб”, “Ёзги Хазорасп”, “Қизил олма”, “Қишки Хазорасп” ва “Карвак ва нок Кишки нашвати 2”, “Юрт нашвати”, “Алмурт”, “Хон нашвати”, “Шакар-мурт” навлари ўсимликлари, пайвандтаг, қаламча, пайвандуст, кўчат, илдиз ва барглари ва уларни эксплуатацияси бўйича инструкцияларидан фойдаланиши мумкин.

2-погона. Нима қилишни кўрсатиб бериш - намойиш қилиш. Бу поғонада ўсимликларни пайвандлаш бўйича амалиёт ўқитувчиси тушунтирган иш боскичларини ўзи тегишли боғдорчилик учун олма ва нок кўчатларни ёзги-кузги даврда пайвандтаг ва пайвандуст тўқималарининг тўғри уланишини инобатга олиб ва ўсимлик пўстлоғи тагидаги тез ўсиш хусусияти камбий қатламини фаоллик суръати аниқлаш ва ушбу даврда куртак пайванд қилишнинг кулагилгини таъкидлаб пайвадлаш ишларини бажариб, намойиш қилиб кўрсатади. Улар куйидагича бажарилади: 1 - намойиш олма ва нок кўчатларнинг пайвандтаг ва пайвандустларини пайвандлаш оддий тезлиқда ўтказилади, талабаларда касбий ҳаракатнинг амалда қандай бажарилиши тўғрисида тўла ва ҳақиқий тасаввур пайдо бўлиши учун. 2 - намойиш пайвандлашни атайн секин тезлиқда ўтказилади, ҳар бир боскични алоҳида ва ўзига хос хусусиятларини яхшироқ кўрсатиш учун. 3 - намойиш ишни бажариш ҳаракати кўнинмасини яна бир марта тўла равишида кўрсатиш ва ўкувчиларда «ички суръат» яъни, ҳаракатни бажариш усули, тартиби, кетма-кетлиги, тезлиги тўғрисида аниқ тасаввур пайдо бўлиши учун пайвандлаш жараёнда амалиёт ўқитувчиси ҳар бир ҳаракатини изоҳлаб боради. Шундан сўнг бевосита инструктаж қисми тугайди. 3-погона. Кўрсатилган тарзда қайтариш - тақлид (имитация). Бу поғонада талабаларнинг ҳар бири амалиёт ўқитувчисининг ҳаракатларини у кўрсатган тарзда қайтаришлари керак. Талабалар олма ва нок кўчатларнинг пайвандтаг ва пайвандустларини пайвандлаш жараёнда амалиёт ўқитувчиси ўз фикрини билдиради, яхши пайвандлаш жараёнини мактаб ёмон пайвандлашни танқид қиласи ва нима қилишни яна бир марта кўрсатади. Ҳамма талабалар иш жараёнини тушунганилигини кўрганидан кейин амалиёт ўқитувчиси мустақил равишида пайвандаш (машқ қилиш)ни бошлашга руҳсат беради. 4-погона. Mashq қилиш - талабалар кўплаб марта тақорлаш орқали олма ва нок кўчатларини пайвандлаш бўйича касбий ҳаракатларни тўғри бажаришни машқ қилишлари учун амалиёт ўқитувчиси уларга етарлича олма ва нок кўчатларни ёзги-кузги даврдаги пайвандтаг ва пайвандустлар беруб қўяди. Ҳар бир ўкувчи ўзи пайвандтаг ва пайвандустлар пайвандлайди ва бир хил пайвандлаш усулларини кўллайди. Агар пайвандлаш натижаларининг сифати

мақбул натижа стандартига (олдиндан белгиланган сифат мезонларига-аниқ мақсадларга) жавоб берса, пайвандлаш тутатилиши мумкин. Пайвандланган ўсимликларни вегетация даври кузатиб борилади. Амалиёт ўқитувчиси бу ерда назоратчи вазифасини бажаради. *Ўқитишнинг 4 погонали методининг психологияк асослари.* Бу метод психологияда бихевиоризм назарияси (инсоннинг ўзини тутишига оид назария) билан асосланган. Дастрлаб ҳайвонлар устида ўтказилган экспериментларда олинган натижалар кейинчалик инсонга нисбатан кўлланила бошланган. Бунда кўзговчи ва реакция каби элементлар хамда аниқ ўлчаш мумкин бўлган кўрсаткичлар муҳим роль ўйнаган. Чунки олимларнинг фикрича, режа асосида ишлатилган ташки кўзговчилар ва назорат килиниши мумкин бўлган реакцияларгинаетарли даражада текширилиши мумкин ва шундан келиб чиқиб, умумий илмий хулосалар чиқариш мумкин деб ҳисобланган. Шунга мувофиқ аниқланган қўйидаги илмий хулосаларни таъкидлаб ўтиш зарур:

1. Ўзлаштириш (ўрганиш)-бу «кўзғаш таъсири-реакция» кетма-кетлиги тақрорланишининг натижасидир. Шу тақрорлар сони қанча қўп бўлса ўзлаштириш натижаси шунча яхши бўлади.

ТоиҶДАУ мустақил-тадқиқотчиси

*Қабул қилинган вақти
10 май 2019 йил*

Адабиётлар

1. Merrill Harmin with Melanie Toth. Inspiring active learning : a complete handbook for today's teachers . 2006. Pp. 481
2. Авлаев О.У. Таълим методлари –Т.: Наврӯз, 2017 й. 206 б
3. Ашуррова С. Махсус фанларни модул технологияси асосида ўқитиш. // Касб-хунар таълими. 2004-йил 5-сони.
4. Азизхўжаева Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Ўкув қўлланма.–Т.: 2006, 159 бет.

УДК:636.1.2

Ш.ҚУРБНОВА, А.КАХАРОВ

ТУРЛИ ЗОТ ВА ЗОТДОРЛИКДАГИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ТЕРИ ХОМАШЁСИ

КИРИШ

Маълумки, қорамоллардан сут ва қорамол гўштидан ташқари, енгил саноат учун муҳим хомашё ҳисобланган тери ҳам олинади. Терилар маҳсулот сифатида асосан кичик, енгил ва катта, оғир териларга бўлинади. Бизнинг тадқиқотларимизнинг 18 ва 21 ойлик назорат сўйимида олинган териларнинг барчаси катта ва оғир терилар тоифасига кирган. Маълумки, қорамол терисининг оғирлиги 25,0 кг дан ортиқ бўлса, улар I-

навли катта ва оғир териларсаналади.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Республиканинг жанубий худуди ҳисобланган Сурхон воҳасининг Шеробод туманига қарашли қорамолчиликка ихтисослашган “Жўраниёз Тошпўлатов” фермер хўжалиги шароитида тажриба учун соф зотли қора – ола (I-гурух), соф зотли швиц (II-гурух), F₁ ($\frac{1}{2}$ қора-ола x $\frac{1}{2}$ голштин) (III-гурух), F₂ ($\frac{1}{4}$ қора-ола x $\frac{3}{4}$ голштин) (IVгурух) буқачалардан ҳар гурухга 10 бошдан танлаб олинди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ

Биз тажрибадаги ҳайвонларни сўйим кўрсаткичларини, гўшт маҳсулдорлигини ва гўштнинг сифатини ўрганиш мақсадида, буқачаларни 18-21 ойлигига назорат сўйим ўтказдик. Юқорида таъкидланган кўрсаткичлар билан бир қаторда ҳайвонларнинг терисини кўрсаткичларини ҳам аниқладик ва қуидаги 1-жадвалда баён қилдик.

1-жадвални таҳлили шуни кўрсатганки, терининг оғирлиги барча гурухларда 18 ойлик назорат сўйимида 28,9 – 31,5 кг оралиғида бўлган. Бу кўрсаткич бўйича гурухлараро фарқ аниқланган. Жумладан энг оғир тери, IV-гурух буқачаларидан олинган бўлиб, улар ўз тенгқурлари I, II, III-гурух буқачаларини шунга мутаносиб тарзда: 2,6 кг ($P<0,01$) ёки 9,0 фоиз, 0,8 кг ($P<0,05$) ёки 2,6 фоиз, 0,5 кг ($P>0,05$) ёки 1,6 фоиз ортда колдирган.

1-жадвал

Тажриба гурухидаги буқачалар терисини сифат кўрсаткичлари ($X\pm Sx$)

Кўрсаткичлар	Гурухлар (n =5)							
	I		II		III		IV	
	Назорат сўйим ўтказилган ёши, ой хисобида							
	18	21	18	21	18	21	18	21
Терининг оғирлиги, кг	28,9±0,31	33,4±0,51	30,7±0,42	33,5±0,30	31,0±0,41	34,7±0,80	31,5±0,49	34,9±0,73
Терини сўйишдан олдинги тирик вазнга бўлган нисбати, %	7,3	7,1	7,3	6,7	7,6	7,0	7,9	7,3
Терининг узунлиги, см	180,7±1,6	186,6±1,6	179,1±2,1	182,4±2,1	184,4±2,7	190,3±2,06	185,7±1,9	189,4±1,6
Терининг эни, см	176,7±1,7	181,3±1,4	178,0±1,5	190,1±1,7	183,0±1,9	191,9±1,7	184,0±1,7	190,1±2,1
Терининг юзаси, дм ²	282,0±2,9	294,0±2,14	283,0±3,10	298,1±3,6	285,6±2,3	300,0±1,6	304,3±2,3	310,1±2,9
Терининг бел қисми қалинлиги, мм	4,71±0,04	5,07±0,06	5,10±0,04	5,28±0,04	5,17±0,07	5,40±0,18	5,10±0,05	5,31±0,05
Терининг нави	I	I	I	I	I	I	I	I

21 ойлиқда ўтказилган назорат сўйимида, IV-гурух буқачаларининг терисини оғирлиги бўйича ўз тенгқурлари I, II, III-гурух ҳайвонларидан устиворлиги тегишлича: 1,5 кг ($P<0,05$) ёки 4,5 фоиз, 1,4 кг ($P<0,05$) ёки 4,2 фоиз, 0,2 кг ($P>0,05$) ёки 0,6 фоизни ташкил қилган. Терининг нисбий оғирлиги буқачаларнинг 18 ва 21 ойлик назорат сўйимида мос равища 7,1 – 7,9 ва 6,8 – 7,3 фоиз оралиғида бўлган.

Терининг узунлиги, унинг юза ва бел қисмининг қалинлиги асосий сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

18 ойлик назорат сўйимида энг узун тери, IV-тажриба гурухидаги буқачаларда бўлиб, бу кўрсаткич бўйича улар ўз тенгқурлари I, II, III-гурух буқачаларини шунга мос равища: 5,0 см ($P<0,05$) ёки 2,8 фоиз, 6,6 см ($P<0,01$) ёки 3,7 фоиз, 1,3 см ($P>0,05$) ёки 0,7 фоиз ортда колдирган.

21 ойлик назорат сўйимида ушбу кўрсаткич бўйича, III-гурухдаги биринчи бўғин чатишма буқачалари устиворлик қилишган ва ўз тенгқурлари I, II, IV-тажриба гурухидаги буқачаларга нисбатан тегишлича: 9,6 см ($P<0,01$) ёки 5,3 фоиз, 7,9 см ($P<0,05$) ёки 4,3 фоиз, 0,9 см ($P>0,05$) ёки 0,5 фоиз юқори кўрсаткичга эришган.

Терининг эни ҳам уни сифатини белгилашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Бу кўрсаткич бўйича ҳар иккала назорат сўйимида ҳам биринчи ва иккинчи бўғин чатишма авлодлари бошқаларга қараганда ижобий кўрсаткичга эришишган. Хусусан, терини эни 18 ойлик назорат сўйимида, IV-гурухдаги буқачаларда 184,0 см ни ташкил қилиб, бу кўрсаткич бўйича улар ўз тенгқурлари I, II, III-гурух

буқачаларини тегишлича: 7,3 см ($P<0,01$) ёки 4,3 фоиз, 6,0 см ($P<0,05$) ёки 3,6 фоиз, 1,0 см ($P>0,05$) ёки 0,5 фоиз ортда колдиришган.

21 ойлик назорат сўйимида устиворлик III-гурух чатишма буқачаларида бўлиб, 191,9 см ни ташкил қилган. Бошқача қилиб айтганда улар ўз тенгқурларидан мос равища: 10,6 см ($P<0,01$) ёки 5,8 фоиз, 1,8 см ($P<0,05$) ёки 0,4 фоиз, 1,8 см ($P>0,05$) ёки 0,4 фоиз юқори кўрсаткичга эришишган.

Маълумки, терининг юзаси қанча катта бўлса, шунчалик сифатли ва кўп маҳсулот олинади. Бу кўрсаткич бўйича 18 ва 21 ойлик назорат сўйимида, IV-гурухдаги чатишма ҳайвонлар устиворлик қилиб, уларнинг терисини юза қисми 304,3 ва 310,1 дм² га тенг бўлган ва тенгқурлари I, II, III-тажриба гурухидаги буқачаларни мутаносиб равища: 22,2 дм² ($P<0,01$) ёки 12,2 фоиз, 21,3 дм² ($P<0,01$) ёки 7,5 фоиз, 18,7 дм² ($P>0,05$) ёки 6,5 фоиз ортда колдирган.

Бу фарқ 21 ойлиқда мос тарзда: 16,1 дм² ($P<0,01$) ёки 5,5 фоиз, 12,0 дм² ($P<0,05$) ёки 4,0 фоиз, 10,1 дм² ($P>0,05$) ёки 3,4 фоизга тенг бўлган.

Тери қанчалик қалин бўлса, унинг товар хусусияти яхши бўлиб сифатли маҳсулот олинади. Шуни эътиборга олган холда биз тадқиқотларимизда терининг бел қисми қалинлигини аниқладик ва терининг оғирлиги билан унинг қалинлиги ўртасида ижобий боғланиш борлигига ишонч ҳосил қилдик.

Хусусан, 18 ва 21 ойлик назорат сўйимида энг қалин тери, III-тажриба гурухидаги биринчи бўғин чатишма авлод буқачаларида бўлиб, 5,19 ва 5,40 мм ни ташкил қилган. Улар бу кўрсаткич бўйича, ўз тенгқурлари I, II, IV-гурух буқачаларини мутаносиб

тарзда: 0,48 мм ($P<0,01$) ёки 10,2 фоиз ва 0,33мм ($P<0,01$) ёки 6,6 фоиз, 0,9 мм ($P>0,05$) ёки 1,8 фоиз ва 0,30 мм ($P<0,01$) ёки 5,9 фоиз, 0,9 мм ($P<0,05$) ёки 1,8 фоиз ва 0,30 мм ($P>0,01$) ёки 5,9 фоиз ортда қолдиришган.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, тадқиқотларимизда тажриба гурухидаги буқачалардан олинган тери хом

ашёсини барча кўрсаткичлари бўйича ишонарли даражада гурухлараро статистик фарқ аниқланган ва бунда соф зотли ҳайвонларга нисбатан чатишма авлод буқачалари бироз устиворлик килишган. Бизнинг тадқиқотларимизда олинган натижалар А.Хушвақтов (2017) ва А.В.Шевхужаев, М.Б.Улумбашевларнинг (2017) маълумотларига мос келиши билан ажралиб туради.

Самарқанд ветеринария медицинаси институти

Қабул қилинган вақти
5 май 2019 йил

Адабиётлар

- Громенко О., Киблако Л., Жеребилов Н. Мясная продуктивность чистопородных и помесных бычков// Молочное и мясное скотоводство. 2006. №2 с. 18-19.
- Кахаров А. Эффективность использования пород крупного рогатого скота разных направления продуктивности и их помесей для производства говядины в условиях юга Узбекистана//Автореферат дисс.доктора с.-х. наук. Ташкент. 1994. 48 с.
- Нарбаева М.К., Кахаров А.К. Голштинлашган буқачаларнинг гўшт махсулдорлиги// Зооветеринария. №8. 2011. 32-33 б
- Носиров У.Н.Методы повышения производства говядины и создание мясного скотоводства в Узбекистане. Афтотреф.дисс.докт.с-х.наук – Оренбург. 1974. 47 с
- Хушвақтов А., ва бошқалар. Голштинлаштирилган қорамоллардан гўшт етиштирища фойдаланиш. “Қишлоқ хўжалиги, худудий инновация ва халқаро ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференция материали. Самарқанд. 2017. 325-328 б.
- Шевхужаев А.В., Улумбашев М.Б. Результативность использования породных ресурсов крупного рогатого скота при производство говядины в Северо – Кавказском регионе. // Молочное и мясоное скотоводство. 2017. №3. с.17-19.

ЎЎК: 519.26

Б.АБДАЛИМОВ, А.А.ФАЙЗИЕВ

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИНИНГ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ЁРДАМИДА ТАҲЛИЛИ

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиширувчи, фермер хўжалигининг иқтисодий кўрсаткичларини математик моделлаштириш ёрдамида таҳлил қилиш, бу жараённи кафолатли ва хар томонлама чукур ўрганиб, унинг иқтисодий самарадорлигини аниқлашда муҳим рол ўйнайди. Иқтисодий таҳлилда ўзгарувчиларни абсалют ўзгарувчанлиги эмас, балки уларни нисбий ёки фоизли ўзгарувчанлиги муҳим аҳамиятга эга ([1]-[4]).

Даромад ва харажатнинг фарқи, фойда ишлаб-чиқаришда асосий омил хисобланади. Фойдани максимум қилиш учун, фермер икки хил нисбий кўрсаткичдан ўртacha ва лимитик қийматлардан фойдаланади. Агар ўртacha даромад, ўртacha харажатдан юкори бўлса, фермер фойда кўради ва маҳсулот ишлаб чиқаришини кўпайтиради. Агар ўртacha харажат, ўртacha даромаддан катта бўлса,

фермер хўжалиги зарар кўради ([2]-[4]).

Маколада, фермер хўжалиги мисолида, функция эгилувчанлиги ёрдамида йифинди, ўртacha ва лимитик кўрсаткичларни нисбий ўзгарувчанлигини иқтисодий таҳлил қилиш масалалари ўрганилган. Бундай таҳлил қилиш усусларини, агарар университетнинг иқтисодий ўйналиш талабаларига ўргатиш, уларни касбий тайёргарликларини кучайтиришга ва келгусида ўзларининг иш фаолиятида учрайдиган амалий масалаларни ечиб таҳлил қилишларига ёрдам беради.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ

Фараз қилайлик, x - маҳсулотнинг баҳоси, y - шу маҳсулотга бўлган талаб бўлсин, бу микдорлар орасидаги боғланишни $y=f(x)$ функция шаклида ифодалаш мумкин. Чунки, тайёр маҳсулотга бўлган талаб, унинг баҳосига боғлиқ бўлади. Функционал

богланишда эркли ўзгарувчи x нинг яъни маҳсулотни баҳосини $x + \Delta x$ ўзгариши, функция у ни унга бўлган талабни $y + \Delta y$ га ўзгаришига олиб келади. Бу жараёнинг ўзгариш тезлигини ҳосила ёрдамида баҳолаш мумкин. Йқтисодий жараёнларни бу кўрсаткич тўла характерламайди, у ўлчов бирлигига боғлиқ бўлади. Шу сабабли, иқдисодий таҳлилда x ва у ўзгарувчиларни абсалот ўзгарувчанлигини $(\Delta x \text{ ва } \Delta y)$ эмас, балки уларни нисбий ёки фоизли ўзгарувчанлигини ўрганиш лозим бўлади.

Функцияни $y=f(x)$, эгилувчанлиги деб, x ва у ўзгарувчиларнинг нисбий ўзгарувчанликлари нисбатининг лимитига айтилади([3]):

$$E_x(y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{y} \div \frac{\Delta x}{x} \right) = \frac{x}{y} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

x эркли ўзгарувчи узлуксиз ўзгарган ҳолда, функция эгилувчанлигининг Mf -лимитик қийматини (x нуқтадаги) ва Af -функцияни x нуқтадаги ўртача қийматлари ёрдамида куйдагича ёзиш мумкин:

$$E_x(y) = \frac{x}{y} \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{\left(\frac{f(x)}{x}\right)} = \frac{Mf}{Af}$$

Бу ерда $Mf = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ ни иқтисодий

масалани қўйилишига қараб турлича талқин қилиш мумкин. Масалан уни лимитик фойда $MR = R'$, MC - лимитик сарф-харажат, MQ -мехнатнинг лимитик маҳсулотни билдиради. $Af = \frac{f(x)}{x}$ -

ўртача қиймат, $AR = \frac{R(Q)}{Q}$ - ўртача фойда,

$AC = \frac{C(Q)}{Q}$ - ўртача харажат, $AQ = \frac{Q(L)}{L}$ - ўртача

мехнат маҳсулоти деб қаралиши мумкин. Бу миқдорлар ёрдамида умумий ўртача қийматларни ва лимитик харажатларни тафовутини аниқлаш мумкин.

Йигинди бўйича ўртача қийматни топиш учун $Af(x) = \frac{f(x)}{x}$ функция графигини $B(x; f(x))$ нуқтасини координата боши билан бирлаштирувчи вектор ўтказамиз, $\tg\beta = \frac{f(x)}{x} = Af(x)$ ўртача қиймат бўлади. Лимитик қийматни йигинди қиймат орқали ифодалашда координаталар системасида x эркли ўзгарувчи ва $Af(x)$ -ўртача қийматни кесиши нуқталари $(x; Af(x))$ ва координаталар ўқларини мусбат йўналишлари билан ҳосил қилган тўғри тўртбурчак юзасидан $xAf(x)$ иборат бўлади.

Узлуксиз ҳолда лимитик (маржинал) қийматни, йигинди қиймат орқали топишда масалан,

$$F(x) = ax - bx^3 \quad \text{бўлса, у}$$

$MF(x) = (ax - bx^3)' = a - 3bx^2$ эгри чизикни ($x; AF(x)$) нуқтасига ўтказилган уринмага тенг бўлади. Натижада, $MF(x) = F'(x) = tg\beta$ уринманинг бурчак коэффициенти, йигинди миқдорнинг ихтиёрий нуқтасига ўтказилган уринма бўлиб, миқдорий жиҳатдан йигинди миқдорнинг шу нуқтадаги ҳосиласига тенг бўлади.

Узлуксиз ҳолда йигинди қийматни лимитик қиймат орқали топишда юқоридағига тескари масала ечилади, яъни $F'(x)$ ни бошлангич функциясини топишга келтирилади. Масалан, $MF(x) = a - 3bx^2 \quad \text{бўлса,}$

$F(x) = \int MF(x) dx = \int (a - 3bx^2) dx \quad \text{бўлади, } x$ эркли ўзгарувчи ўзгариши билан ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти ҳам ўзгаради, бу лимитик қийматни ўзгаришини билдиради. Агар лимитик қиймат график ҳолда берилган бўлса, у аниқмас интегрални геометрик изоҳлашга асосан юзани ифодалайди $F(x) = S(x) + C$.

$AF(x)$ ўртача ва $MF(x)$ лимитик ўртача қийматлар орасидаги боғланишни топиш учун $AF(x)$ берилган ҳолда, йигинди қиймат куйдагича бўлади:

$$MF(x) = F'(x) = (xAF(x))' = AF(x) + xAF'(x).$$

Худи шундай, ўртача қиймат, йигинди қиймат орқали куйдагича ифодаланилади:

$$AF(x) = \frac{1}{x} \int MF(x) dx, \quad \text{бу ерда}$$

$MF(x) = AF(x) + xAF'(x)$ бўлиб, оддий талқин қилиниши мумкин яъни экстремум нуқтасида лимитик қиймат, ўртача қиймат билан бир хил бўлади.


Ўртача қиймат AF билан, лимитик қиймат MF орасидаги боғланишни ўрганамиз:

a) $AF(x)$ функцияни ўсиш соҳасида $AF(x)' \geq 0$ бўлганлигидан $MF(x) \geq AF(x)$ бўлади. Лимитик қиймат, бу ҳолда ўртача қийматдан катта бўлади.

b) Камайиш соҳасида $AF(x)' \leq 0$

бўлганлигидан, $MF(x) \geq AF(x)$ лимитик қиймат, ўртача қийматдан кичик бўлади. Демак, бу ҳолларда лимитик миқдорни графикни, ўртача миқдорни графикидан юқорида жойлашади. $AF(x)$ ни ўсиш оралигида пастда графикни бўлади ва ўрта қиймати экстремум нуқтасидан ўтади. Ўртача AC , лимитик харажат MC , ҳамда AP_L ўртача ва MP_L меҳнатнинг лимитик маҳсулоти орасидаги

боғланишни геометрик изоҳи шакл-1 да берилган.



шакл-1

Бу масалаларни дискрет ҳолда ечиш учун а) ҳосила $\frac{\Delta F}{\Delta X}$ нисбат билан, б) интеграл йигинди билан $\sum MF(x)$, в) $F'(x)$ функция графигига уринма, $(x; F(x))$ ва $(x + \Delta x; F(x + \Delta x))$ икки нүктадан ўтувчи тўғри чизик билан алмаштирилади.

Йигинди, ўртача, лимитик фойда ва харажат функциялари орасидаги боғланишни қараймиз.

Иқтисодий кўрсаткич сифатида фермерни хетиштирган маҳсулоти ҳажми, р маҳсулотни баҳоси, $R = p \cdot x$ даромади, с- харажати бўлсин, $P = R - C$ фойда бўлади.

Бозор иқтисоди шароитида, фермер фаолиятини мукаммал рақобатли, монополия ҳоллари мавжуд бўлиб, биз ундан **мукаммал рақобатли** ҳолни ўрганимиз. Бу ҳолда фермер етиштирган маҳсулотини баҳоси уни ҳажмига боғлик бўлмайди ва баҳони бозор белгилайди. Баҳо $p=p(x)$, $R(x) = p \cdot x$ даромад маҳсулот ҳажмининг чизиқли функциясидан иборат бўлади.

Харажат, даромад, фойда орасидаги боғланиш шакл-2 да берилган. Бу штрихланган тўғри тўртбурчакнинг учлари $(x_3; p)$, $(x_3; AC(x_3))$, $(0; AC(x_3))$


нукталарда бўлади. Бундан $MR = (px)' = p = \frac{px}{x} = AR$. Демак, ўртача ва

лимитик даромад тенг бўлиб, ох ўқига параллел тўғри чизик бўлади ва $C(x_1) = R(x_1)$, $C(x_4) = R(x_4)$ билан устма-уст тушади. $x \leq x_2$ бўлганда

$C(x) = R(x)$, $x_2 \leq x \leq x_4$ ўзгарганида

$C(x) = R(x)$ бўлади. $C(x) \geq R(x)$ дан

$AC(x) = \frac{C(x)}{x} \geq \frac{R(x)}{x} = MC(x)$ бўлиб, $C(x)$ ни графиги $R(x)$ ни графигидан юқорида, $x_2 \leq x \leq x_4$ оралиқда қўйида жойлашади, x_3 нуктада ўртача харажат минимал бўлади.



шакл-2

Лимитик харажат графигини $C(x)$ га ўтказилган уринмани оғиш бурчагини ўзгаришига қараб қуриш мумкин. x_1 ва x_3 нукталардан $C(x)$ га

ўтказилган уринмалар $R(x)$ даромад графигига параллел бўлади. Демак x_1 нукталарда лимитик харажат лимитик даромад билан устма-уст тушади ва энг кам минимум даромадга эга

бўлади(максимум зиёнга). x_3 нуқтада $\Pi' = R' - C' = MR - MC = 0$ бўлиб, маҳсулот ҳажми $x_2 \leq x \leq x_4$ оралигига ўзгарганида даромад мусбат бўлади, маҳсулот ҳажми $x \leq x_2$ ва $x \leq x_4$ бўлганида даромад манфий (зарар қўради) бўлади.

Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми x_3 муқобил ҳажмда бўлганида, даромад микдори шаклдаги штрихланган тўғри тўғри бурчак юзасидан иборат бўлади. Бу кўрсаткич $MC(x)$ ва $AC(x)$ орқали ифодаланади. Штрихланган тўғри тўртбурчакнинг учлари $(x_3; p)$, $(x_3; AC(x_3))$, $(0; AC(x_3))$, $(0; p)$ нуқталарда бўлади.

Тошкент Давлат аграр университети

Худди шундай, ишлаб-чиқариш жараёнини монополик бошқариш ҳолатини ҳам таҳлил қилиш мумкин.

ХУЛОСА

Иқтисодий йўналиш талабаларига фермер хўжалигининг иқтисодий кўрсаткичларини математик моделини тузиб, хўжалик фаолиятини таҳлил қилишга ўргатиш талабаларни касбий тайёргарликларини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Функция эгилувчанлигини иқтисодий жараёниларга таҳлил қилишга кўлланилиши бўйича ўтказётган педагогик тажрибаларимиз, талабаларда катта қизикиш уйғотиб, уларни фанни яхши ўқиб-ўзлаштиришида ижобий самара бермоқда.

Қабул қилинган вақти 20 июн 2019 йил

Адабиётлар

1. Дж. Франс, Дж.Х.М.Торнли «Математические модели в сельском хозяйстве» М., «Агропромиздат», 1990 г
2. Г. Гранберга. «Моделирование социалистической экономики». М. «Экономика» 1988.
3. О.О.Замков, А.В.Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. «Математические методы в экономике». М. «ДиС» 2001.
4. Маленво. Э. Лекции по макроэкономическому анализу. М. «Наука», 1985.
5. А.А.Fayziev, B.Rajabov, L.Rajabova. “Oliy matematika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”, Tashkent, TashDAU, 2014, 306 б.

Индекс 1020

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ

№ 2 (76) 2019

Таъсисчилар: Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чикариш маркази, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Самарқанд ветеринария медицинаси институти, Тошкент давлат аграр университетининг Андижон филиали.

**Тошкент шаҳар матбуот бошқармаси
томонидан**
№ 02-0065 22.01.2007 йил рўйхатга олинган.

Қилилк ўйжалиги, биология ва техника соҳалари бўйича ОАК журналлари рўйхатига киритилган.

Мухаррир: Х.Ўтаева
Техник мухаррир: Д. Алимкулов

Босишига рухсат этилди 25.06.2019. Бичими 84x108¹/₁₆. «Таймс» гарнитураси. Офсет босма. Шартли босма табоги 13. Нашриёт-ҳисоб табоги 12,8. Адади 300 нусха. Баҳоси келишилган нархда.

ТошДАУ таҳририят-нашриёт бўлимининг RISOGRAPH аппаратида чоп этилди.

**Таҳририят манзили: 700140, Тошкент -140,
Университет кўчаси, 2, ТошДАУ.
Тел: (+99871) 260-50-59. Факс: 260-38-60. E-mail:
agrар_fani@mail.ru**

ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

№ 2 (76) 2019

Учредители: Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства, Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Самаркандский ветеринария медицинский институт, Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета.

Редактор: М. Ашурев
Тех. редактор: Д. Алимкулов

Подписано в печать 25.06.2019. Формат 84x108¹/₁₆. Гарнитура «Таймс». Усл.п.л. 13. Уч.изд.л 12,8.
Тираж 300 экз. Цена по договору.

Отпечатано в типографии ТашГАУ на аппарате RISOGRAPH.

**Адрес редакции: 700140, Ташкент -140, улица Университетская, 2, ТашГАУ.
Тел: (+99871) 260-50-59. Факс: 260-38-60. E-mail: agrар_fani@mail.ru**